علم الأحياء والأرض

الصّف الثّاني الثّانويّ العلميّ

- 11 -

2026 - 2025 م

حقوقُ الطِّباعةِ والتَّوزيع محفوظةً للمؤسّسةِ العامّةِ للطِّباعةِ حقوقُ التَّاليفِ والنَّشرِ محفوظةً لوزارةِ التَّربية والتّعليمِ الجمهوريَّة العربيَّة السّوريَّة

طُبع أُوَّل مرَّة للعام الدراسي 2018 – 2019 م

الفهرست

عدد الحصص	رقم الصفحة	الدرس	الوحدة	
3	4	1. المستحاثات.		
3	16	2. سلم الزمن الجيولوجي وطرائق تحديد عمر الأرض.	(الأولى)	
3	26	3. الفلزات.		
1	40	أسئلة الوحدة الأولى	علم الأرض	
1	42	مشروع الوحدة الأولى		
4	44	1. الحموض النووية		्व
4	58	2. الدارة الخلوية	<u>.</u> .	3
3	76	3. تركيب البروتين في الخلية.	(الثانية)	7
2	86	4. الجينوم.	الخلية	- F.
1	93	أسئلة الوحدة الثانية		الفصل الدراسي الأول
1	95	مشروع الوحدة الثانية		づ
		التركيب الضوئي		
2	98	1. الصانعات الخضراء		
3	104	2. آلية التركيب الضوئي		
3	114	 العوامل المؤثرة في عملية التركيب الضوئي 		
1		مراجعة الفصل الدراسي الأول		
	4.00	جهاز الدوران		
2	120	 أجهزة الدوران لدى بعض الكائنات الحية 		
2	124	 القلب والأوعية الدموية. 		
2	136	3. الدم.	(الثالثة)	
1	152	. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
2	1.00	الجهاز المناعي	الوظائف	5
3	160	1. الجهاز المناعي غير المتخصص	الحيوية لدى	į
3	168	2. الجهاز المناعي المتخصص	الأحياء الأحياء	7
3	178	 يعض أمراض الجهاز المناعي ونقل الأعضاء 	الاحياع	لفصل الدراسي الثانم
2	106	التنفس الكاما ال		
2	186	1. التنفس لدى بعض الأحياء 2. التنبيط المسابقة الأحياء		٠ <u>٠</u>
4	194	2. التنفس لدى الإنسان		
5	202	3. التنفس الخلوي 4. التنب اللاريا		
4	214	4. التنفس اللاهوائي		
3	222	5. صحة جهاز التنفس		
1	228	أسئلة مراجعة الوحدة الثالثة		
1	232	مشروع الوحدة الثالثة		
1		مراجعة الفصل الدراسي الثاني		

الوحدة الأولى

علم الأرض

يُعدّ علم الأرض جـزءاً من العلوم الطبيعيّة يُعنى بدراسـة الأرض بالإضافة إلى نشـاتها وتكوينها وتغيراتها وعلاقتها بالكون بشكل عام. بالإضافة إلى تأثير العوامل الداخليّة والخارجيّة عليها.



- الدّرسُ الأولُ: المستحاثات.
- الدِّرسُ الثاني: سلَّم الزَمنَ الجيولوجيِّ وطرائق تحديد عمر الأرض.
 - الدِّرسُ الثالثُ: الفلزَّات.









المفاهيم الأساسيّة:

- المستحاثّاتُ.
- المستحاثة المرشدة.
- مستحاثّات السّحنة.

سأتعلّم:

- مفهومَ المستحاثّةِ.
- ا طرائقَ حفظِ المستحاثّاتِ.
 - الهميّة المستحاثّاتِ.
 - أنواع المستحاثات.
- مراحلَ تشكّل المستحاثّاتِ.
- شروطَ تشكّل المستحاثّةِ.



ذهبْتُ في رحلة علميّة مع

زملائي إلى منطقة جبليّة في
السلسلة التدمريّة وبينما كان
المدرّسُ يشرحُ لنا أحوال المنطقة
وطبيعتِها والكائناتِ الحيّة التي
تعيشُ فيها، لاحظ بعضُ الزملاء
قطعةً صخريةً طبع عليها هيكلٌ عظميٌ
لسمكة، كما في الصّورة المجاورة:

- ؟ كيفَ وصلتْ هياكلُ الأسماك إلى أعالي الجبالِ، معَ أنَّها لا تعيشُ على اليابسة؟
 - ? لماذا بقيتْ محافظة على شكلِها، ولَمْ تتخَرّبْ؟

كيف تتشكّل المستحاثّات (Fossilization)؟

نشاط

▼ أحاورُ زُملاني حول مراحلِ وشروطِ تشكُّلِ المستحاثّات مستعيناً بالصورةِ الآتية:



أرتِّبُ المراحلَ الآتيةَ لتَشكُّل المستحَاثّة:

- تَحلُّل الأجزاءِ الرّخوةِ من جسمِ الكائنِ.
- طَمْرُ البقايا الصلبةِ للكائنِ في الرّسُوبيّاتِ.

أقارن ترتيبي مع ترتيب زملائي.



المستحاثّات Fossils:

بقايا أو آثارٌ أو انطباعاتٌ لكائناتٍ حيّةٍ عاشَتْ في أزمنةٍ جيولوجيّة سابقةٍ.

بقاء الأجزاء الصلبة.

موتُ الكائنِ الحيِّ.

صلة بتاريخ العلوم: أولُ من استخدمَ مصطلحَ Fossil بتاريخ العلوم: أولُ من استخدمَ مصطلحَ Conrad Gesner (1516-1565) الباحثُ بأبي على المعنى الحالي للمستحاثاتِ.



شروط تشكل المستحاثّات:

◄ ألاحظُ الصورتين الآتيتين لصخرين اندفاعيين
 وأفسرُ: عدمَ وجودِ مستحاتًاتِ فيها.

أستنتج_

عدم وجود مستحاثات الديدان الحلقية في الصخصور


الرّسويية؟

شروط تشكّل المستحاثّات:


- وجود هيكل صلب للكائن مقاوم لعوامل التحلّل.
 - الدّفنُ السّريعُ له.
 - الوسط المناسب لحفظ الهيكل وعدم تشوُّ هه.

نشاط:


▼ ألاحظ الصور الآتية، وأفكر، وأستنتج أهمية دراسة المستحاثات:







التّطبق



تطوّر الكائنات الحيّة في الأحقاب الجيولوجيّة

- 1. تحديدُ عمرِ الطّبقاتِ الصّخريّةِ التي حُفِظَتْ فيها المستحاثّةُ.
 - 2. تفيدُ في معرفةِ اتّجاهاتِ تطوُّر الكائناتِ الحيّةِ.
- 3. يمكنُ أن تُعطي معلوماتٍ عن الظّروفِ المناخيّةِ التي سادَتْ ظُروفَ التّرسيب.
- 4. تدلُّ على التغيّرات الجيولوجيّة التي طَرأتْ على الأرض كالحركات المولِّدة للجبال.

طرائق تشكل المستحاثًات:

- المستحاثات؟ عدة لحفظ جميع المستحاثات بالطّريقة ذاتها أو توجد طرائق عدة لحفظ المستحاثات؟
 - ▼ أنفَّذُ مع زملائي النّشاطين الآتيين:

الهدف: عملُ قالب داخلي لصدفةٍ ذات مصراعين.

الموادّ والأدوات اللزّرمة للعمل: صدفة ذاتُ مصر اعين - ماءً - قليلٌ من الحبس - وعاءٌ بلاستيكي - أدواتٌ للخلط.

خطوات تنفيذ العمل:

- 1. أدهنُ السّطح الدّاخلي للصّدفة بالزيت.
- 2. أخلطُ بعض الجبس بالماء ليتكوّن منه معجوناً.
- 3. أملأُ داخلَ الصّدفةِ من معجونِ الجبس بسرعةٍ.
- 4. أطبق مصراعي الصدفة على معجون الجبس.
 - 5. أضعُ ما عملته جانباً بعض الوقت ليجفّ.
- 6. أفصلُ مصراعي الصّدفة عن الجبس فأحصل على القالب الداخليّ.
 - 7. أُلاحظُ تفاصيل الأجزاء الداخلية على الجبس.
 - 8. أرسمُ ما أشاهده في دفتري.

نشاط 1

الهدف: عملُ قالب خارجي لصدفة ذات مصراعين.

المواد والأدواتُ اللازمة للعمل: صدفةٌ ذاتُ مصراعين - ماءً - جبسٌ - وعاءٌ بلاستيكي - أدواتٌ للخلط.

خطوات تنفيذ العمل:

- 1. أدهنُ السّطحَ الخارجي للصّدفةِ بالزيتِ.
 - 2. أحضِّرُ معجون الجبس.
- 3. أضع السّطح الخارجي لأحد مصراعي الصّدفة على معجونِ الجبس وأضغط عليه.
 - 4. أتركُ مصراع الصدفة ومعجونَ الجبسِ بعض الوقت ليجف.
 - 5. أفصلُ المصراع عن الجبسِ فأحصلُ على القالبَ الخارجيّ.
 - 6. أرسمُ ما أشاهده في دفتري.

نشاط 2





أتعلم: أن القوالبَ molds: تتمُّ بتجمّع الرّسوبيّاتِ.

أحولُ هياكلَ الكائنات أو داخلَها، كما في الشَّكلِ المجاور.



الآثارُ والانطباعاتُ Trails:

- ◄ ألاحظُ الصورةَ الآتيةَ التي تمثّلُ آثار أقدام الديناصور:
 - ? ما الفائدةُ من دراسة هذه الانطباعات؟
- عما أهمية دراسة المقاطع المجهرية (الكوبروليت)
 لروث الحيوانات المتحجّر في رأيك؟

الحفظ الكليُّ للكائن Unaltered Soft and Hard Parts:





▲ ألاحظُ الصورتين أعلاه وأبيّنُ سببَ عدم تحللِ أجسام تلك الكائناتِ مع مرورِ الزمنِ؟

أضيف إلى معلوماتي

الكهرمانُ راتنج متحجرٌ من الأشجارِ الصنوبريةِ المنقرضةِ وله عدةُ ألوانٍ.

نشاط: أقرأ الجدول الآتي بتمعن، وأصل بخط بينَ الطّريقةِ، وكيفيّةِ الحفظِ لكلّ منها.

طريقة الحفظ والمثال

كيفيّة الحفظ

فقدان الستوق الخشبية والأوراق النباتية لعنصرى الأكسبين والهيدروجين ويبقى الكربون فتتحول إلى فحم حجرى.



التمعدنُ Mineralization الأشجارُ المتحجّرةُ في شبه الجزيرة العربية.

انحلال المادة الكيميائية في الهيكل ويُحلُّ محلّها مادةً كيميائيةً لها التّركيب الكيميائيّ نفسه وتختلف عن المادة الأصليّةِ بالشّكلِ البلّلوريّ.



التفحّمُ Carbonization

يتم إحلال مادة معدنية مثل السيليسيوم محل المادّة العضويّة.



إعادة التبلور Recrystallization إحلال الكالسبيت محل الآرغوانيت في هياكل بعض اللافقاريات.

قمناً بالتّخطيطِ لعملٍ جماعي للبحث في مصادرِ التّعلمِ المختلفةِ عن طرق أخرى لتشكلِ المستحاثات وحفظها

تصنيف المستحاثّات نشاط:

▼ ألاحظُ الوثائقَ المستحاثيّةِ الآتيةِ، وأفكّرُ، ثمّ أجيبُ عن الأسئلةِ الآتيةِ:



الوثيقة الثانية انطباعات ورقة سراخس من حقب الحياة القديمة (الباليوزوي).



الوثيقة الأولى مستحاثة النيموليت في حقب الحياة الحديثة (السينوزوي) فقط.



الوثيقة الرّابعة مستحاثة الآمونيت في حقب الحياة المتوسطة (الميزوزوي) فقط.



الوثيقة الثّالثة مستحاثّة ثلاثية الفصوص (الترايلوبيت) في حقب الحياة القديمة (الباليوزوي) فقط.

- إ أيٌّ من هذهِ المستحاثّاتِ تفيدُ في تحديدِ عمر الصّخور مع التّفسير؟
- استنتج منها الظّروف التّرسيبيّة التي تم فيها تشكُّل هذه المستحاتّات.

أتعلم: المستحاثة المرشدة (المميزة): توجد فقط في طبقات صخورٍ تابعة لزمنٍ جيولوجي معيّنِ، ومبعثرة على مساحة واسعة من سطح الأرض.

مستحاثة الستحنة Facies

امتد ظهورُها لفترة زمنية طويلة ولا تفيدُ في تحديد عمر الصّخور بل تعطي فكرة عن بيئة الترسيب كالمحاريّات الكلسيّة.

نشاط:




▲ اعتماداً على المفهومين السّابقين: أقارنُ بين المستحاثةِ المرشدةِ ومستحاثةِ السّحنةِ من حيثُ: انتشارُها زمنياً وجغرافياً وأهميةُ كلِّ منهما.

المستحاثات في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة:

- وُجدتْ مستحاتًاتُ الأمونيتِ والنيموليتِ في الرّبوةِ.
- في بئر كراتشوك الغربي عُثِرَ على صخورِ راديوليتِ غنيةٍ بالشّعاعيّات.
 - في الجبالِ الساحليةِ وُجدتْ مستحاتًاتٌ مرجانيةٌ وقنافذُ البحر.
- توجد مستحاثة النيموليت (الفلسيّات) في الصّخور الكلسيّة في منطقة ميسلون وعين الخضرة قرب دمشق.

؟ أَفْسَر: وجودَ النَّفطِ في الجمهوريّةِ العربيّةِ السّوريّةِ وعدم وجودُ الفحم الحجري؟



الجمهورية العربية الستورية.

صلة بالتاريخ: شهدت

تم اكتشافها في تدمر عام 2017

عرضت مستحاثة البليزوصور في معرض دمشق الدولي عام 2017م بعد أن اكتشفت في مناجم الفوسفات في تدمر وهذه المستحاثة الأولى من نوعها في تاريخ سورية، تعود لحيوان زاحف بحري سابح عمره نحو (66 - 85) مليون سنة وطوله 6 متر وعدد فقراته (59) فقرة.



التقويم النهائي

أولاً: أضعُ المصطلحَ العلميّ المناسبَ لكلِّ من العباراتِ الآتيةِ:

- 1. مستحاثات انتشرت في بيئات عدّة، وامتد ظهور ها لفترة زمنية طويلة.
- 2. بقايا أو آثار أو انطباعات لكائنات حيّة عاشت في أزمُنِ جيولوجيّة قديمة.
 - 3. استبدالُ المادةِ المعدنيّةِ الموجودةِ في هيكلِ الكائنِ بالمادةِ العضويّة.
 - 4. مستحاثًاتٌ تميّزُ صخورَ حقب الحياة الحديثة.

ثانياً: أضع كلمة (صح) في نهاية العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) في نهاية العبارة المغلوطة في كل ممّا يأتي:

- 1. المستحاثة المرشدة ذات مدى جغرافي متسع، وتنتشر لفترات زمنيّة واسعة جداً.
 - 2. جميعُ أنواع المستحاثاتِ تفيدُ في تحديدِ عمرِ الطّبقاتِ الصّخريةِ.
 - 3. المستحاثاتُ تفيدُ في معرفةِ اتّجاهاتِ تطوّر الكائناتِ الحيّةِ.
 - 4. مستحاثة الآمونيت تميّز صُخور حقب الحياة القديمة.

ثالثاً: أُعطى تفسيراً علمياً لكلِّ من العباراتِ الآتية:

- 1. لا تفيدُ مستحاثًاتُ السّحنةِ في تحديدِ عمرِ الصّخورِ .
- 2. المستحاثّاتُ في الصّخورِ الاستحاليّةِ غيرُ مفيدةٍ في تقديرِ عمرِ الصّخورِ.
 - 3. أهميّة دراسة مقاطع مجهريّة في الكوبروليت.
 - 4. الفتيتاتُ الصخريّةُ في طبقةٍ رسوبيّةٍ أقدمُ من الطّبقةِ التي توجدُ فيها.







رابعاً: أختارُ الإجابةُ الصّحيحةَ لكلِّ من العبارات الآتية:

1. واحدةٌ ممّا يأتي ليستْ من صفاتِ المستحاثةِ المرشدةِ:


أ - لها مدى زمنيٌّ طويلٌ بالله عند عند الله عند

حـ - لها هيكلٌ صُلبٌ د - تسمحُ بتحديدِ عمرِ الصّخورِ .

2. المستحاثة المميّزة لحقب الحياة القديمة هي:

أ - النيموليت ب - ثلاثيّةُ الفصوص ح - الأمونيت د - الدّيناصور.

خامساً: يمثّل الشّبكلُ الآتي خطّاً بيانيّاً لنسبة الكالسيوم والسيليسيوم في المستحاثّات بدلالة عمق البحار.



المطلوب:

- 1. أيٌّ منَ العنصرين تزدادُ نسبتُهُ بازديادِ العمقِ في رأيك؟
- 2. ينتجُ الكالسيوم والسيليسيوم من تفككِ هياكلِ الكائناتِ الحيّةِ، ممّ تتركّب هياكل الكائناتِ الحيّةِ التي تعيش في كلّ من الأعماقِ السّحيقةِ والمياه السّطحيّة؟

ابحث أكثر في القضايا الآتية

القضية الأولى:

من المعروف أن المرجانَ يعيشُ حاليّاً في مياهٍ دافئةٍ كمياهِ البحرِ الأحمرِ، ماذا تستدلّ من وجودِ مستحاتًاتٍ مرجانيةٍ في الصّخور؟

القضيّة الثّانية:

كيفَ يمكنُ أن تتغيّرَ الكائناتُ الحاليّةُ في حالِ تَغيُّرِ الظّروفِ البيئيّةِ، هل يمكن أن يتشكّل لها مستحاثات مستقبلاً؟ وماذا تتوقّع أن تكون مستحاثّات الزّمن الجيولوجيّ القادم؟

القضية الثّالثة:

الحاضرُ مفتاحُ الماضي، ما رأيُّك في هذهِ المقولةِ بالاعتمادِ على ما تعلمتَهُ من الدّرس؟



المفاهيم الأساسيّة:

- سلمُ الزّمن الجيولوجي.
- الحقبُ والدورُ والدهرُ.
 - العمرُ المطلقُ.
 - العمرُ النسبيّ.
- نصف عمر العنصر المشعّ.

سأتعلّم:

- مفهوم سلمَ الزمن الجيولوجيّ.
- التّمييز بين الحقبِ والدّورِ والدّهرِ.
- التبدلات التي طرأت على الأحياءِ عند الانتقالِ من حقبةِ إلى أخرى.
 - طرائق تحديد عمر الأرض.

بدء الزّمن (ملايين السنين)	أمثلة عن التطور الجيولوجيّ والتغير الحيوي	العصر	الدّور	الحقب	الدّهر	
0.1	نهاية المرحلة الجليديّة الأخيرة، تطور المجتمعات البشريّة.	الهولوسين	瓦			
2.6	ظهور الماموث الصوفي، ووحيد القرن، والإنسان القديم، أخذت القارات وضعها الحالي.	البليستوسين	المرّباعي	ج <u>ة</u> .		
5.3	ظهور الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة، الانهدام السوري الإفريقي وتشكّل البحر الأحمر، سيادة النّباتات مغلقات البذور.	البليوسين	التيوجين	الحياة الحديثة (السينوزوي)		
23	ظهور القطعان البريّة والرّاكون والذّناب، أوج الحركة الألبيّة.	الميوسين	.3	راد دینا (راد		
23.9	ظهور الغزلان، الخيول، والجمال.	الأوليغوسين	a	المنافرة المالية المال		
54.8	ظهور الخيول القديمة، والخفافيش، والحيتان.	الايوسين	الباليوجين	وي)	j	
65	بدء زمن التّذييات، بداية الحركة الألبيّة وتشكل جبال الألب وهيمالايا وزاغاروس وطوروس.	الباليوسين	.5		هر الحياة	
144	ظهور الطّيور الحديثة، انقراض الدّيناصورات، انقراض الأمونيت.	الكريتاسيّ		. 4 .	ं विद्या	
206	سيادة الدّيناصورات، ظهور الزّواحف الطّائرة، والطّيور الأولى، ظهور التّدييات الصّغيرة، انفصال القارة الأم (بنغايا) إلى قارتي (غوندوانا ـ لوراسيا)، بداية ظهور النّباتات الزهريّة.	ر آج الجوراسيّ چ		ب الحياة المتوسطة (الميزوزوي)	دهر الحياة الظاهرة يمثل 12% من عمر الأرض	عمر الأرض 6,6 مليار سنة
248	أوّل ظهور للدّيناصورات، ظهور الآمونيت، أوّل ظهور للتّديات، وتشكّل جبال الآنديز.	التّرياسيّ		وسطة ب)	12 من ع	4,6 مليار
290	حدوث الحركة الهرسينية، انتشار الزواحف، انقراض ثلاثيات الفصوص (الترايلوبيت)، ظهور القارة الأم (اليابسة الكاملة).	البيرمي			مر الأرض	
359	أوّل ظهور للزّواحف، ازدهار البرمانيّات، ظهور النّباتات اللازهرية الوعانية التي شكّلت الفحم الحجريّ.	الكربونيّ		ظِ. اع	3	
417	سيادة الأسماك، أول ظهور للبرمائيّات، والحشرات، والسرّخس.	الدّيفونيّ		الحياة القد		
488	أوّل ظهور للنّباتات والحيوانات البريّة، حدوث الحركة الكاليدونية.	المتيلوري الستيلوري المتيلوري المتيل		يمة (البالي		
448	أوّل ظهور للفقاريات (الأسماك).	الأردوفيش <i>يّ</i> الأردوفيشيّ		وزوي)		
540	ظهور أشكال متقدمة من الحياة البحرية واللافقاريات، سيادة ثلاثيّات الفصوص (الترايلوبيت).	کامبر يّ	1			
3500	أوّل ظهور للكانسات عديدات الخلايا مثل الطّحالب واللافقاريات الرّخوة.	زوي	البروترو		دهور الحياة الخفية	
4600	تطور أوّل أشكال الحياة، ظهور الجراثيم الخضراء المزرقة، والجراثيم القديمة.	ي	الأرك		باة الخفية	



ونجدُ أنَّ الأسسَ التي اعتمد عليها العلماء في تقسيم تاريخ الأرض والحياة هي:

- 1. مبدأُ تعاقب الطّبقات ودراسة المستحاتّات وتطور الـ
- 2. التغيراتُ الكبرى التي طرأت على سطح الأرضِ كالحركات للجبال والتغيرات على الكائنات التي تعيشُ على الأرض مثل



أتعلم: سلّمُ الزّمن الجيولوجيّ (Geological Time Scale)

ترتيبٌ زمني للأحداثِ الجيولوجيّة وطبقات الصّخور والمستحاثّات حسب تتابعها في التّاريخ الجيولوجيّ من الأقدم إلى الأحدثِ.

أقسام الزّمن الجيولوجيّ: ألاحظ الشكل الآتي وأجيب عن الأسئلة الآتية:




- 1. ما أكبرُ وحدةٍ زمنيةٍ في الزمنِ الجيولوجيّ؟
- 2. الفترةُ التي تمتدُّ من نشأةِ الأرض حتّى حقبِ الحياةِ القديمةِ تسمّى (ما قبل الكامبري)، تشكل

1

حوالي %88 من عمر الأرضِ وتقدّر بحوالي 3500 مليون سنةٍ ويصعُبُ تفسيرُ سجلها الصّخريّ، لماذا في رأيك؟


- 4. بالاعتمادِ على جدولِ سلم الزّمن الجيولوجيّ السّابقِ أَمْلأُ الفراغاتِ بالكلمات المناسبة في المخطّط الآتى:



أسس تسمية الأحقاب والأدوار والعصور:

- يُسمّى الدورُ البيرميُ نسبة لمنطقةِ بيرم في روسيا وكذلك الدورُ الديفوني نسبةً لمقاطعةِ ديفون
 في إنكاترا حيثُ درست الصّخورُ فيها.
 - أما الدورُ التّرياسي أُطلِقَتْ تسميتُهُ بالاعتمادِ على عددِ طبقاتهِ الصّخريةِ.
 - في حين يُسمّى الدورُ الكربونيُ والدورُ الكريتاسي نسبةً لطبيعةِ صخورِ هما.
 - سُمِّي الميوسين والبليوسين بحسب مواقعِها في سلَّم الزّمن الجيولوجيّ من الأقدم للأحدث.
 - مما سبق أستنتج مع زملائي أسس تسمية الأحقاب والأدوار والعصور:
 - 1. تُسمّى الأحقابُ الجيولوجيّةُ بحسب

2. أما الأدوارُ والعصورُ تمت تسميتُها وفقَ أسسِ عدّةٍ هي:



أضيف إلى معلوماتي

يُسمّى الباليوجين بالدّورِ النيموليتي نسبةً لمستحاثّة النيموليت التي وجدت في عصر الأوليغوسين، ويسمّى الدّورُ الأوردوفيشي والدّورُ السيلوري نسبة لقبائلِ الأوردوفيش والسيلور في إنكلترا، والجوراسي نسبةً لجبال الجورابين سويسرا وفرنسا.

النيموليت

نشاط:

بالاعتماد على جدول سلم الزّمن الجيولوجي أُكْمِلُ الفراغاتِ بالكلمات المناسبة في المخطّط الآتي:

	دهرُ الحياةِ الظاهرةِ	
حقب الحياة الحديثة	حقب الحياة	حقب الحياة القديمة
ويقسم إلى ثلاثة أدوار: 1	أدواره:	أهم أحداثه: 1
2	2. الجوراسي	2
3	3	3

المحتوى العلمى للنّشاط:

سلمُ الزّمنِ الجيولوجي والتغيّراتِ الجيولوجيّة الكبرى والتّطوّر المتعاقب للأحياء من الأقدم إلى الأحدث.

المهاراتُ المرجو اكتسابُها من تنفيذ النّشاط:

الملاحظة: يُلاحَظُ النّطورُ المتعاقبُ للأحياء وأهمّ التّغيّرات التي طرأتْ عليها.

الاستدلال: يُستَدلُ على البيئاتِ والظّروفِ المناخيّةِ السائدةِ اعتماداً على سجلَ الزّمن الجيولوجيّ.

التصنيف: يصنفُ الأحياءَ المميّزةَ لكلِّ حقبةِ .

الرسم: يرسم أشكالاً لبعض الأحياء المميزة لكلّ حقبة.

المواد والأدوات اللازمة:

- يستخدم التّصنيفات الرّئيسة لسلَّم الزّمن الجيولوجيّ. أطباق كرتون ملوّنة أقلامُ تلوين.
 - يرتب الأحقاب وينسب لها الأدوار والعصور. مقصّاتٌ لاصقٌ.
 - بحدّد الأحباء الممبّزة لكلّ حقب
 - يصمم مخططاً لسلم الزّمن الجيولوجيّ.
 - صور ً لأحباء مختلفة لكل حقبة
- صورً للمستحاثّات المختلفة المميزة.

إجراءات الأمان والسلامة: كن حذرا عند استخدام المقص.

خطوات تنفيذ النشاط:

الهدف من النّشاط:

- أحدد الأحقاب والأدوار والعصور التّابعة لها.
 - أحدُّ الزَّمن بملايين السّنين.
 - أختارُ مقياساً مناسباً للرسم.
- أحدُّ التغيّراتِ المتعاقبةَ التي طرأتْ على الأحياءِ وأهمَّ الأحداثِ في كلّ حقبةٍ.
 - أصنِّفُ صورَ الأحياءِ التي حصلتُ عليها أو جمعتُها وفقاً لزمن ظهورها.

أنظّم المعلومات والصّور السّابقة الّتي صنّفتها على شكل لوحة تبين سلّم الزّمن الجيولوجيّ.

أصمم مخططاً بالشّكل الذي أراه مناسباً (قطاعات بيانيّة أو أعمدة بيانيّة أو غير ذلك) وألوّنه وأكتب عليه العمر مقدّراً بملايين السّنين.

طرائق تحديد عمر الأرض:





▲ أتأملُ الصّورَ السّابقة:

أتعلم:

- ? كيف يمكن تحديد عمر الصّخور فيها؟
- ؟ ما الأسس التي تقترحها لتقدير عمر الصّخور في القشرة الأرضية؟



طرائق تحديد عمر الأرض

العمرُ النسبي: ويعتمدُ على المستحاتَّاتِ المرشدةِ وعلم الطّبقيةِ وقانونِ التّطبقِ الّذي ينص على أنّ كلّ طبقةٍ أحدثُ من الطّبقةِ التي تحتَها وأقدمُ من الطّبقةِ التي فوقَها. العمرُ المطلقُ: وتعتمدُ على تحديد عمر الصّخور والمستحاثّات بواسطة النّظائر المشعّة (قياس نصف عمر المادّة المشعّة).

مثال:

عيّنة من الكربون تحتوي على غرامٍ واحدٍ من الكربون C_{14} في الوقت الحالي وهي ستحوي على 1.5 غرام بعد 5730 سنة. والسّؤال:

- ؟ كم غراماً من الكربون المشع سيصبح فيها بعد 11460 سنة?
- كم سنةً تحتاج لتصبح عينة الكربون المشع 0.125 غرام؟

أضيف إلى معلوماتي

نصفُ العمر: هي الفترةُ اللّازمةُ لتحلل نصفُ عدد ذراتِ العنصرِ المشعّ وهي ثابتة لكل عنصر مشعّ ولا تتأثر بالظّروف المحيطة به.

يُستخدمُ الكربونُ C_{14} عادة في تحديد تاريخِ المستحاتّاتِ وله عمرٌ نصفيّ يساوي 5730 سنةً.



التّقويم النهائيّ

أولاً: أضعُ المصطلحَ العلميّ المناسبَ لكلِّ من العبارات الآتية:

- 1. مدّة زمنية تقاس بملايين السنين وتتكوّن من أدوار عدة.
- 2. ترتيبٌ زمنيٌ للأحداثِ الجيولوجيّة وطبقات الصّخور والمستحاثّات حسب تتابعها.
- المدّةُ اللّازمةُ لتحللِ نصفِ عددِ ذراتِ العنصرِ المشعِّ، وهي ثابتة لكلّ عنصر مشع، ولا تتأثّرُ بالظّروف المحيطة به.

ثانياً: أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ لكلِّ من العبارات الآتية:

- 1. أحدُ الحوادثِ الآتيةِ لا ينسبُ إلى حقبِ الحياة المتوسَّطة:
- ب ظهور الطّيور الأولى.

أ - سيادة الثّدييّات.

- د ـ بداية النّباتات الزّ هريّة
- حـ سيادة الديناصورات.
- 2. انقرضت الديناصورات في الدور:
- ب الكريتاسيّ.

أ - الكامبريّ.

د - الدّيفونيّ.

- ح التّرياسيّ.
- 3. أحدُ الأدوار الآتية لا ينتمي إلى حقب الحياة القديمة:
- ب الدّيفونيّ.

أ- البرميّ.

د - السّيلوريّ.

- د التّرياسيّ.
- ثالثاً: أربُّبُ الأدوارَ الآتيةَ من الأقدم إلى الأحدث:

النّيوجين - الكامبريّ - الكربونيّ - الكريتاسيّ.



رابعاً: أصِلُ بخطِ الأحداثَ الآتيةَ في العمود الأول بما يناسبُها من الأدوار في العمودِ الثاني:

العمود الثّاني

الكربونيّ

الديفونيّ

الستيلوريّ

العمود الأول

الحركة الكاليدونيّة

بداية ظهور النباتات

سيادة الأسماك

أوّل ظهور الزّواحف

خامساً: أنسبُ الأدوارَ والعصورَ الآتيةَ إلى الأحقابِ الموافقةِ لها:

الأيوسين - الكربوني - التّرياسي - الأوردوفيشي.

سادساً: أضع كلمة (صح) في نهاية العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) في نهاية العبارة المغلوطة:

- 1. تُفيدُ المستحاثّات في تحديدِ العمر النسبيّ لطبقاتِ الأرض.
 - 2. تشكّلت جبال الألب في حقب الحياة المتوسّطة.
 - 3. ظهرت الزّواحف الكبيرة في حقب الحياة القديمة.

سابعاً: أحدِّدُ الأسسَ المعتمدة في تسمية كلِّ من الأدوارِ الآتية:





▲ الصورة الرّابعة



المفاهيم الأساسيّة:

- الفلزّات.
- الخواص البصرية للفلزّات.
- الخواصُ التّماسكيّة للفلزّات.
 - سلم موس للقساوة.

سأتعلّم:

- مفهوم الفلزّات.
- طرائقَ تصنيف الفلزّات.
 - خواصً الفلزّات.
 - أهمية الفلزّات.



في أثناء تدريبنا لخوض منافسات الأولمبياد العلميّ السّوريّ في مادة علم الأحياء قُمنا بزيارة إلى كليّة العلوم في أحد الجامعات في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة بأقسامِها المختلفة ، وكانَ قسمُ الجيولوجيا ومخابُره من أكثر الأقسام التي وقفنا فيها وطرحنا الكثير من التّساؤلات وذلك لما شاهدناه فيه من صخور جميلة، وبألوانٍ متنوّعةٍ وأشكالٍ رائعةٍ ومن بعض الصّورِ التي تمّ التقاطُها فيما سبق.

▼ أنعم النَّظر في الصّور الآتية التي تمثَّلُ فلزّاتِ متنوعةِ وأتساءل كيفَ تكونتْ وما بنيتُها؟

الفلزّات:

- موادِّ متجانسةٌ غيرُ عضويةٍ ذاتُ تركيبٍ كيميائيّ محدّدٍ تكوّنت بفعل عواملَ طبيعيّةٍ في القشرةِ الأرضيةِ
 - تتكونُ من عنصر كيميائيّ أو أكثر.
 - لها نظامٌ ذريّ داخلي منتظمٌ.
 - بعضُها متبلورٌ وبعضها غيرُ متبلورٍ.







◄ ألاحظُ الصّورَ الأتيةَ والتي تمثّلُ فلزّاتٍ وأستنتجُ بعضاً من استخداماتِها وصفاتِها.

تصنيفُ الفلزّات :

تصنف الفلزات من حيثُ نشأتُها أو تركيبُها الكيميائي أو خواصُّها البلوريّةُ أو أهمّيتُها.

أتعلَّمُ:

لمنشأ إلى: بحسب المنشأ

الفلزّات تُصَّنفُ بحسب المنشأ إلى:

فلزّات

فْلزّات عميقة


> تدخلُ في تركيب الصخورِ الرسوبية مثل الهاليت والجص.

تدخلُ في بناء الصّخورِ الاندفاعيّةِ مثل الكوارتز والميكا.





تصنيفُ الفلزَ ات حسبُ التَركيبِ الكيميائي والبنيةِ البلّلوريّة:



تصنيف الفاز ات حسب التركيب الكيميائي والبنية البلورية:

ال	الصف	
الذّهب الكبريت	تضم زمرتين هما: - المعادنُ (الذّهبُ، الفضةُ). - اللامعادنُ (الكبريتُ، الماسُ).	العناصر الحرّة
	Fes ₂ البيريت	الكباريت
	NaCl الهاليت	الهاليدات
	${\rm Fe_2O_3}$ - الهيماتيت ${\rm Fe_2O_3.H_2O}$ - الليمونيت	الأكاسيد والأكاسيد المائيّة

	CaCO ₃ کالسیت	الكربونات
	$CaSO_4.2H_2O$ الجص	الكبريتات
المتوان	${ m Mg_3[Si_4O_{10}](OH)_2}$ - التالك - SiO - الصّوانُ	السّيليكات

خواصُّ الفلزّات:

▲ أُنِعمُ النّظرَ في الصّورِ السّابقةِ وأستنتجُ مع أحد زملائي أنّ الفلزّاتِ تختلفُ عن بعضها بكثيرٍ من الصّفاتِ والخصائص منها:

خواص الفلزّات		
خواص حسية	خواصّ تماسكيّة	خواصّ بصريّة

الخواصُّ الضّوئيّةُ (البصريةُ) للفلزّات:

1. اللَّونُ: وهو اللَّونُ الذي يبديهِ الفلزُّ عند إضاءَتِه بضوءٍ طبيعيّ.



إثراء

اللّونُ إما أن يكونَ أصيلاً ثابتاً يعكسُ لونَ الشّواردِ (الأيونات) الدّاخلةِ في تركيبه مثل الآزوريت ذو اللّون الأزرق، أو مكتسباً نتيجة وجودِ شوائب كيميائية فيه كفلز الكوارتز الدي يظهر بألوانٍ مختلفة.

وبعضُها يتغيّرُ لونُها تبعاً اسقوط الضّوء عليه كفلز التورمالين.







البريق: شدّةُ انعكاسِ الأشعةِ الضوئيّةِ حين ورودِ حزمةٍ من الأشعةِ الضوئيّةِ على سطحِ الفلزِّ.
 له نوعان: بريقٌ معدنيّ: كالذّهب والبلاتين والنّحاس.

وبريقُ لا معدنيّ: الماسيّ - لؤلؤيّ - زجاجيّ - دهنيّ - ترابيّ.

3. المحدش: لون المسحوق النّاعم بعد خدش الفلزّ، وقد يتطابق مع لونِ الفلزّ، أو يختلف عنه.

نشاط عملیّ

المحتوى العلميّ: يختلف لون مسحوق الفلزّ بعد خدشه بحسب نوع الفلزّ.

المواد و الأدوات اللَّازمة: قطعة من البورسلان - فلزّ بيريت - فلزّ الغالينا - ورقة بيضاء.

التّجربة: أقومُ بحكَ فلزّ البيريت ذي اللّون الأصفر على الوجه غير المصقول للبورسلان وأكررُ العمليّة بشكلٍ منفصلٍ على فلزّ الغالينا.

الملاحظة: ألاحظُ لونَ المسحوقِ النّاعمِ لكلِّ من البيريت والغالينا وأقارنُ لونَ المسحوق مع لونِ الفلزّ.

التحليل والاستنتاج: البيريت لونه ومخدشه أسود والغالينا لونه رمادي قاتم ومخدشه سود والغالينا لونه رمادي قاتم ومخدشه لون الفلز مع لون مخدشه.

4. التألق: خاصية بعض الفلز ات حين مقمع عما تحري تأثر بالأشعة فتصريد

وقوعها تحتَ تأثيرِ الأشعّةِ فتصدرُ ضوءاً مرئيّاً، وتتألّق الفلزّات بألوانَ زاهية، قد تختلف عن ألوانها

الأصلتة

إثراء

للتَّألِّق نوعان هما:

الفلورة: يزول التّألق بعد زوال المؤثّر.

والفسفرة: استمرار التَّالق بعد زوال المؤتّر.



5. الشُفَافَيّةُ: قدرةُ الفلزّ على إمرار الضّوء عبرَه وقد تكونُ الفلزّاتُ شفافةً مثلَ الكوارتز أو شافةً كالزّمرد أو عاتمةً مثل الغالين والهيماتيت.

الخواصُّ التماسكيّة للفلزّات:

يُقصَدُ بها مقاومةُ الفلزّات للمؤثرات الميكانيكية كالضّغطِ والقطعِ والطّرقِ، وتعتمد على التّركيب البلّوريّ للفلزّ وقوى التّرابط بين ذراته والخواصّ التّماسكيّة تعدّ خواصّ ثابتة ومميّزة للفلزّ.

1. القساوة: يقصد بها مقاومة الفلز للخدش أو القطع بأداة حادة ويستخدم سلّم موس Mohs لقياسِ قساوة الفلز ات بشكل نسبيّ.



أضيف إلى معلوماتي

تستخدم بعض الموادّ في الدّراسة العمليّة لقياس القساوة

القساوة	المادّة
2.5	الظّفر
4	قطعة نقود نحاسيّة
5.5	زجاج نافذة أو سكين حادّة
6.5	مبرد أو مسمار فولاذيّ
10	الماس



2. الانفصامُ (التشقق): قابليةُ الفلزّ للتّقسّمِ أو التّقطّعِ وفق سطوحٍ معيّنةٍ تدعى سطوحُ الإنفصامِ.

▼ ألاحظُ الصورَ الآتيةَ وأتعرّفُ أنواعَ التّشقّق:






- 3. المكسر: السطحُ النَّاجمُ عن كسرِ الفلزّ حين تعرضِه لقوى ميكانيكيّة.
- ▼ إذا علمتُ أن مكسر الغضار ترابي ألاحظُ الصورَ الآتية وأتعرّف مكسر كلّ من الذّهب والصوان.



الصوان مكستره محاري



الذهب مكستره مستن

الخواصُّ الحسيّةُ للفلزّات:

وهي الخواصُّ التي يمكنُ تقديرُها وتحديدُها عن طريق أعضاءِ الحسِّ.

الملمسُ: ناعمٌ أو خشن أو صابوني.

الرّائحة: لبعض الفلزّات روائح مميّزة مثل الفوسفريت رائحتُهُ تشبهُ رائحةَ التّوم وكذلك الرّائحةُ الإسفاتيّة أو القطر انيّةُ للفلزّات النفطيّةِ أو رائحةٌ كبريتيّة من البيريت.

الطّعمُ أو المذاقُ: لفاز السّلفين طعمٌ مر .

ا ذكرُ مثالاً عن فلزّ طعمه مالح.

أضيف إلى معلوماتي

بعض الفلزّات تمتاز بإطلاق إشعاعات نتيجة التفكك الذاتع لذراتها مثل البتشبلند.

دراسةُ بعض الفلزّات الاقتصاديّة:

انتشرت صناعة الحلي والمجوهرات والتجارة بها في جميع أنحاء العالم وعمد الأغنياء إلى اقتناء الأحجار الكريمة غالية الثمن وتنتشر في هذه الأيام صناعة المجوهرات والحلي التقليدية فما مصدر هذه الحلي التقليدية في رأيك؟





المرو (الكوارتز): أكسيد السيلسيوم SiO

يتشكّلُ المرو في جميعِ أنواع الصّخور، شديدُ الصّلابة يتجزّ أُ متحوّلاً إلى حبّاتِ رملٍ، النقيُّ منه يكونُ شفّافاً.

- ؟ أفسترُ الألوانَ المختلفةَ للمروِ (الرّمل البحريّ).
- ؟ ما الأهمية الاقتصادية لفلز المروفي رأيك؟ وما الصناعات التي يدخل فيها؟

الميكا: تتشكّلُ في الصّخورِ الاندفاعيّةِ والمتحوّلةِ وهي غيرُ ناقلةٍ للحرارةِ ولها نوعان:

- ميكا بيضاء (مسكوفيت): لونُه شفّافٌ أبيضُ إلى رماديّ مخضرٌ بريقُه زجاجيّ أو لؤلؤيّ ومخدّشه عديمُ اللّون وانفصامُه تام ومكسّرُهُ مسنّنٌ، كما في الشّكل المجاور.
 - ميكا سوداء (بيوتيت): لونه أسود أو أخضر غامق بريقه زجاجي أو لؤلؤي ومختشه عديم اللون، وانفصامه تام، ومكسره مسنن كما في الشكل المجاور.

الهاليت: يوجدُ في الصّخورِ الرسوبيّةِ، ومنحلاً في ماء البحار، بلوراته مكعّبة مفردة أو متجمّعة، ويختلف حجم بلورات الهاليت بحسب الحيّزِ الذي تنمو فيه وسرعة التّبخّر.

؟ أذكرُ أهم استخداماتِه.



الهاليت (الملح الصّخريّ)

نشاط عملیّ

المحتوى العلمي: التبلور عبارة عن عمليّة تشكيل للبلّورات الصّلبة من المحلول.

الهدف من النّشاط: تحضير بلّورات الهاليت.

المواد والأدوات اللَّزمة: بيشر - ملح الطَّعام - خيط للرّبط.

خطوات تنفيذ النّشاط:

- أضع لتراً من الماء في بيشر، وأُضيفُ كمّيّاتٍ متتاليةٍ من الملح مع التّحريكِ المستمرّ حتّى يتوقّفَ ذوبانَ الملح (حد الإشباع).
 - أقومُ بتسخينِ البيشر على لهبِ موقدٍ حتّى الدّرجة (70).
- أربطُ القضيبَ الزجاجيّ بخيطٍ، ثمّ أجعلُ الخيط يتدلّى في الماء بهدوءٍ واتركُهُ في مكان هادئٍ للدّرس الآتي.

إجراءات الأمان والستلامة: كن حذراً في أثناء التسخين.

التحليل والاستنتاج:

- أصفُ ماذا تجمعَ على الخيطِ وأفحصُ البلوراتِ المتشكلةَ بالمكبرةِ وأرسمُها على دفترى.
 - أقارنُ ما رسمتُهُ مع زملائي.

الجصُّ CaSO₄.2H₂O

و هو كبريتات الكالسيوم المائيّة، لونُهُ مائلٌ للصفرةِ، يفقدُ ماءَه عندما يسخنُ للدرجة 110 - 120 درجة مئويّة، يُصنعُ منه الجبصينُ ويوجد في الصّحراء بشكل جميل يدعى وردةُ الصّحراء، يستخدم في صناعةِ السّمادِ والزّجاج ، كما استخدمَهُ المصريّون القدماءُ في إكساءِ الإهراماتِ.

أضيف إلى معلوماتي

ساهمت الجمعيّة الجيولوجيّة السوريّة وقسم الجيولوجيا في كلّيّة العلوم بدراسة الكثير من الفلزّات الموجودة في الجمهوريّة العربية السّوريّة ووضع خرائط لأماكن توزّع الفلزّات.



فْلْزَّاتُ الحديدُ: لا يوجدُ الحديدُ حراً في الطّبيعةِ إنما يكونُ متّحداً مع عناصرَ أخرى ومن فلزّاتِه:

الصورةُ	بعض خصائصِهِ	الفلزُّ
	لونُهُ أسودُ بنيٍّ لهُ بريقٌ معدنيٌ وذو مغناطيسية عاليةٍ.	الماغنيتيت (أكسيد الحديد المغناطيسيّ) Fe ₃ O ₄
	لونُهُ أحمرُ بنيُّ أو أسودُ، مخدَّشُهُ أحمرُ بني ومكسّرُهُ محاري، بريقُهُ معدني كامدُّ أو ترابي، يُعَدُّ من مصادر الحديد.	الهيماتيت ${ m Fe}_2{ m O}_3$
	يوجدُ في الصّخورِ الاندفاعيّةِ والرّسوبيّةِ، لونُهُ أصفرُ نحاسيّ، يستخدمُ في صناعةِ المجوهراتِ التقليديّةِ.	البيريت كبريت الحديد ${\rm FeS}_2$
	لونُهُ أصفرُ أو بنيٌ بريقُهُ معدنيّ كامدٌ، مخدّشهُ أصفرُ يتشكّلُ عن أكسدةِ البيريت والفلزّات الأخرى التي يدخلُ في تركيبِها الحديدُ.	الليمونيت Fe ₂ O ₃ .nH ₂ O

نشاط عملیّ

المحتوى العلمي: تمتاز الفلزّات بلمعانها وبريقها، لها كثافة مرتفعة، قابلة للطّرق والسّحب وتحتاج لدرجة انصهار عالية. تعد من الموادّ جيدة النّقل للكهرباء والحرارة. وتصنّف معظم عناصر الفلزّات على أنّها غير مستقرة كيميائياً إذ تتفاعل بسرعة مع أكسجين الهواء وتتأكسد.

الهدف من النشاط: تعرّف بعض خواص الفلزّاتِ الفيزيائيةِ والكيميائيةِ.

الملاحظة: تسجيلُ البياناتِ، التحليلُ، المقارنةُ، الاستنتاجُ.

المواد والأدوات اللزمة:

- 1. عينات من الفاز ات (جص مرو ميكا هاليت بيريت).
 - 2. ألواحٌ ومواد الخدش القياسية وعدسة مكبرة ومغناطيس.
- 3. حمضُ كلور الماءِ وقطارات، بيشرٌ زجاجيّ وقضيبٌ زجاجيّ.

إجراءات الأمان والسلامة:

- 1. أكون حذراً عند التّعرّف على الفلزات خوفاً من كسرها، وخصوصاً الفلزّات التي يصعب الحصول عليها.
 - 2. ارتداءُ المعطفِ المخبريّ عند إجراءِ التفاعلات الكيميائيّة.
 - 3. التأكُّدُ من سلامةِ الأنابيب الزجاجيّة واحذر كسرها.
 - 4. الحذر عند التّعامل مع حمض كلور الماء فهو مادّة مخرّشة.

خطوات تنفيذ النشاط:

- 1. أستخدمُ العدسةَ المكبّرةَ لتحديد لون الفازّات، وأُحدّدُ لونَ المخدّش.
 - أحدّد قساوة الفلز ات باستخدام المواد المساعدة.
 - 3. أعرِّضُ الفازات لضوءِ الشّمس وأستنتجُ بريقها.
- أُحَّدُد تشقّقَ الفلزّاتِ بالطّرقِ الخفيفِ عليها، أُحاولُ تلمسها بحذر وشمِّ رائحِتها.
 - 5. أضعُ قطراتٍ من حمض كلورِ الماءِ على قطع صغيرةٍ منها.
 - 6. ما الرّائحة المنطلقة من تفاعل HCl مع البيريت؟ وماذا تستنتج؟

التّحليل والاستنتاج: أملا الجدول:

الملمس	البريق	القساوة	المخدّش	اللَّون	اسم القلزّ
	الملمس	البريق الملمس	القساوة البريق الملمس	المخدّش القساوة البريق الملمس	اللّون المخدّش القساوة البريق الملمس



د - الكوارتز



أولاً: أختارُ الإجابةُ الصحيحةُ لكلِّ من العبارات الآتية:

- أ- الكالسبت ب- التّالك حـ الأباتبت 1. أقلُّ الفلزّاتِ قساوةً هو:
 - 2. خاصيّة بعض الفلزّات على إصدار ضوء مرئى عند تعرّضها للأشعّة:
- ب التّألّق ح البربق أ_ الشفافيّة د - المخدّش
 - د مالحٌ. ب ـ حامضٌ حـ ـ مرّ أ_ حلوٌ 3. لفاز الهاليت طعم:
 - 4. أحدُ الفلزّ ات الآتية لا يعدُ من فلزّ ات الحديد:

ب ـ الليمونيت حـ ـ الكالسيت أ- البيريت د - الهيماتيت

ثانياً: أضعُ المصطلحَ العلميّ المناسبَ للعباراتِ الآتيةِ:

- 1. لونُ المسحوق النّاعم للفارّ.
- 2. خاصيّةُ بعض الفازّاتِ حين وقوعِها تحتَ تأثير الأشعةِ فتصدرُ ضوءاً مرئيّاً.
 - 3. مقاومةُ الفانّ للخدش أو القطع بأداةِ حادّةِ.
 - 4. السطحُ النّاجمُ عن كسر الفلزِّ حين تعرضيهِ لقوى ميكانيكية.

ثالثاً: أعطى تفسيراً علميّا لكلِّ من العباراتِ الآتية:

- 1. لا يعدُّ اللَّونُ خاصةً مميّزةً للفلزّات.
 - 2. بعضُ الفازّاتِ تصدرُ إشعاعاتِ.
- 3. استخدامُ فلز الماس في صنع رؤوس الحفاراتِ.
 - 4. يسمّى البيريتُ بذهبِ المجانين.
- 5. تستخدمُ الميكا في صناعةِ ملابس رجالِ الإطفاء.
 - 6. لا يعدُّ النفط ُ فلزِّ أَ.

- 1. أبحثُ في المراجع عن خصائص أخرى للفازّاتِ.
 - 2. أبحثُ في ظاهرةِ المصباح الفلوريّ.
- 3. لعمالِ الطّرقِ العامّةِ ملابس تضيءُ ليلاً، ما الخاصيّةُ التي تتميّزُ بها الموادُّ الدّاخلةُ في تركيبها؟





رؤوس الحفارات

أسئلة الوحدة الأولى

أولاً: ضع كلمة (صح) في نهاية العبارة العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) في نهاية العبارة المغلوطة:

- 1. الطّبقية وعلم التّطبق يفيد في تحديد العمر المطلق للصّخور.
- 2. سيادة ثلاثيّة الفصوص (الترايلوبيت Trilobite) في الدّور الكريتاسي.
 - 3. يعدّ الدّور الكربوني أقدم أدوار حقب الحياة القديمة.
 - 4. فلز الهيماتيت يدعى بذهب المجانين.
 - 5. الفلز الأكثر قساوة بخدش الفلز الأقل قساوة

ثانياً: ضع المصطلح العلميّ المناسب للعبارات الآتية:

- 1. راتنج متحجّر من الأشجار الصّنوبريّة المنقرضة وله عدّة ألوان.
 - 2. إحلال مادّة معدنيّة مثل السيليسيوم محلّ المادّة العضويّة.
- ترتیب زمنی للأحداث الجیولو جیّة و طبقات الصّخور و المستحاثّات حسب تتابعها فترة التّاریخ الجیولو جیّ من الأقدم إلى الأحدث.
 - 4. أحد فلزّات الحديد يمتاز بمغناطيسيّة عاليّة.
 - 5. استمر ار تألّق الفلزّ بعد زوال المؤثّر الإشعاعيّ.

ثالثاً: اختر الإجابة الصحيحة لكل ممّا يأتى:

1. واحدة ممّا يلي ليست شرطاً لتشكّل المستحاثة:

ب - أن تكون كبيرة الحجم أ - وجود وسط مناسب لحفظ الهيكل د - وجود هیکل صلب

ج - الدّفن السّريع

2. أحد الترتيبات الآتية هو الصحيح لمراحل تشكّل المستحاثة:

ب - بقاء الأجزاء الصّلبة. أ- تحلُّل الأجزاء الرخوة من جسم الكائن

ج - طمر البقايا الصّلبة للكائن في الرسوبيّات د - موت الكائن الحي.

> مجموعة الإجابات: 1- د، أ، جه، ب 2 - أ، جـ، ب، د

4 - د ، أ ، ب ، جـ 3- د، ج، أ، ب

3. واحدة ممّا يأتي ليست صحيحة فيما يتعلّق بأهمّية المستحاثّات:

- أ تحديد عمر الطّبقات الصّخريّة التي حفظت فيها المستحاثة .
 - ب تفيد في معرفة اتّجاهات تطوّر الكائنات الحيّة .
- ج يمكن أن تعطى معلومات عن الظّروف المناخيّة التي سادت ظروف التّرسيب.
 - د جميع المستحاثات وجودها يدلّ على توافر ثروات باطنيّة.

4. المستحاثة المميزة لحقب الحياة المتوسطة هي:

- أ النيموليت ب ثلاثية الفصوص ح الآمونيت د الديناصور
- 5. الفترة ما قبل الكامبري تشكّل من عمر الأرض حوالي: 18% 81 % 88 % 98 %.
 - 6. إحدى العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بالفلزّات:
 - أ ـ موادّ متجانسة غير عضويّة ب ب ـ تتكوّن من عنصر كيميائيّ أو أكثر
 - جـ ـ لها نظام ذريّ داخليّ منتظم. د ـ جميعها متباور.
- 7. أكثر الفلزات قساوة هو فلز: أ الكالسيت ب الأباتيت ج الماس د الكوارتز.
- 8. الفلز الذي يتميز بطعم مر هو: أ السلفين ب التّالك ج الليمونيت د الكوارتز. رابعاً: املأ الفراغات الآتية بالكلمات المناسبة:
- السمّي بقايا أو سابقة بالمستحاثات.
 فقدان السّوق الخشبيّة والأوراق النباتيّة لعنصري والهيدروجين ويبقى فتتحوّل إلى فحم حجريّ.
- 3. فلز الجصّ كبريتات المائيّة لونه مائل يصنع منه ويوجد في الصّدراء بشكل جميل يدعى الصّدراء، يستخدم في صناعة والزّجاج.

خامساً: أعط تفسيراً علميّاً للعبارات الآتية:

- 1. تستخدم صفائح الميكا في صناعة المكواة الكهربائيّة.
 - 2. لفلز الكوارتز ألوان متعددة.
- 3. انتشار رائحة كريهة عند إضافة حمض كلور الماء على فلز البيريت.
 - سادساً: عدد شروط تشكّل المستحاثّات.

سابعاً: رتب المصطلحات الآتية من الأكبر للأصغر:

دور - حقب - زمن جيولوجي - دهر - عصر

ثامناً: انسب الأدوار والعصور الآتية إلى أحقابها، ثمّ ربّبها من الأقدم إلى الأحدث:

الرّباعي - ديفوني - ترياسي - أيوسين - جوراسي.

تاسعاً: الشكل الآتي يمثّل تخطيطاً للتغيّر إت في الأحقاب الجيولوجيّة والمطلوب:

حدّد الفترة الزمنيّة لكلّ من الأرقام 1 - 3 - 7 - 11



مشروع الوحدة الأولى:

معرض علميّ إلكترونيّ للصّور الجيولوجيّة في البيئة

أهداف المشروع:

- يتمكّن الطّالب من تصنيف بعض الفازّات (التي وردت في كتابه المدرسيّ) والصّخور التي يتمّ جمعها من بيئات مختلفة على امتداد أراضي الجمهوريّة العربيّة السّوريّة.
 - يتعرّف الطّالب على طبيعة الصّخور في البيئات المختلفة بالتواصل مع بقية الزّملاء.
 - يتمكّن الطّالب من نشر ما توصّل إليه في وسائل التّواصل الاجتماعيّ ليطّلع عليها الجميع.
- ينمي الطّالب مهارة العمل الجماعيّ وتوزيع المهام ضمن طريقة العمل كلاً حسب اهتمامه
 (ينشر في السّحابة الإلكترونية، يبحث، يُعدُّ ملفات وورد أو مخطّطات على الاكسل).
 - ينمى الطّالب مهارات الشّابكة واستثمار برامج الحاسوب في العمل.
- إنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعيّ (صفحة فيس بوك Face Book أو قناة تليغرام أو Telegram أو واتساب wats App محدود العدد يصل إلى 275 فرد أو مجموعة مغلقة أو مجموعة مفتوحة) أو تصميم موقع إلكترونيّ ونشره ليتاح للجميع.

مراحل الاعداد والتّخطيط:

- يتمّ التّواصل بين عدّة مدرسين من المحافظات السّوريّة وتحديد (مخطّط المشروع، الجدول الزمنيّ، عدد المشاركين، أهداف المشروع، نشر النتاجات بعد تحديد طرق النّشر) لإعداد الصّفحة أو المجموعة على أحد مواقع التّواصل.
 - تتم دعوة الطّلاب إلى المجموعة وكذلك توضيح الهدف من إنشاء المجموعة.
- تتمّ عملية انتخاب مشرف للمجموعة من أحد المدرّسين أو المدرّسات ومشرف فرعيّ من كل محافظة من الطّلاب والمدرّسين.

مراحل تنفيذ المشروع:

- تعریف بالمشروع من خلال المشرفین و توضیح مهام أعضاء الفریق.
- تحديد وسائط التواصل وضم أعضاء الفريق إلى كافة مواقع التواصل المخصّصة للمشروع.
- تبدأ عمليّة تحميل الصّور لفازّات أو صخور من البيئة والّتي يتمّ تصويرها في نشاط لا صفّي في الوقت المحدّد وفق الجدول الزمنيّ (رحلة جماعيّة مدرسيّة أو نشاط فرديّ يقوم به الطالب) بعد أن يكتب على الصّورة اسم الفلزّ أو الصّخر وتصنيفه، أو المستحاثّة وتاريخ ومكان التّصوير.
 - يتم التوثيق و التأكّد من صلاحية الصورة ومدى خدمتها للمفاهيم العلمية من قبل المشرفين.
 - رصد نتائج المشروع ومدى أهميته.




الخلية

<u>ඉත්ව</u>මා


௵௵








- ا نسمع كثيراً في البرامج العلمية والأفلام عن الحموضِ النّوويّة.
- تحليلُ الـ DNA واستخدامُه في علمِ المستحاثّاتِ لتحديدِ درجةِ القرابةِ بينَ الأحياء.
- استخدامُ تحليل الـ DNA في تحديدِ هويةِ ضحايا الكوارثِ في حال غياب معالم الوجهِ.






المفاهيم الأساسيّة:

- الحموض النووية.
- .RNA والـ DNA
- الأسس الآزوتية والنكليوزيد والنكليوتيد.
 - المورثة والطفرة.

سأتعلّم:


- مفهوم الحموض النّووية.
- تحديد مكوّنات الحموض النّوويّة.
- تصنيف الحموض النووية وذكر دورها.
- المقارنة بين بنية RNA و بنية DNA.
 - استنتاج مفهوم المورثة وبيان دورها.
 - سرح كيفية حدوث الطّفرة.
 - استخلاص صفات المورّثة.



الحموض النوويّة (Nucleic Acids):

؟ أتساءل عن سبب: تسمية الحمضين DNA وRNA؟

▼ أنعم النظر في الشكل الآتي وأكتشف الاختلاف بين السكرين الخماسيين الآتيين:



الرّيبوز يدخل في بنية الرّيبوز منقوص الأكسجين RNA يدخل في بنية

اكـتشــفَ العـالــمُ أرويـنِ شــارغـاف الأسـسَ الآزوتيّـةَ فأثبت أن كمّيّةُ أسـس T تســـاوي كمّـيّــة أسـس T ويرتبط A مع T برابطتينِ هيـدروجينيتيــنِ، وكـمّيّــة أسس G تساوى كمّيّة أسس

صلة بتاريخ العلوم:

أول من عزلَ الحمضَ النّوويِّ DNA من نوى الكريّاتِ البيضِ في العالمُ فريدريكُ ميشر عام 1869، لذلك أطلقَ عليها اسمَ الحموضِ النّوويّةِ ثم اكتُشفُ وجودَها في بعض عضيّات الهيولي.

فــن العــام 1953- 1954

روابطً هيدروجينيّة.

قامـتُ العـالمـةُ روزالينـدا فرانكليـن والعالمُ مـوريس ويلكنــز عام 1953 بدراســة جزيئــة للـ DNA بوســاطـةً الأشعةُ السّينيّةِ وانكسارِها واســتنتجــا أنَّ الـ DNA لــه شكلُ حلزونى بقطر منتظم.

C ویرتبط G مے C بثلاث


في العيام 1954 قيام العالمان انفرنسيس كريك وجيمس واطسن بوضع نموذج لبنية جزيء الـ DNA بالاعتماد على الأبحاث السابقة ونالا جائزة نوبْل مع ويلكنز 1962.

تعلّمتُ: تَصنَفُ الحموضُ النّوويّةُ تبعاً لنوعِ السّكّرِ الخماسيِّ الدّاخلِ في تركيبها إلى:

1- حمضٍ نوويِّ ريبيٍ (Ribo Nucleic Acid): يدخلُ في تركيبِهِ الرّيبوز ويرمزُ له (RNA).

2- حمضٍ نوويًّ ريبيٍ منقوصِ الأكسجين (Deoxyribo Nucleic Acid): يدخلُ في تركيبِهِ الرّيبوزُ منقوصُ الأكسجين ويرمزُ له (DNA).


نشاط: ألاحظُ الشّكلَ الآتي وأتعرّفُ أنواعَ الأسسِ الآزوتيّةِ البيريميدينيّةِ والبورينيّةِ الدّاخلةِ في تركيب الحموض النّوويّةِ.



نشاط: أتأمّلُ الشّكلَ الآتي وأتعاونُ مع زملائي في معرفة اسم المركبِ النّاتج من اتّحادِ سكرٍ خماسيّ مع أساسِ آزوتيّ.

نشاط: أتعلمُ من الشَّكلِ الآتي مكونات النَّكليوتيدُ الدّاخلُ في تركيبِ الحموضِ النَّوويَّةِ.

النّكايوتيد الدّاخل في تركيب الحموض النووية هو ناتج عن اتّحاد النكايوزيد مع زمرة فوسفات واحدة، ولكن عندما يكون النّكايوتيد حرّ وغير مندمج في بنية الحموض النّوويّة يكون مرتبطاً مع 3 زمر فوسفات ويتشكل جزيء الـ ATP أو GTP.



- ▼ أتعاونُ مع أحد زملائي في إكمالِ ما يأتي: يدخلُ في تركيبِ الحموضِ النّوويّة:
- 2. الأسس الآزوتية (النيتروجينية): مركبات عضوية حلقية يدخل في تركيبِها، وتصنف حسب بنيتها الحلقية إلى زمرتين:

3. زمرةُ الفوسفاتِ: PO_4^{--} (تشتقُ من حمضِ الفوسفور) ويعطي الخواصّ الحمضيّة للحموض النّوويّة الـ DNA والـ RNA.

النّكليوزيد Nucleozide: جزيء سكّرٍ خماسيِّ ريبوز أو ريبوز منقوص الأكسجين مرتبطُ مع جزيء

النّكليوتيد Nucleotide: الوحدةُ البنائيّةُ الأساسيّةُ للحموضِ النّوويّةِ، ويتكوّنُ من جزيءِ سكّرٍ خماسيًّ ريبوز أو ريبوز منقوص الأكسجين مرتبط مع جزيءِ أساس أزوتيِّ وزمرةِ فوسفات واحدة.


نشاط:

أتعاونُ مع زملائي على رسمِ النكليوزيدات المكوّنة من سكّر الرّيبوز أو الرّيبوز منقوص الأكسجين مع الأسس الآزوتيّة:

(T) و(U) و(G)، ثمّ أُكْمِلُها إلى النكليوتيداتِ الموافقة

أربط مع الكيمياء:

يُعدُّ الأدينوزين ثلاثيّ الفوسفات ATP، مصدراً لطاقة التفاعلات الحيويّة في الخليّة، وكذلك يُعدُّ الغوانوزين ثلاثيّ الفوسفات GTP مصدراً للطاقة وخاصّة في أثناء عملية تركيب البروتين في الخليّة.





نشاط:

أَتعلَّمُ الموازنةَ بين بنيةِ السلسلةِ الخطيّةِ المفردةِ للحمضِ النّوويِّ DNA، والحمضِ النّوويِّ RNA، والحمضِ النّوويِّ RNA من حيثُ نوعُ النكليوتيداتِ المكوّنةِ لكلِّ منهما.

البنية الأوليّة للـ DNA:

ترتبط النكليوتيدات بعضها مع بعض بروابط استرية بين ذرتي الكربون '3 و'5 لنكليوتيدين متجاورين لتشكّل سلسلة خطية (العمود الفقريّ لجزيء الـ DNA)، وتربط أساس آزوتيّ بذرة كربون '1 في الرّيبوز منقوصِ الأكسجين، وتتميّزُ البنية الخطيّة بقطبيّة إذ تنتهي إحدى النهايتين بمجموعة فوسفات ترتبط بذرة الكربون '5 والتّانيّة ترتبط بزمرة هيدروكسيد بذرة الكربون '5 والتّانيّة





بنية جزيء الـ DNA (البنية الثّانويّة):

▼ أتأمّلُ الشكلَ المجاورُ وأكملُ فراغات بنية جزيء الـ DNA بالكلمات المناسبة:

يتكوّنُ حازونُ الـ DNA من متعاكستين ومتوازيتين تتكوّن كلّ منهما من تتالي إذ يكون العمودُ الفقريّ لكلّ سلسلة واقعاً إلى الخارج، والأسس الآزوتيّة تقع في الدّاخل، وتتمّمُ السّلسلتين بعضهما، وترتبطُ الأسسُ المتقابلة بروابطَ هيدروجينيّةٍ إذ يرتبطُ مع برابطتين هيدروجينيّة ِ إذ يرتبطُ برابطتين هيدروجينيّة.

أضيف إلى معلوماتي

جزىءُ الـ DNA ذو بنية صلبة إذ تأتى الصلابةُ من:

- العدد الهائل للروابط الهيدروجينية بين الأسس المتقابلة رغم ضعف تلك الروابط.
- 2. قوّةُ التّطابقِ بين الأسسِ تدعم هذه الصّلابةِ وتبقي المسافةِ ثابتةً بينَ السّلسلتين. وذلك بالتّقابل بين أساس بوريني وأساس بيريميدينيّ.
 - أما الرابطةُ الاستريةُ فإنها تزيدُ من تثبيتِ الرّبطِ بين السلسلتين المتقابلتين المتتامّتين.
- في سكّرِ الرّيبوز منقوص الأكسجين ترتبطُ ذرةُ الكربون '2 مع ذرةِ هيدروجين ممّا يعطي للسّلسلتين اليونـةُ تمكّنهما من الالتفافِ بشكلِ حلزونيّ.

خواصّ الـ DNA:

لحمضِ الـ DNA الخواصُّ والوظائفُ ذاتها لدى جميع الكائناتِ الحيَّةِ، لكنّه يختلفُ بعددِ ونوع وترتيبِ النّكليوتيداتِ الدّاخلةِ في تركيبِه.

1. القدرةُ على التّضاعفِ الذاتيِّ (التّضاعف نصف المحافظ):

▼ أنعمُ النظرَ في الشَّكل الآتي، وأنتبّع

آلية تضاعفِ الـ DNA الذي يتمُّ قبلَ


كلِّ انقسام للخليّةِ، بتباعدِ سلسلتا الـ

DNA عن بعضِهما وكلّ منهما تبني

نشاط:

استنتج

يتمُّ نقلُ المعلوماتِ الوراثيّةِ المخزنةِ في جزيء الـ DNA الأصلي إلى الجزيئتين الوليدتين بحيثُ تمتلكُ كلُّ خليّةٍ وليدةٍ (بنت) ذاتَ المعلوماتِ الوراثيّةِ للخليّةِ الأصلِ.



ا دور أنظيم الهيليكاز؟

2. تخزين التعليمات الوراثية:

المورثة (Gene): الوحدة الوظيفية البنيوية والفيزيائية الأساسية المعلومات الوراثية، وهي قطعة من إحدى سلسلتي الـ DNA، مكوّنة من تتالي محدّد لعدد كبير من النكليوتيدات المتعاقبة والمرتبطة ببعضيها خطّياً، وتُقرأ هذه النكليوتيدات كثلاثيّات متتالية كلُّ منها تسمّى شيفرة وراثيّة Genetic code، وهذه الشيفرات تحدّد عدد ونوع وتتالي الحموض الأمينيّة في البروتينات بشكليها البنائيّ والوظيفيّ مما يؤدّي إلى إظهار صفات الخليّة وبالتّالي صفات الكائن الحيّ.


3. إمكانية الإصابة بالطّفرة:

الطّفرةُ المورثيّةُ (Genetic Mutation): تغيرٌ مفاجئٌ ودائمٌ في المادّةِ الوراثيّةِ لتسلسلِ أسسِ الـ DNA. وتتضمّنُ استبدالُ أو حذفُ أو إضافةُ نكليوتيد أو أكثرَ، وتتعلّقُ بطبيعةِ العاملِ المحرّضِ للطفرةِ، الفيزيائيّ (الإشعاعيّ / الحراريّ) أو الكيميائيّ.

4. نقلُ التّعليمات الوراثيّة:


ينقلُ الـ DNA التّعليماتِ الوراثيّةَ من خليّةِ إلى أخرى ومن جيل إلى آخر.

- في التّكاثر اللاجنسيّ وفي عمليّاتِ النموّ وتعويضِ الخلايا التالفةِ وترميمِ الجروحِ:
- ▼ ألاحظُ الشكل الآتي الذي يوضّحُ كيفَ ينقلُ الـ DNA التّعليماتِ الوراثيّةَ من خليّةِ إلى أخرى.



في التكاثر الجنسي:

◄ ألاحظُ الشَّكلَ المجاورَ الذي يبينُ نقلَ الـ DNA التعليمات الوراثيّة من جيل إلى آخر.




بنيةُ جزىء الـ RNA:

يتكوّنُ من سلسلةٍ مفردةٍ خطّيّةٍ وهو جزيء متعدّدُ النكليوتيد له عمودٍ فقري مكوّنٍ من تتالي الفوسفات وسّكر الرّيبوز، والأسسُ الأزوتيةُ هي: A، U، C، G.


أنماطُ الـ RNA

1. الـ mRNA المرسال (Messenger RNA): يُنسَخ عن السلسلة الناسخة من الـ DNA، يشكّلُ



%5 من كميّة الـ RNA في الخليّة، جزيء مفرد السّلسلة، الوظيفةُ الرئيسةُ له حملُ التّعليماتِ الوراثيّة من النّواةِ إلى السّيتوبلاسما إذ يتمُ ترجمتُها إلى تتالي معيّنٍ من الحموضِ الأمينيّةِ عند تركيب البروتين. وكلُ ثلاثةِ نكليوتيدات منه تدعى رامزٌ (codon) وتحدّدُ حمضاً أمينيّاً.


▼ بالعودة للشَّكل الآتي أستنتج كيفَ يتمُّ نسخ طليعة (mRNA الأولي)؟ وكيف يتم نضجه؟



أضيف إلى معلوماتي


تتميّز المورّثات عند حقيقيّات النّوى بوجود مناطق مرمّزة تسمّى إكسونات (Exon) تتخلّلها مناطق غير مرمّزة تسمى إنترونات (Intron)، يتمّ نسخ المورّثة كاملة لتعطي طليعة السهماطق غير مرمّزة تحوض هذه الطليعة عمليّة نضج يتمّ فيها قطع الإنترونات ووصل الإكسونات المرمّزة إذ يتشكل السهرم النّاضج الجاهز لكي يترجم إلى بروتين.

2. الـ TRNA الناقل (Transfer RNA): يُنسَخ عن مناطق غير مورثيّة في الـ DNA، يشكّلُ حوالي % 15% من كميّة الـ RNA في الخلايا، يتألّفُ من سلسلة واحدة وهو أصغرُ حجماً من mRNA، تلتفُّ السّلسلةُ على نفسِها لتأخذَ بنيةً فراغيةً تشتملُ على ثلاثِ عرى ومناطقَ حلزونيّة مزدوجة تنشأُ نتيجةً للتتاميّة الجزيئيّة في بعضِ المناطقِ من السّلسلة وارتباطِ الأسسِ الآزوتية المتقابلة فيها بروابط هيدروجينيّة، يشبهُ ورقة البرسيم، يملكُ موقعين أحدُهما للتّعرُّف والارتباطِ بحمضٍ أميني محدّدٍ ويوجدُ في النهاية '3، أما الموقعُ الثّاني فهو للتعرُّف والارتباطِ مع الرامزِ الموجود على محدّدٍ ويوجدُ في بالرّامزِ المعاكسِ Anticodon ويوجدُ في مركزِ العروة 2.



3. الـ rRNA الرّيبوزومي (Ribosomal RNA):


يشكّلُ حوالي 80 % من كميةِ الـ RNA في الخلايا، يُنسخُ في النويّةِ ويُنتقلُ إلى السّيتوبلاسما إذ يرتبطُ مع البروتينتِ ليكوِّنَ الجسيماتِ الرّيبيةِ التي تشكّلُ الموقعَ الذي يتمُّ عليه تركيبُ البروتين.



No state of

أتساءل: يبلغُ طولُ المجموع الكليّ لشريطِ DNA في كلّ نواةٍ مترين، ويمكنُ لهذا الشّريطِ أن يتناسبَ مع الحجم الصّغيرِ للنّواةِ والذي يبلغُ بضعةً ميكرونات؟

بنيةُ الكروماتين Chromatin:



▲ أتعلّم كيف يتشكّل من الدّنا كلّ من الكروماتين والصبغى:

يتكونُ الخيطُ الكروماتينيُّ من الـ DNA وبروتينات أساسيّة تسمّى الهيستونات، إذ يتم رزمُ DNA حول الهيستونات في بنى هيكيليّة تسمّى الجسيمات النوويّة Nucleosomes فالهيستونات تعملُ كالبكرات يلتفُّ حولها حلزون الـ DNA، ويبدو الخيطُ الكروماتينيُّ في المجهر الإلكترونيّ كعقدِ اللؤلؤ، تمثّلُ كلّ حبّة لؤلؤ جسيماً نوويّاً، ويفصل كلّ جسيم نوويّ عن الجسيم الذي يليه بخيطِ من الـ DNA، ممّا يؤدّي تقاصرُ طولِ جزيءِ الـ DNA إلى الثّلثِ يتابعُ خيطُ الكروماتين ارتزامَه في خيطٍ أثخنَ مؤلّفٍ من عددٍ كبيرٍ من الجسيماتِ النوويّةِ المرتزمةِ بإحكامٍ شديدٍ، وعندَ دخولِ الخليّةِ مرحلةً الإنقسامِ فإن خيوطَ الكروماتينِ تتابعُ الرّزامَه المرتزمةِ المُثلِّلُ البنيةَ الأكثر ارتزاماً وتكثّفاً وهي الصّبغيات.

وبذلك تقوم بدورٍ مهمِّ في تنظيم التّعبير المورثيّ. فلا تعبّر المورثة عن نفسها وتحفظ الـ DNA من التّقطّع والضّياع.

نشاط:

أنعمُ النّظرَ في الشّكلِ السّابقِ، الذي يُظهرُ الالتفافَ اليمينيّ لسلسلتي الـ DNA، ثمّ أستنتجُ كيفيّة تشكّلِ الجسيماتِ النّوويّةِ التي تعطي خيطَ الكروماتين بدءاً من الـ DNA، ثمّ ارتزامِ الكروماتين لإعطاءِ الصّبغيّ.

أضيف إلى معلوماتي

تعتمدُ بنيةُ وشكلُ السكروماتين على حالةِ الخليّةِ والمرحلةِ التي تمرّ بها من الدّارةِ الخلويّةِ، في أثناءَ الطّورِ البينيّ يكونُ الكروماتين بشكلِ خيوطٍ منتشرةٍ وقليلةِ الالتفافِ والتكثّفِ وتسمحُ بذلك لأنظيم الـ RNA بولميراز والـ DNA بولميراز بأن يقوما بعمليّةِ النّسخِ والتّضاعفِ.

الصبغياتُ Chromosomes:

؟ لماذا دُعيتُ الصّبغياتُ بهذا الاسم؟ وما الوحدةُ الأساسيةُ في الصّبغيّ؟ وما دورُه في نقلِ التّعليماتِ الوراثيّة؟

جسيماتٌ قابلةٌ للتصبُّغِ (التَّلوُّنِ) الشَّديدِ، والصَّبغيُّ هو جزءٌ مفردٌ يشكلُ الـ DNA الوحدةَ الأساسيّةَ فيه، ويحمل على المورثاتِ في ترتيبِ خطّيّ، لذلكَ تُعرفُ الصّبغياتُ بنواقلِ المورثاتِ.



تعلّمت:

الحموضُ النّوويةُ: مركّباتٌ عضويّةٌ ذات خواصّ حمضيّة، مكوّنةٌ من تتالي النّكليوتيداتِ بشكلٍ خطّيّ، تشكلُ هذه النّكليوتيدات الجزء الأساسيّ من بنيتِها، وإنَّ عددَ ونوعَ وترتيبَ النّكليوتيداتِ في الحمضِ النّوويّ له الدّورُ الرّئيسُ في التّرميزِ للمعلوماتِ الوراثيّةِ، وتوجدُ في نوى الخلايا وفي بعض عضيّات الهيولي وتدخلُ في تركيبِ الصّبغياتِ، وتعدُّ المادّةُ الوراثيّةُ عندَ الكائناتِ الحيّةِ.

التّقويم النّهائيّ

أولاً: أجيبُ عن الأسئلة الآتية:

- 1. ما أنواعُ الحموض النوويّةِ؟ وما الأساسُ الذي اعتمدَ في تصنيفِها؟
 - 2. ما الفرقُ بين بنية هيكل البير بميدين و هيكل البورين؟
- 3. ممّ يتكوّنُ كلُّ من: النّكليوزيد النّكليوتيد السّلسلة الخطّيّة المفردة لحمض DNA وحمض **?RNA**
 - 4. ما المقصودُ بالطُّفرة المورثبّة؟ وما أسبابُها؟
 - 5. ما الفرقُ بينَ الشَّبفرة و الرَّامز؟

ثانياً: أعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ مما يأتى:

- 1. تمتلكُ النّواةُ في كلِّ خليّة ناتجة عن الانقسام الخيطيّ المعلومات الوراثيّة ذاتها للخليّة الأصل.
 - 2. تعطى البيضةُ الملقّحةُ بعدَ النّمو والتّمايز فرداً جديداً يملكُ صفات وراثيّة من الأبوين.
- 3. عددُ النّكليوتيدات في mRNA أقلُّ عدد من النّكليوتيدات الموجودة في DNA المورثة النّاسخة.

ثالثاً: ما المقصودُ بكلِّ ممّا بأتي؟

المورِّثة - الإكسونات - الإنترونات - الصّبغيّات.

رابعاً: أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ لكلِّ ممّا يأتى:

1. اكتشف العالمُ أروين شار غاف:

أ- الشّكلَ الحلزونيّ لله DNA.

ب - الحموضَ النّوويّة في النّواةِ. د - بنيةَ جزيء الـDNA.

ج - ارتباط الأسس الآزوتية بروابط هيدروجينية.

2. يُسمّى التفافُ (رزمُ) حلزون الـ DNA حولَ بروتيناتِ الهيستون:

أ- صبغيّ. ب ـ إكسون

د ـ مور ِّثة.

ج - جسيم نوويّ.

3. الوحداتُ البنائيّةُ الأساسيّةُ لكلِّ من حمض الـ DNA والـ RNA:

أ- سكر الرّيبوز. ب - الفوسفور ج - النّكليوتيدات د - البيريميدينات.

4. الأنظيم الذي يعمل على فك وفصل السلسلتين في جزيء الـ DNA في أثناء التضاعف:

أ- أنظيم DNA بوليميراز. ب - أنظيم هيليكاز.

ج - أنظيم الـ DNA البادئ. د - أنظيم الـ RNA بوليمير از.

خامساً: أقارن بين الـ DNA و الـ RNA من حيث:

شكلُ الجزيءِ - نوعُ السّكرِ الخماسيّ الدّاخلِ في تركيبِها - الأسسُ الآزوتيّة.

أبحثُ أكثرَ في القضيّةِ الآتيةِ:

يوصفُ الـ DNA بأنَّه مفتاحُ الحياة الشَّامل؟ ما رأيُك بذلك؟ فسر إجابتك.





المفاهيم الأساسيّة:

- الدّارة الخلوية.
- العددُ الصبغيُّ والصّيغةُ الصبغيّةُ.
 - الانقسامُ الخيطيّ.
 - الانقسامُ المنصّفُ.

سأتعلّم:

- مفهومُ الدّارةِ الخلويةِ.
- الرّبطُ بينَ الصّبغياتِ والصيغةِ الصّبغيّةِ.
- ترتيب أدوار الانقسام الخيطي والانقسام المنصف والأحداث المميزة لكل دور.
- المقارنة بين انقسام خلية حيوانية وانقسام خلية بناتية.
- توضيحُ أَهميةِ الانقسامِ الخيطيِّ والانقسامِ المنصِّف بالنسبة للكائنات الحيّة.



- الماذا يسمى الانقسام عند الجراثيم بالانقسام المباشر؟
 - ? ما نوعا الانقسام لدى الأحياء حقيقيّات النّوى؟
- لا تحتوي الخلية النباتية على جسيم مركزي، فكيف تفسّر انقسامها؟

بدأت حياتنا من خلية واحدة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. إ كيف تحولت إلى مضغة، ثم إلى ملايين الخلايا في الجنين؟ ماذا يحدث إذا لم تنقسم الخلية واستمرّت بالنّموّ؟ ما المراحل التي تمرّ بها الخلية في أثناء انقسامها؟ عاذا نسمي الفترة الزّمنية الفاصلة بين انقسامين متتاليين؟

للانقسام نوعان:

- مباشرٌ يحدثُ عندَ الجراثيم.
- وغيرُ مباشرِ (يحدث في حقيقيّات النّوى) كالانقسام الخيطيّ والانقسام المنصّف.

الدّارةُ الخلويّةُ The cell cycle:


تشتملُ الدارةُ الخلويّةُ على طورين هما:

- 1. الطّورُ البينيّ (Interphase):
- 2. طورُ الانقسام: ويتضمّن: الانقسامُ النّوويّ "الخيطيّ" (Mitosis).
- الانقسامُ السّيتوبلاسمي (Cytokinesis).



نشاط:

▼ أتعرفُ من الصورةِ الآتية على طوري الدّارةِ الخلويّةِ وماذا يحدثُ في كلّ منهما؟ ثمّ أملاً الجدولَ أسفل الصّفحة لأهمّ الأحداثِ لكلّ دوره.



أهم أحداثه	الدّور		
	دورُ النّموّ الأوّل	G1	الطّور ا
	دورُ التَّركيبِ	S	البيني
	دورُ النّموِّ الثّاني	G2	
	الانقسامُ النَّوويّ	M	طور الإنق
	الانقسامُ السّيتوبلاسمي	C	7 7



الصّبغيّات Chromosomes:

أتأمّلُ الصّورتين الآتيتين، ثمّ أُجِيبُ عن الأسئلةِ الآتيةِ:

Haploid Cells (n)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	<	. >	(. (ι
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1	2	3	4	5
11 12 13 14 15	(•	C	3	(
f f 1 1 1	6	7	8	9	10
f f 1 1 1)	(Ĺ	L	ł
16 17 18 19 20	11	12	13	14	15
16 17 18 19 20	•		ŧ		
1 1 5	16	17	18	19	20
		1	5		
21 22 X	21	22	X		

Diploid Cells (2n)

X	%	K) (JJ 5
K	} \$	(C	9	10
)) (J C 13)	I 15
) (16)	18	19	20
21	22	5 ۱ XY		
		0		


- ? ماذا تمثَّلُ الأشكالُ في الصّورةِ السّابقةِ؟
- الصرورة الثّانية؟ الشّفاع في الصورة الأولى؟ وأيُّ شفع هو الأطولُ؟ ولماذا توجدُ نسخةٌ واحدةٌ في الصّورة الثّانية؟
 - ؟ كيفَ تظهرُ الصّبغيّاتُ في أثناءِ الدّارةِ الخلويّةِ؟


إنها الصّبغيّات، وترقَّمُ بدءاً من الأطولِ إلى الأقصرِ، تظهرُ في الطّورِ البيني للخليّةِ على شكلِ خيوطٍ متشابكةٍ تسمّى كروماتين Chromatin وتظهرُ في أثناءِ انقسامِ الخليّةِ كتراكيبَ عصويّةٍ بأشكالٍ مختلفةٍ قابلةٍ للتلوينِ تسمّى الصّبغيّات Chromosomes.



الصّيغةُ الصّبغيّةُ Ploidy:

نشاط:





• يوجدُ في نوى بعضِ الخلايا أكثرُ من نسختينِ شكليتينِ من كلِّ صبغيّ تُدعى الصّيغةُ الصّبغيّةُ المتعدّدةُ (4n, 3n) وهي شائعةٌ لدى النّباتِ لكنّها نادراً ما تُلاحظُ لدى البشرِ، على الرغم من أنّها تحدثُ في بعض الأنسجة مثل الكبد.

دودة الإسكارس	البعوض	الملفوف	الكلب	الستّمك المونوليزي	نبات تمر حنة	الإنسان	الكائن الحيّ
2	6	18	78	46	46	46	العدد الصبغيّ

- ? أفسرُ: لا يتحدّدُ النّوعُ بعددِ الصّبغيّاتِ.
- الخلايا؟ وهل تنقسم جميع الخلايا؟ وهل تنقسم الخلايا بالوتيرة ذاتها؟

بعضُ الخلايا تنقسمُ باستمرارٍ كبطانةِ الأمعاءِ، وبعضُها تنقسمُ في فترةٍ محدودةٍ (متى يتوقّفُ انقسامُ غضاريفِ النّموّ؟)، وبعضُها تنقسمُ في ظروفٍ معيّنةٍ عند الحاجةِ لخلايا جديدةٍ مثلَ خلايا الكبدِ، وبعضُها لا تنقسمُ أبداً مثل بعض الخلايا العصبيّة (لماذا تتوقّفُ الخلايا العصبيّةُ عن الانقسام؟).


الانقسام الخيطيّ (المتساوي) (Mitosis)

أفكرُ قبلَ دراستي لهذا الموضوعِ محاولاً الإجابة عن الأسئلةِ الآتيةِ ثمّ أحتفظُ بها حتّى إنهاءِ دراستى للانقسام:

- ? كيفَ تنمو أجسامُ الكائنات الحيّة؟
- ؟ كيفَ تقومُ أجسامُ الكائناتِ الحيَّة بتعويض أنسجتها وخلاياها التّالفة؟

نشاط:

◄ أَلاحظُ الشّكلَ الآتي الذي يمثّلُ الأدوارَ الأربعةَ لطورِ الانقسامِ في الدّارةِ الخلويّةِ، ثمّ أستنتجُ بالاعتمادِ
 على الشّكل التبدّلاتِ في كلِّ دور:




- ا الأدوارُ الأربعةُ لطور الانقسام؟
- العددِ الصّبغيّ للنوّع؟ عا سببُ ثباتِ العددِ الصّبغيّ للنوّع؟

الدّورُ الأوّلُ (الطليعيّ) Prophase: أهمُ التّغيّراتِ الحاصلةِ في النواةِ والهيولى.

نشاط:

◄ ألاحظُ الشكلَ الآتي الذي يمثلُ التبدلاتِ في الدورِ الأولِ للانقسامِ الخيطيّ، ثمَّ أَملأُ الفراغاتِ بالكلماتِ المناسية:



تبدلاتُ النّواقِ: تظهرُ واضحةً نتيجة الالتفافِ الحلزوني الأوّلي والثانويّ الكروماتين.

- یتکون کل صبغی من خیطین مرتبطین مع بعضیهما فی یدعی کل خیط منهما (صبیغی).
- تبدأ النوية أو النويّات التدريجي،
 ويتجزّأ الله الدّور.

أضيف إلى معلوماتي

نميز نوعين من الخيوط في المغزل:


- 1. الخيوط الحركية (الحاملة): ترتبط (الأنيبيبات) بالجزء المركزيّ لكلّ صبغي من جهة المحرّك.
- الخيوط القطبيّة (الواصلة): تمتدّ بين الجسيمين الكوكبيين الموجودين في قطبي المغزل.

تبدلاتُ الهيولى: يتضاعفُ الجسيم المركزيّ Centrosome قربَ النواةِ، ويتشكّلُ الكوكبيان من المريكزين والمادّةِ الهيوليةِ الكثيفةِ المحيطةِ بهما، يهاجرُ كلٌّ منهما إلى أحدِ قطبي الخليّةِ، تنمو وتمتدُّ بينهما شبكةٌ من الخيوطِ مشكّلةً الكوكبيّ.

الدّورُ الثاني (الاستوائيّ) Metaphase:

نشاط:


▼ ألاحظُ الشَّكلَ الآتي الذي يمثلُ التّبدلاتِ في الدّور التّاني للانقسام الخيطيّ، ثمّ أ<mark>ملا</mark>ً الفراغاتِ بالكلماتِ المناسبة



- تبدو
 واضحة بسبب و صولها (..... الاستوائية).
- في نهايةِ هذا الدور يكونُ كلّ صبغيّ من الصّبغيّات مؤلّفاً من صبيغيّين أخوين منفصلين بشكل طولى ومتصلين بالـ

إلى أعلى درجات التّكثف والتّقاصر، وتتوضّع على المغزلِ في منتصفِ الخليّةِ

المركزيّ، وينشطر الجزء المركزيّ ممّا يؤدّي إلى تحرر ليصبح كلٌّ منهما منذُ الآن صبغبّاً و احداً



أضيف إلى معلوماتي

إنّ الانقسامَ في الخلايا النباتية يُدعى

بالانقسام اللاكوكبي؛ لأنَّه يتشكلُ فيها

قلنسوتان قطبيتان بدل الجسمين الكوكبيين

في قطبي الخلية المنقسمة.

الدّور الثّالث (الهجرة) Anaphase:

نشاط:

◄ ألاحظُ الشَّكلَ المجاور الذي يمثِّلُ التّبدلاتِ فى الدور التَّالثِ للانقسام الخيطي، ثم أملأً الفراغات بالكلمات المناسبة:




- يتمُّ اختز الُ الـ (DNA) التي تضاعفَتْ في بسببِ هجرةِ الصّبغيّاتِ.
- يتطاول المغزل نتيجة تطاول الواصلة ...
- تختفي الخيوطُ الحركيّةُ بسببِ
 وتُجْمَعْ الصّبغيّات في القطبين.

هل تعلم؟

المحرك: بنية بروتينية تتجمّع على الجزء المركزي للصبغي إذ يرتبط مع الخيوط الحركية، ويؤدي دوراً في انفصال الصبغيات، وهجرة في انفصال الصبغيات، وهجرة الصبغيات عن طريق تفكيك لبروتينات الأنيبيات الدقيقة ممّا يؤدي إلى تحرّك الصبغي باتجاه القطب الذي تتجه نحوه.

أضيف إلى معلوماتى


إنَّ مادة الكولشسين تمنع تشكّل خيوطِ مغزلِ الانقسام اللالوني (تُبلمرُ الأنيبيباتِ)، وتُستخدمُ في التقاناتِ الحيويةِ الحديثة لإنتاجِ نباتاتٍ مضاعفةِ الصيغةِ الصّبغيّةِ، كالقمحِ الرّباعي كما تُستخدمُ في علاجِ مرض حمّى البحر المتوسّط ومرض النقرس.




الدّورُ الرّابعُ (النّهائيّ) Telophase:

نشاط:

الاحظُ الشّكلَ المجاور الذي يمثّلُ التبدلاتِ في الدورِ الرّابعِ للانقسامِ الخيطيّ ثمّ أمللأ الفراغاتِ:



- يزول شكل الكروماتين.



يحدثُ الانقسامُ السيتوبلاسمي Cytokinesis لخليةٍ حيوانيّةٍ وخليّةٍ نباتيّةٍ كما في الجدولِ:

الخلايا الحيوانيّة النباتيّة

يبدأ الانقسام الهيولي بواسطة بناء حاجز في المستوى الاستوائي يُدعى الصّفيحة المتوسّطة التي تقسم الخليّة لخليتين، تنشأ من حويصلات غشائيّة تأتي من جهاز غولجي.

يتشكّلُ انخماصٌ (تخصر) في غشاءِ الخليّةِ المنقسمةِ عموديّاً على المغزلِ في المستوى الاستوائي، ثمّ يتعمّقُ هذا الانخماصُ تدريجيّاً نحوَ الدّاخلِ حتّى يقسمَ الخليّة لخليّتين بنتين.

.أستنتج


إنَّ أهميه الانقسام الخيطي للأحياء تكمنُ في:

- 1. يسبقُ الانقسامَ تضاعفُ (DNA) الصبغيّاتِ، وينتجُ منه خليّتان لكلِّ منهما نواةً فيها العددُ الصبغيُّ نفسُهُ للخليّةِ الأصلِ، وبالتّالي فإنَّ هذه الخلايا تحملُ المعلوماتِ الوراثيّةَ نفسَها الموجودةَ في الخليّةِ الأصلِ.
 - تأمينُ الزّيادةِ في عددِ الخلايا اللازمةِ للنّموِّ.
 - 3. تعويضُ الخلايا التّالفةِ، وترميمُ الجروح.
 - التّجديدُ لدى بعض الأحياءِ.
 - 5. التّكاثرُ اللاجنسي عند وحيداتِ الخليّةِ.

الانقسام المنصف (Meiosis)

- ا الساءل عن سبب: عدم تضاعف العدد الصبغي عند الأحياء من جيل لآخر رغم حدوث الإلقاح.
- ? أتساءلُ عن سبب: احتواءِ الأعراس نصفَ عدد الصّبغيّاتِ الموجودة في الخلايا الجسميّة 2n.

يطرأ على الخلايا الأم المولّدة للأعراس انقساماً منصفاً في الأحياء التي تتكاثر جنسيّاً، ففي النّباتات اللازهريّة يطرأ على الخلايا الأمّ المولّدة للأبواغ، وفي النّباتات الزّهريّة عند مغلفات البذور يطرأ على الخلايا الأمّ لحبّات الطّلع والخليّة الأمّ للكيس الرشيميّ، وفي الخصيّة والمبيض لدى الإنسان لإنتاج النّطاف والبويضات.



▲ نشاط: أَدْرسُ الشّكلَ السّابقَ الذي يمثّلُ الانقسامَ المنصّفَ في الدّارةِ الخلويّةِ المؤلّفَ من انقسامين متتاليين لا يوجدُ بينهما طورٌ بينيّ ثمّ أستنتجُ من الشّكلِ التّبدّلاتِ في كلّ منَ الانقسامين:

الانقسامُ المنصّفُ الأولُ ا



1. الدّورُ الأوّلُ (الطّليعيّ) Prophase I!

بالاعتمادِ على الشَّكلِ المجاورِ أملاً الفراغاتِ بالكلماتِ المناسبة:

طولُ الأدوارِ في بدايتِهِ تتضخّمُ النّواةُ، ويتضاعفُ
قربَ قربَ الجسيمين
، وفي نهايتِ مِ تختفي
، يقترب كلُّ صبغي من قرينِهِ وتنتظمُ
مثنى مثنى، ثمّ ينشطرُ كلّ منهُما طولياً
لىيربطُهُما، فتظهرُ خيوطٌ
رِباعيّةٌ، ويبدأُ

أضيف إلى معلوماتي

- في مرحلة الرّباعيّاتِ الصّبغيّةِ، ونتيجة قربِ الصّبغيّاتِ من بعضِها، قد يحدثُ تصالبٌ بين الصّبيغيّين الدّاخليين من كلّ صبغيّين قرينين، ثمّ تقطعُ ويعادُ التحامُهما بصورةٍ متبادلةٍ وتُدعى هذه الظّاهرةُ بالعبورِ (Crossing over).
 - لظاهرة العبور أهميّة في ظهور تراكيب وراثيّة جديدة (التّنوعُ الوراثيُ).



2. الدورُ الثّاني (الاستوائي) Metaphase I.

تتوضع الرّباعيّاتُ السّابقةُ في (اللّوحة الاستوائية).



3. الدورُ الثّالثُ (الهجرة) Anaphase I:

يهاجر كلُّ يبدو منشطراً عن قرينِه الآخر إلى أحدِ الخليّة، يحصل نتيجة هذه الهجرةِ تنصيفُ العددِ مع بقاءِ الـ DNA مضاعفاً.




يتشكّلُ غشاءٌ في كلِّ قطبٍ حولَ كلِّ مجموعةٍ عند تشكلِ النّطاف، بينما لا يتشكّلُ غشاءٌ عند تشكّلِ البويضاتِ، وفي كِلا الحالتين يحدثُ انقسامٌ سيتوبلاسميّ مشكّلً أحاديّتا الصّيغة الصّبغيّة.



الانقسامُ المنصّفُ الثّاني (متساوٍ) Meiosis II

- ادرس الشتكل المقابل والذي يمثل الانقسام المنصف الثاني، ثم أملأ الفراغات بالكلمات المناسبة:
- يشابه إلى حدِّ كبيرٍ الانقسامَ الخيطيَ، باستثناءِ عدمِ وجودِ طورِ
- تتالى الأدوارُ الأربعةُ، فتعطى كلَّ خلايا خلية خلينين، فتنتجُ أربعَ خلايا الصّيغةِ الصّبغيّةِ بدءاً من الخليةِ الأمِّ 2n.





الانقسام السنيتوبلاسميّ Cytokimesis:


فيي أثناء تكوين الأعربية تتوزع الأعرباس الذّكرية تتوزع السيتوبلاسما فيها بشكل متساو، فتكون جميعها فعالةً أميا في أثناء تكوين الأعراس الأنثوية فيلا تتوزع السّيتوبلاسما بالنّساوي، إذ يتجمّع معظمُها في خليّة واحدة

(بويضة)، أمّا الخلايا الثّلاثُ الأخرى (كريّات قطبيّة) فإنّها تضمحلُ وترولُ عادةً.

◄ ألاحظُ في الشّكلِ المجاور، تشكلَ النّطافِ والبويضةِ بالانقسام المنصف.

▼ أتعلَّمُ الموازنةَ بينَ الانقسام المنصِّفِ الأوّلِ والثّاني من حيثُ، المراحلُ والوظيفةُ كما في الجدول الآتي:

الانقسام المنصّفُ الثاني	الانقسام المنصنف الأول	الموازنة
الأدوارُ الأربعةُ المشاهدةُ في الانقسامِ المنصّف II (المتساوي) لا يسبقُها طورٌ التّركيب S	الأدوارُ الأربعةُ المشاهدةُ في الانقسام المنصّف I يسبقُها طورٌ بينيّ	المراحل
اختزالُ كمية الـ (DNA) التي تضاعفت في الطّور البينيّ الأول	اختزالُ العددِ الصّبغيّ إلى النّصفِ	الوظيفة
لا تحدث	قد تحدث	حادثة العبور





أضيف إلى معلوماتي

الجرع الانتهائي أوالتياومير (Telomere): ينتهاي كلُّ ذراع الصبغي بجزء انتهائي (تيلومير) الصبغي بجزء انتهائي (تيلومير) الصبغيّات والمحافظة على بنيتها سليمة وتلعب دوراً مهماً في ثبات الصبغيّات مع بعض، كما تربط بروتينات معيّنة تحميها من أن تُهضم بالأنظيمات الموجودة في الخليّة، وهنالك أدلة الموجودة في الخليّة، وهنالك أدلّة مرتبط مع الشيخوخة وكذلك مع تكون مرتبط مع الشيخوخة وكذلك مع تكون الخلايا السرطانيّة.

تعلمت: إنَّ أهميّة الانقسام المنصف تكمن في:


- 1. تنصيفِ عددِ الصّبغيّاتِ، ممّا يحافظُ على عددِ الصّبغيّاتِ في النوع رغمَ حدوثِ الإلقاح.
- ينصيفِ الصّيغةِ الصّبغيّةِ من 2n للخلايا الأمِّ إلى الصّيغةِ الصّبغيّةِ 1n للأعراسِ.
- 3. لهُ أهميّةٌ كبيرةٌ في التّنوّعِ الوراثيّ (تطور الأنواع)وذلك من خلال:
- أ العبورِ الذي يحدثُ في الدّورِ الأوّلِ من الانقسامِ المنصّفِ الأوّلِ.
- ب التّرتيب العشوائيّ (المستقلّ) للصبغيّاتِ القرينةِ على الخيوطِ الحاملةِ.
- ج اتحادِ الأعراسِ عندَ الإلقاح بصورةٍ عشوائيةٍ.

التّركيب الكيميائيّ للمادّة الوراثيّة:

يتكوّن الصبغيّ من الـ DNA والبروتين، تمّ من تجارب عدّة توضّح دور الـ DNA في نقل المعلومات الوراثيّة واستبعد دور البروتين في نقل المعلومات الوراثيّة من أهمّها:

1. تجربة غريفث:

▼ ألاحظ الشَّكل الآتي الذي يبيّن مراحل تجربة غريفث.



استخدمَ الطّبيبُ غريفت جراثيمَ المكوراتِ الرّئويّةِ إذ ميَّزَ سلالتين:


- الأولى: ممرضة لها محفظة مكوّنة من سكّريّاتٍ متعدّدةٍ، تظهرُ مستعمراتُها بمظهرٍ أملس (Smooth) يُرمزُ لها اختصاراً (S).
- الثانية: غير ممرضة، ليسَ لها محفظة يسهلُ على الكرياتِ البيضِ بلعمتها، تظهرُ مستعمراتُها بمظهرٍ خشنٍ (Rough) ويُرمزُ لها اختصاراً (R).
- ◄ من الشكل السّابق الذي يبيِّنُ مراحل تجربة غريفث، أستنتج سبب موت الفئران المحقونة بمزيج من السّللة (R) الحية، و (S) المقتولة بالتّسخين.

أستنتج غريفت: إن الجراثيمَ الميتةَ من النّمطِ (S) قد حوَّلَتْ الجراثيمَ الحيَّةَ من النّمطِ (R) إلى جراثيمَ حيّةِ من النّمطِ (S).

أي:
$$(S) \leftarrow (R) + (R)$$
 ميت $(S) \leftarrow (S)$

2. تجربة أفرى، مكليود، مكارثى:

◄ أُلاحظُ الشّبكلَ الآتي الذي يبيِّنُ طريقة إثبات كلٌّ من أفري مكليود مكارثي أنَّ المادَّةَ الوراثيّة هي السروتين.



- ؟ كيف أثبت كلِّ من أفري ومكليود ومكارثي أنَّ البروتين لا يحمل التعليمات الوراثية؟
- ؟ كيف أثبت كلٌ من أفري ومكليود ومكارثي أنّ المادة الوراثية هي الـ DNA؟

لاحظ أفري وزميلاه: أنَّ قتلَ السَّلالةِ الجرثوميةِ الممرّضة (S) بالحرارةِ يؤدي إلى تقطيع الصّبغي، وخروج القطع من

المحفظة، ولدى دمج السّلالة غير الممرضة (R) معها، تدخلُ كسراتٌ من الـ DNA المتأتيّة من النّمطِ (S) وتندمجُ مع صبغيّ السّلالةِ (R) محدثةً التّحوّل الجرثومي.

أي:
$$DNA$$
 من (S) ميت (R) حي.

التّقويم النّهائيّ

أولاً: أُجيب عن الأسئلةِ الآتيةِ:

- 1. ما نوعا خيوطِ مغزلِ الانقسام؟
- 2. كيفَ تبدو النّواةُ في نهايةِ الدّورِ الطّليعيّ؟
- 3. أين تتوضّعُ الصّبغيّاتُ في الطّورِ الثّاني؟ ومتى يصبحُ الصّبيغيُّ صبغيّاً؟ ولماذا؟
 - 4. ماذا ينتجُ عن هجرةِ الصّبغيّاتِ في الطّورِ الثّالثِ للانقسامِ الخيطيّ؟

ثانياً: أُعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتى:

- 1. يُسمّى الانقسامُ عندَ النّباتاتِ الرّاقية بالانقسامِ اللاكوكبيّ.
- 2. لا يتضاعفُ العددُ الصّبغيّ عندَ الإنسانِ في أثناءِ التّكاثر الجنسيّ رغمَ حدوثِ الإلقاح.
 - 3. تكونُ صبغياتُ الدور الثّاني من الانقسام الخيطيّ واضحةً جداً.
 - 4. تعدّ عملية تضاعف جزيء الـ DNA مهمّة للكائن الحيّ.

ثالثاً: أقارن بين:

- الانقسام الخيطي في خلية نباتية وأخرى حيوانية في جدول من حيث:
 تشكّلُ المغزل الانقسامُ السّيتوبلاسمي.
 - 2. الانقسام الخيطي المتساوي والانقسام المنصف من حيث:

الخلايا التي يطرأ عليها - الهدفُ العام من الانقسام - عددُ الخلايا النّاتجةِ - الصّيغةُ الصّبغيةُ للخلايا النّاتجة.

رابعاً: أختارُ الإجابةَ الصّحيحةَ لكلِّ مما يأتى:

1. إحدى مراحل الطّور البينيّ تُشكلُ فيها الخليّةُ احتياطيّاً من الطّاقةِ:

أ- G1. ب- S. ج- G2. د- الطّور البينيّ.

2. دورُ بروتيناتُ المحرك في انقسامِ الخليّةِ هو:

أ- تنظمُ DNA الصّبغيّاتِ في تراكيبَ عاليةِ التّكثيفِ.

ج - ربطُ الأنيبيباتِ الدّقيقةِ بالجزءِ المركزيّ.

ب- تماسك DNA الصّبغيّاتِ. د - تضاعفُ الـ DNA.

3. تحرر الصبيغيات إلى صبغيّات يحدث في الدّور:

أ- البينيّ. ب- الطليعيّ. ج - الاستوائيّ. د - الهجرة.

4. أجري فحصاً لخليّة ما تحت المجهر ولوحظ أنّ الصّبغيّات قصيرة وتصطف وسط الخليّة مثنى مثنى مثنى مثنى ما اسم دور الانقسام الحاصل في الانقسام المنصّف الأوّل لهذه الخليّة؟

أ- بداية الدور الأول. بداية الدور الاستوائي.

ج - نهاية الدور الأول. د - بداية الدور الاستوائي.

5. ما سبب تباعد الصبغيّات باتجاه قطبيّ الخليّة في الانقسام المنصّف؟

أ- توجه المريكزات نحو القطبين. ب- تخصر الخليّة.


ج - تقاصر الخيوط الحاملة. د - العبور.

6. تحدث عملية التّضاعف لجزىء الـ DNA في الدّارة الخلويّة والدّور:

اً- G0. ب - G1. ج- G2.

أبحثُ أكثرَ

- في مصادر المعرفة عن مرض السرطان ولماذا تثبّطُ معظمُ الأدويةِ المستخدمةِ لعلاجِ السرطانِ تشكّلَ مغزلِ الانقسام الخيطيّ؟ وما تأثيرُ ذلكَ على الخلايا السرطانيةِ؟
 - أقارن بين الورم الحميد Benign Tumor والورم الخبيث Malignant Tumor
 - أعرض دراستي في الصنف وأعرضها في مجلة حائط المدرسة.





المفاهيم الأساسية:

- الشّيفرة الوراثية.
 - الرّامزُ.
- الرّامزُ المعاكسُ.
- الجسيم الريبي.
- الميتونين المعدَّلُ.


سأتعلّم:

- الية ترجمة المعلومات الوراثية.
- أهمية تركيب البروتين في الخلية.

تَميَّزَ كُلُّ كَائِنٍ حيٍّ بمجموعةٍ من الصّفاتِ الوراثية وهذه الصّفاتُ ناتجة عن ترجمة مورثاتِ محمولة على صبغيّاتٍ تتوضّع في نواة الخليّة.

نشاط:


◄ ألاحظُ الشكلَ الآتي الذي يبيّنُ الفرقَ بين هيمو غلوبين لشخص سليم (طبيعيّ) وشخصٍ مصابٍ بفقرِ دم منجليّ (sickle - cell anamia)، ثمّ أجيبُ عن الأسئلةِ الآتيةِ:





هيمو غلوبين فقر دم منجلي

هيمو غلوبين طبيعي



- المورثة ترمز تركيب بروتين معينٍ ممّا يؤدّي إلى ظهور صفةٍ وراثيّةٍ معيّنةٍ.
- 2. المورّثةُ تحدّدُ نوعَ البروتين من حيثُ عددُ ونوعُ وترتيبُ الحموضِ الأمينيّةِ الدّاخلةِ في تركيبِهِ.
- يوجدُ تغيُّرُ نيكلوتيد واحدٌ في سلسلة DNA المشفرة ما هو؟
- التأثير هذا التغير في السلسلة الببتيدية التي أشرفت المورثة على تركيبها؟ وماذا تستنج من ذلك؟
- ؟ ماذا يُسمّى هذا التّغيرُ الوراثيُّ؟ وماذا يُسمّى المرضُ النّاتجُ عنه؟




RNA transcript (pre-mRNA)

RNA PROCESSING

CYTOPLASM

▼ أنعمُ النظرَ في الشَّكلِ الآتي وأستنتجُ خطوات تركيب البروتين:



1. المركباتُ التي تُسهمُ في تركيبِ البروتين:

2	DNA .1
4. الجسيمُ الرّيبيّ.	

2. مرحلتا تركيبِ البروتين:

تتمُّ في	نسخُ التَّعليماتِ الوراثيَّةِ	.1
تتمُّ في السيتوبالاسما.		.2

الماذا لا يتم تركيب البروتين في نواة الخلية؟

UACGGC

AUGCCGAG


الشكل رقم (1)

مراحلُ تركيب البروتين:

تتمثّل عمليّة تركيب البروتين في تحويل تسلسل معيّن من النكليوتيدات من السّلسلة المشفّرة على جزيئة السكلة المسلة المستقرة على جزيئة السكل المي مرحلتين أساسيتين هما: النسخ والترجمة.

أولاً: نسخُ التعليماتِ الوراثيةِ Transcription:

يقوم أنظيم RNA بولمير از بنسخ سلسلة mRNA مرسال من بداية المورّثة (سلسلة DNA المرصاف)،
 إذ يشرف على إدماج النكليوتيدات الحرّة حسب قاعدة تقابل الأسس الأزوتيّة.



2. بالعودة إلى الشّكل رقم (1) استنتج مكان خروج RNA المرسال إلى الهيولى؟

أضيف إلى معلوماتي (عمليات معالجة mRNA)


تبين أن سلسلة الـ mRNA التي يتم نسخها عن جزيء الـ DNA القالب تسمّى سلسلة الـ mRNA الأوليّة (الطّليعة) تخضع لتغيّرات تركيبيّة أهمها:

- إضافة القبعة (نيوكليوتيد الغوانين) (G) إلى نهاية السلسلة 5 وأيضاً إضافة ذيل الأدنين إلى 3 لمساعدة mRNA على الخروج من الغلاف النووي وحمايته من التحلل في الهيولي.
- إزالة أجزاء من سلسلة mRNA وهي أجزاء غير مرمزة لا تتضمن روامزاً لبناء البروتينات وتسمى إنترونات (intron).
- قي التحامُ الأجزاءِ المرمزة من mRNA بعد قطع إنترون ويُسمَى الجزءُ الواحدُ إكسون (exon) وتُسمَى سلسلةُ DNA النّاتجة من التحام الإكسونات سلسلة mRNA النّاضج وظيفيّاً التي تختلف عن السلسلة الشّيفرة في جزيء الـ DNA في طولها ومحتواها من النّكليوتيدات ثمّ تنتقل إلى الهيولي عبر ثقوب الغشاء النووي لترتبط بالجسيمات الرّيبية.

ثانياً: الترجمة Translation وهي على ثلاث مراحل:

1. مرحلةُ البدعِ Initiation:

- يتألُّفُ الجسيمُ الرّيبيّ من وحيدتين صغيرةٍ وكبيرةٍ وله ثلاثةُ مواقعَ (ببتيدي P حمضيّ A خروج E).
- في البداية تكونُ الوحيدةُ الصّغيرةُ منفصلةً عن الوحيدةِ الكبيرةِ ويكونُ الجسيمُ الريبيّ غيرَ فعّالٍ وظيفيّاً وبعد الالتحام يصبحُ فعّالاً.



▲ أتأملُ الشَّكلُ أعلاهُ وأجيبُ عن الأسئلة الآتية:

- المرسالُ؟ وما هو رامزُ البدعِ؟ RNA أينَ يتثبّتُ RNA المرسالُ؟
- المعاكسُ المحدّد عليه؟ وما الرّامزُ المعاكسُ المحدّد عليه؟ وما الرّامزُ المعاكسُ المحدّد عليه؟ وما الحمضُ الأمينيُّ الذي يحملُه؟
 - إلى في أيِّ موقع للجسيمِ الرّيبي يتوضّعُ النّاقلُ البادئُ؟ وما مصدرُ الطّاقةِ اللّازمةِ لذلك؟

ملاحظة: الميتيونين المعدَّلُ هو أول حمضٍ أميني يتمُّ تركيبُه لدى الجراثيم والذي هو (فورميل ميتيونين) لا تستطيع زمرتُه الأمينيّة الارتباط مع الزمرة الكربوكسيليّة لحمضٍ أمينيّ آخر، أما في حقيقيّاتِ النّوى فأوّل حمض أمينيّ هو الميتيونين كما هو موضّح في الشّكل.



بعد الملاحظة والتشاور مع زملائي أستنتج:

- في البداية يتوضع النّاقل البادئ الحامل للميتونين في الموقع الببتيدي P وعندما يتقابل الرّامز المعاكس له (UAC) مع رامز البدء AUG على ANA المرسال تلتحم الوحيدة الكبيرة مع الوحيدة الصّغيرة.
- توضع RNA النّاقل على الجسيم الرّيبيّ يحتاجُ لصرفِ طاقةٍ تأتي من تفكيكِ مركّب (GTP).


GCCGAGC

2. مرحلةُ الاستطالةِ Elongation of The Polypeptide

- ▼ أتأمّلُ الشّـكلَ الآتي وأتشاورُ مع زملائي وأجيبُ عن الأسئلةِ الآتيةِ:
 - أينَ يتوضّعُ RNA النّاقلُ الجديدُ؟

الموقع الحمضيّ A.

- ؟ كيفَ تتشكُّلُ السرّابطةُ بينَ الحمضين الأمينين؟ وماذا تُسمَّى؟
- ؟ ما مصدرُ الطَّاقة اللَّزمة لانزلاقة الجسيم الرّبيي على RNA المرسال؟



(طاقة الـ GTP لها دورٌ مهمٌّ في عملية الاستطالة)

دورة الاستطالة في الترجمة


أَتِعَلَّمُ: يوجد (4) أنواع من النكليوتيدات على mRNA وكلّ (3) منها تشكّلُ رامزاً وتحدّدُ حمضاً أمينيّاً فإنّ عددَ أنواع الرّوامز: 3-64 رامزاً وهذا يفوقُ عددَ أنواع الحموض الأمينيّةِ العشرين فماذا أستنتج؟

الحمضي A في الموقع الببتيديّ

ويصبح الموقع الحمضي شاغراً.

3. مرحلةُ الانتهاءِ Termination

- ▼ أتأملُ الشكلَ الآتي وأجيبُ عن الأسئلة الآتية:
- ؟ ما الرّوامزُ التي ليسَ لها روامز معاكسة على RNA الناقل؟ وماذا تسمّى؟
- ؟ لماذا تتوقّف عملية تركيب البروتين عندما يصل RNA المرسال إلى أحد روامز التوقّف؟
 - الخطواتُ اللّحقةُ لتوقّف عمليّة تركيب البروتين؟



أضيف إلى معلوماتي

- روامز التّوقّف هي UAA أو UAG أو UGA.
- ا كل انز لاقة للجسيم الرّيبيّ على RNA مرسال يحتاجُ إلى صرف طاقة تأتى من تفكّكِ مركّب (GTP).
- تأتي الطّاقةُ اللّازمةُ لتشكيلِ الرابطةِ الببتيديّةِ بينَ كلّ حمضين أمينيّين وذلكَ من تفككِ الرابطةِ بينَ RNA الناقل وحمضيهِ الأميني في الموقع الببتيديّ.
- ا يمكنُ أن ينزلقَ على الـ mRNA نفسِهِ جسيماتٌ ريبيّةٌ عدةٌ بفاصلٍ زمنيٍّ فيكونُ عددُ السلاسلِ الببتيدية التي تمَّ تركيبُها مساوياً لعددِ الجسيماتِ الرّيبيّةِ المنزلقةِ عليهِ.
 - يرتبط عامل بروتينيّ للإيقاف Releas Factor مع رامزة الإيقاف في موقع A بدلاً من tRNA.

نشاط:

في سلسلة RNA المرسال النّاضجة 120 نيكلوتيد والمطلوب:

- 1. ما عددُ الرّوامز في هذه السلسلة؟
- 2. ما عددُ الحموضِ الأمينيةِ في سلسلة الببتيد النّاتجةِ? ولماذا؟ أَتَعلَّم: أنَّ البروتيناتِ الناتجة عن عملية تركيبِ البروتين إمّا بنائية أو وظيفية. أوضِّحُ ذلك من خلال أمثلة.

إثراء

العلاجُ الجينيُّ والأمراضُ السرطانية:

بدأ العلاجُ الجيني للأمراضِ السرطانيةِ في الولاياتِ المتحدة الأمريكية عام 1991م ووضعت عدّةُ استراتيجيّات لهذا الغرض. 1 إجراءُ تعديلٍ وراثي في خلايا الدّم البيضاء Lymphocytes لتحفزُ ها على العملِ ضدَّ الأورام السرطانيةِ. 2 إدخالُ المورثاتِ المثبطةِ إلى الأورامِ السرطانيةِ. السرطانيةِ. 3 إدخالُ مورثاتِ تنتُج موادَّ سامةً إلى داخلِ الأورام السرطانيةِ لتدميرِ خلاياها.

التّقويم النّهائيّ

أولاً: أختارُ الإجابةَ الصّحيحة:

1. واحدٌ ممّا يأتي يمثلُ رامزَ البدءِ على RNA المرسال:

UAC-4 AAG-3 AUG -2 UAA -1

2. واحدٌ ممّا يأتي ليس من العناصر الأساسيّة في عمليّة نسخ التّعليمات الوراثيّة:

1- المورثة 2- RNA المرسال 3- RNA الناقل 4- أنظيم RNA بولميراز

3. ثلاثيّةُ من النّكليوتيدات على السّلسلة النّاسخة لـ mRNA:

4. أحدُ الروامزِ المعاكسةِ الآتيةِ لا يمكنُ أن يوجد في RNA النّاقل:

UAC -4 AUC -3 AUG -2 UAA -1

5. السّلاسلُ الببتيديّةُ الناتجةُ عن انزلاقِ 10 جسيمات ريبيّة على RNA المرسالِ ذاتِه:

10 -4 11 -3 9 -2 8 -1

6. أجزاءٌ من المورثةِ غير مرمّزةِ لتركيبِ البروتين:


1- انترونات 2- اکسونات 3- روامز 4- شیفرات

ثانياً: أدقّ جيداً في الشكل الآتي للإجابة عن السوالين:



- ما ترتيب النيكلوتيدات في سلسلةِ mRNA لشريط الـ DNA القالب الظّاهر في الشّكل السّابق:
 - 5'ATGTTTGATCTT3' .a
 - 5'AUGUUUGAUCUU3'.b
 - 5 TACAAACTAGAA3 .c
 - 5 UACAAACUAGAA3 .d
 - ما ترتيب النّيكلوتيدات في شريط الـ DNA المتمّم في الشّكل السّابق:
 - 5'ATGTTTGATCTT3' .a
 - 5'AUGUUUGAUCUU3'.b
 - 5 TACAAACTAGAA3 .c
 - 5 UACAAACUAGAA3 .d

ثالثاً: أُكملُ خارطةً المفاهيم الآتية مستخدماً المصطلحات المناسبة:




رابعاً: لدينا عدّة نواقلِ لحموضٍ أمينيّةٍ روامزُها المعاكسة على الترتيب GAG,UGG,GAU,UAC والمطلوب:

- 1. استنتجُ جزئ الـ mRNA المسؤولَ عن تشكيلِ عديدِ الببتيدِ.
 - 2. أوجدُ مورِّثةَ الـ DNA المشكِّلةَ لعديدِ الببتيدِ هذا.

خامساً:

- 1. أيَّ مرحلةٍ يمثلُ الشّكلَ الآتي؟
 - 2. أينَ تتمُّ هذه المرحلةُ؟
- 3. أضعُ المسميّاتِ المناسبةَ على الشّكلِ الآتي؟



تفكيرٌ ناقدٌ

أفترضُ أنَّه تمَّ مزجُ المكوناتِ الآتيةِ لبناءِ بروتين نوعي في أنبوبِ اختبار:

- 1. حموضٌ أمينيّةٌ من أرنبٍ. 2. جسيمات ريبيّة (ريبوزومات) من بقرةٍ.

وأنظيماتٌ ضروريّة للعمليّة فإذا تمَّتْ عملية بناء البروتين في رأيك ما الكائن الحيُّ الّذي ينتمي إليه هذا البروتين؟ أفسّر إجابتي.



المفاهيم الأساسيّة:

- الجينوم.
- مشروع الجينوم البشري.

سأتعلّم:

- ا مفهوم الجينوم.
- المقارنة بين جينوم بدائياتِ
 النوى وجينوم حقيقياتِ النوى.
 - مفهوم الجينوم البشري.
 - تطبيقاتِ علم الجينوم.



أضيف إلى معلوماتي

الجينوم (Genome): مصطلحٌ علميٌّ جديدٌ في علم الوراثةِ يجمعُ بين جزئي كلمتين (Gen) وهي الأحرف الثّلاثةُ الأولى لكلمةِ (Gene) التي تعني المورثةَ والجزء الثّاني (Ome) وهي الأحرف الثّلاثة الأخيرةَ لكلمة (Chromosome) التي تعنى الصبغيّ.


- أنعمُ النظرَ في الشّكلِ السّابق وأجيبُ
 عن الأسئلة الأتية:
- أينَ يوجدُ الـ DNA في الخليّة؟
 - ? ما المقصودُ بالجينوم؟

الجينوم (Genome):


هو مجموع جزيئات الـ DNA الكليّة الموجود في خليّة معينة أو في الكائنِ الحيّ. الجينوم = المجموع الوراثيُّ الكائنِ الحيّ.

أنماطُ الجينوم في الكائنات الحيّة:

▼ أدرسُ الصّورَ، ثمّ أجيبُ عن الأسئلةِ الأتيةِ:



- 1. بمَ يتمثلُ الجينوم لدى بدائياتِ النّوى؟
- 2. ما شكلُ الـ DNA لدى الجسيماتِ الكوندريّةِ والصّانعاتِ الخضراعِ؟
 - 3. أملا ألمخطط الآتى بما يناسبه:



مشروعُ الجينوم البشرى (Human Genome Project (HGP)


مشروعٌ بحثيّ عالميّ هدفُهُ تحديدُ المورّثاتِ البشريّةِ وتسلسلاتِ DNA البشرِ تمَّ إنجازُهُ عام 2003 م. الجينوم البشري Human genome:


يبلغُ حجمُ الجينوم البشريّ حوالي 3.2 مليار شفع من النكليوتيدات.

تبلغُ نسبةُ تشابهِ الجينوم بينَ أفرادِ البشر %99.9.

ويتألفُ الجينوم النوويّ من 22 شفعاً من الصّبغيّاتِ الجسميّةِ وزوجاً من الصّبغيّاتِ الجنسيّةِ (XX لدى الاناثِ وXY لدى الذكورِ).

في الذّكر: 22 صبغيّاً + XY = صبغيّاً مختلفاً في الأنثى: 22 صبغيّاً + = 23 صبغيّاً مختلفاً





2 تماسنك الصبغيّ.


◄ أدرسُ الشكلَ الأتي وأجيبُ:

لاحظ العلماءُ أنَّ حوالي %2 فقط من سلسلة DNA البشر مشفّرة أي تحوي مورّثات مسؤولةً عن تركيب البروتينات فماذا نُسمّي الأجزاءَ غير المورّثيّة (غير المشفّرة)؟ وما دورُها؟

أَتُعَلَّمُ: تسمى الأجزاءُ غير المورّثيّة (غيرُ مشفّرة) في سلسلةِ الـ DNA المسافاتِ بين المورّثاتِ أو المواقع بين مورّثيّة، لها عدةُ أدوارِ منها:


- المورّثاتِ أو كظمُها.
- الأنواع.الأنواع.
- 4 يتغيّرُ طولُها في مرحلةٍ مبكرةٍ من تنامي بعض السّرطانات ممّا يجعلُها واسماتِ (Markers) مفيدةً في الكشفِ المبكّر عن السّرطان.

▼ أُنعمُ النّظرَ في الصّورةِ الآتيةِ وأستنتجُ مكان توريثُ DNA الجسيماتِ الكوندريةِ للأبناءِ؟



ماهي ميزات DNA الميتوكوندريا؟

يتألف جينوم الجسيمات الكوندرية مِنْ عدد قليا من المورثات التي ترمز الاصطناع البروتينات والأنظيمات التي تتدخل في تفاعلات الفسفرة التأكسدية واصطناع الأنماط المختلفة من الحموض الريبية النووية (RNA و rRNA).





أَتَعَلَّمُ: يَتُمُ توريثُ DNA الجسيمات الكوندريّة عن طريقِ سيتوبلاسما البويضةِ فقط ممّا يعني أنَّ DNA الجسيمات الكوندريّة يورثُ من الأمِّ ولا تساهمُ الجسيماتُ الكوندريّة للنطفةِ في عمليةِ التوريث.

أضيف إلى معلوماتي

مرضُ ليبر Leber أو الاعتلالُ العصبيُّ البصريُّ العائليُّ:

تتجلى أعراضُهُ بعمى مفاجئ ناجم عن ضمور في العصب البصري مع ظهور بعض الأمراض العصبية وهو من الأمراض الميتاكوندرية الوراثية الوراثية التي تورثُ عن طريق الأمهات فقط ولهذا فإنَّ ذريّة الأمّ الحاملة للطفرة الوراثية سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً سيحملونها حتما أمّا الأبُ الحامل للطفرة الوراثية فلا يورثُها لأبنائه.

▼ أُلاحظُ الجدولَ الأتي الذي يبيّنُ مقارنةً بين حجوم الجينوم لكائناتٍ مختلفةٍ.

نوع الكائن	فيروس	جرثوم	ذبابة الخل	الإنسان	نبات القمح
حجم الجينوم	170 مليار	4.6 مليار	130 مليار	3.2 مليار	17 مليار
Common Name	فيروس	جرثو _م	نبايةُ الخل	الإنسانُ	نبات القمح

؟ هل توجدُ علاقةٌ بين حجمِ الجينوم المقدّر بالأشفاع النكليوتيدية وتطورِ الكائنِ الحيِّ؟ أفسّرُ إجابتي. بعضُ تطبيقات علم الجينوم:

معرفة نشوع الجنس البشري وتطوره:

تمكَّنَ العلماءُ من معرفةِ أصولِ البشرِ في أجزاءٍ مختلفةٍ من العالم.

مثال: اسْتُخدِمَ DNA الميتاكوندريا لإظهارِ أن كلَّ البولينيزيين (سكانٌ موجودون في جزر المحيط الهادي). يمكنُ تتبّع أصولهم إلى جنوب شرق أسيا وليسَ إلى الأمريكتين كما كان يعتقد.

الدراساتُ الوراثيّةُ المقارنَةُ والتطوريةُ بينَ أنواعِ الكائناتِ الحيّةِ.

يمكِّنُ التنوّعُ الوراثيّ بين الكائناتِ من دراسةِ علاقاتِ القربي بينَها ورسمِ الخرائطِ التطوريّة لها

• البصمةُ الوراثيّة DNA Fingerprinting.

عرفت البصمة الوراثيّة في عام 1984 من قبل العالم إليك جيفريز Alec jeffreys إذ يمتازُ كلُّ فردِ ببصمة وراثيّة خاصّة به حتّى التوائم المتماثلة تختلفُ البصمةُ الوراثيّةُ بينَهم ويعود السببُ في ذلك إلى كونِ بعضِ المناطقِ غيرِ المشفّرةِ فريدةٍ وخاصّة بكلّ فردٍ على عكسِ المناطقِ المشفّرةِ في السّعرُ في السّعر في السّعر في اللّه خاصِ وكذلك تحديدِ هويّاتِهم وإثباتِ الأبوّةِ أو نفيِها. ومن البصمة الوراثيّة يمكن التّعرّف على جرائم القتل وتتبّع الأطفال المفقودين.

نشاط:

حدثتْ جريمةٌ فسارعَ فريقُ البحثِ الجنائيّ بأخذِ البصماتِ للحصولِ على عينةٍ من موقعِ الجريمةِ وتمَّ أخذُ البصماتِ الوراثيّةِ لعددٍ منَ المشتبهِ بهم إذ يمثّل الشكل المجاور هلاماً مرحلاً ترحيلاً كهربائياً لعينات دم مجموعة من المشتبه بهم.

- المشتبه الأول المشتبه الثاني المشتبه الثالث المشتبه الثالث عينة من موقع عينة من موقع المجريمة
- ◄ أدرس الشّكل المجاور، ثمّ أجب عن
 الأسئلة الآتية:
- قارن بصمات المشتبهين الثلاثة بتلك العينة المأخوذة من موقع الجريمة.
 - أيّ من المشتبه بهم مذنب بعد تحليل بصماتهم الوراثيّة؟ ولماذا؟
 - 3. اذكر استخدامات أخرى للبصمة الوراثية.

أضيف إلى معلوماتي

الرحلان الكهربائي Electrophoresis:

طريقة لفصل الجزيئات المشحونة كهربائيًا ضمن هلام بالاعتماد على شحنتها أو حجمها أو كلاهما معاً.

التّقويم النّهائيّ

أولاً: أختارُ الإجابةَ الصّحيحةَ لكلِّ ممّا يأتى:

1. ليستت من الأدوار التي تقومُ بها المسافاتُ بينَ المورثاتِ:

د- تماسكُ الصّبغيّ	ج- إعطاءُ الصّفات الوراثيّة	ب- تطوّرُ الأنواع	أ- تفعيلُ المورّثات	
2. الكائنُ الذي يبلغُ حجمُ الجينوم لديه 130 مليار شفع نكليوتيدي:				
د- ذبابةُ الخل	ج- الإنسانُ	ب - الجرثومُ	نباتُ القمح	
3. يختلف الجينوم بين البشر بنسبة:				
د- %2	ج- 0,1%	ب- % 98,5	اً- % 99٫9	
4. تشكّلُ المورثاتُ غيرُ المرمزةِ من DNA البشر:				
د- % 0.1	ج- % 2	ب- % 98	اً- % 95,5	

ثانياً: أُعطي تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتي:

- 1. يمتلكُ جميعُ الإخوةِ الأشقاءِ في العائلةِ DNA الميتاكوندري نفسَهُ.
- 2. للمسافاتِ بين المورّثاتِ دورٌ مفيدٌ في الكشفِ المبكرِ عن السّرطانِ.

ثالثاً: أُقارنُ بينَ كلِّ ممّا يأتى:

- 1. حجمُ الجينوم عندَ كلِّ من الفيروس، ونباتِ القمح، والإنسانِ.
- 2. مفهومُ الجينوم عند كلِّ من حقيقيّاتِ النوى، وبدائيّات النّوى.

أبحث أكثر

إنَّ قرابة 30.000 مورّثة ترمز إلى أكثر من 120.000 بروتين، أفسِّرُ ذلك.

أسئلة الوحدة الثّانية

		ويحة في كلِّ ممّا يأتي:	ثانياً: أختار الإجابة الصد
		:	1. يتكون الكروماتين مز
د- صبغيّات.	ج- صبيغيّين	ب - DNA وبروتين	أ- RNA وبروتين.
			2. يعد الجسيم النووي:
ملتفّة حول الهيستونات. ${\mathbb D}$	ب- منطقة من NA(يحتوي على الإكسونات.	أ- منطقة داخل النّواة
	لكروماتين.	يّ مكوّنة من لفات عدّة من اا	ج- منطقة من الصبغ
		ينسخ منها rRNA.	د- منطقة من DNA
		ات المتماثلة تبادلات فإنها:	3. عندما تُكوّن الصّبيغيّا
الوراثيّة.	ب- تتبادل المعلومات	لنوويّ DNA.	أ- تضاعف الحمض ا
	د- تقوم بالهجرة.	.le	ج- تضاعف صبيغيّات
ې هو:	لانقسام المنصّف الثّاني	ني من الانقسام الخيطيّ وا	 التشابه في الدور الثا
حوي نصف عدد الصّبغيّات.	ب- الخلايا النّاتجة تـ	هة تماماً بالخلايا الأمّ.	أ- الخلايا النّاتجة شبيه
موي ضعف عدد الصّبغيّات _.	د- الخلايا النّاتجة تد	ليصبح كلّ منها صبغيّاً.	ج- تحرر الصّبيغيّات
	:5	الرّامز المعاكس لرامز البدء	 واحد ممّا يأتي يمثل ا
د- UAC.	ج- AAG.	ب- AUG.	.UAA -أ
	ىنجلية:	ادسة في خليّة دم حمراء ه	6. الشتيفرة الوراثية السر
		ب- CTT.	
فعدد الحموض الأمينية في	، تحوي 270 نيكلوتيد		
		:ــة:	سلسلة الببتيد النّات
د- 92.	ج- 88.	ب- 90.	أ- 270.
		خلايا النباتيّة ب:	8. يتمثل الجينوم عند الـ
د- جميع ما سبق _.	ج- جينوم بلاستيديّ.	ب- جينوم ميتاكوندريّ.	أ- جينوم نوويّ.
		اً لكلِّ ممّا يأتي:	ثالثاً: أعطي تفسيراً علميّ
	بيف المحافظ	نيّ للـ DNA بالتّضاعف نص	

2. يسمح للـ RNA والـ DNA بولمير از بأن يقوما بعمليّة النّسخ والتّضاعف في الطّور البينيّ.

أولاً: ما المقصود بكلِّ ممّا يأتي؟

1- الرّامز. 2- الإنترون. 3- الجينوم. 4- مرض ليبر.


رابعاً: إذا كانت جرثومة العصية القولونية E.Coli تصنع الـ DNA بمعدّل 100,000 نكليوتيد في الدقيقة، وتستغرق 30 دقيقة لكي تضاعف الـ DNA الخاصّ بها، فما عدد أزواج الأسس الآزوتيّة في صبغي العصيّة القولونيّة?

خامساً: استعمل الشَّكل الآتي للإجابة عن السَّوالين:

- 1. أيّ مرحلة من مراحل الانقسام المنصّف ممثّلة في الشّكل؟
- 2. أيّ العمليات الآتية يمكن أن تحدث في مرحلة الانقسام المنصّف والتي تلي المرحلة الظّاهرة في الشّكل؟

سادساً: كيف أثبت كلّ من أفري، مكليود، مكارثي أنّ المادة الوراثيّة هي الـ DNA وليست البروتين؟

سابعاً: أكمل المخطّط الآتي بالمفاهيم العلميّة المناسبة:



مشروع الوحدة الثَّانية:

رحلة علميّة إلى مختبر الوراثة في كليّة العلوم

مقدّمة عامّة عن النّشاط: الرّحلة العلميّة واحدة من أهم التّدريبات العمليّة لمنهاج علم الأحياء والأرض، يتم فيها مشاهدة جميع المظاهر العمليّة العلميّة على أرض الواقع، وبشكل أوضح وأسهل من قراءة الكتب، إلى الواقع التّجريبيّ (العمليّ).

أهداف الرحلة العلمية: يصبح الطّالب قادراً على أن:

- يميّز بالدر اسة المجهرية كلّاً من: الخلية النّواة الصّبغيّات.
- ياتقط صوراً للصبغيّات ويقوم بقص الصور ويرتب الصبغيّات وفق مجموعات.
 - يتتبع مراحل الانقسام الخيطي مجهرياً ويلتقط صوراً لها.
 - يتتبع مراحل الانقسام المنصف مجهرياً ويلتقط صوراً لها.
 - دراسة الـ DNA وتتبع مراحل بعض التقانات الحيوية للهندسة الوراثية.
 - يثمن أهمية التقدم العلمي ودور العلماء في ذلك.

مستلزمات الرحلة:

- 1. دفتر ولوحة وأقلام ملوّنة ومقصّ.
 - 2. مجهر مزود بكاميرا.
- 3. كاميرات وأفلام للتصوير، ويمكن الاستفادة من كاميرات الهاتف المحمول.

إجراءات الأمان والسلامة:

- 1. ارتداء المعطف المخبريّ.
- 2. الحذر عند استخدام المقصّ.

مراحل تنفيذ المشروع:

- زيارة مختبر الخليّة النّباتيّة أو الخليّة الحيو انيّة، لملاحظة الخلايا و انقسامها و النّوى و الصّبغيّات.
- زيارة مختبر الوراثة الجزيئيّة للتعرف عمليّاً على مراحل عزل الـ DNA وعلى بعض التّقانات الحيويّة في مجال الهندسة الوراثيّة والتقاط بعض الصّور.
- يرتب على لوحة صور كل من مراحل الانقسام الخيطيّ والانقسام المنصّف ويقارن بين مراحلهما.
 - يتم عرض اللوحة والصور التي قام بالتقاطها على زملائه ومناقشتها.
 - كتابة تقرير علمي عن هذه الرّحلة مرفقاً بالصّور.



- التركيب الضوئي.
 - جهاز الدوران.
 - الجهاز المناعي.
 - Merany

الوحدة الثالثة

يُعنى علم الأحياء بدراسة الحياة والكائنات الحية في ذلك وظائفها وهوها وتطوّرها.

جميع الكائنات الحيّة تبقى على قيد الحياة عن طريق استهلاك وتحويل الطاقة، ومن تنظيم البيئة الداخليّة للحفاظ على حالة مستقرّة وحيويّة.



التركيب الضوئي Photosynthesis





المفاهيم الأساسية:

- الصّانعة الخضراء.
 - النّسيجُ الحباكيُّ.
- النّسيجُ الفراغيُّ (الاسفنجيّ).
 - النسيج المتوسط.
 - السدى.
 - الحبيبة.
 - الكييس.

سأتعلّم:

- وصفَ بنيةِ الصّانعةِ الخضراعِ.
- تصنيف الأصبغة الموجودة في
 الصّانعاتِ الخضراع.
- استنتاجَ أهمّيةِ اليخضورِ في
 عمليّةِ التركيبِ الضوئيّ.


تعدُّ النّباتات أساس الحياةِ على الأرضِ فهي توفرُ الغذاء والأكسجين لجميع الكائناتِ الأخرى.

◄ ألاحظُ الشَّكلَ الآتي الذي يمثلُ المعادلةَ الإجماليّةَ لعمليّةِ التركيب الضوئيّ:

• أمواجٌ كهرومغناطيسية لجسيماتٍ تسمّى فوتونات.

الضّوعُ

تمتد طول موجة الطيف المرئي
 من 400الى 760 نانو متر.



- أَي جزءٍ من النباتِ تتم عمليّة التركيبِ الضوئي؟ أحدّدُ الموادّ الدّاخلة والموادّ النّاتجة عن هذه العمليّة.
- يُعدُّ ضوءُ الشمسِ مصدرَ الحياةِ لجميعِ الأحياءِ على الأرضِ، أفسر إجابتي.

أتعلَّم:

يتمثّلُ العملُ الأساسيُّ في عمليّةِ التركيبِ الضوئيّ بتحويلِ الطّاقيةِ الضوئيّةِ الضوئيّةِ الضوئيّةِ الضوئيّةِ المحدويِّ الروابطِ بين ذرّاتِ المركبِ العضويِّ التي يتمُّ اصطناعُها في نهايةِ العمليّةِ العمليّةِ الديتمُّ الرجاعُ (CO_2) الممتصِّ الى سكريّاتِ بينَما ينطلقُ (O_2) النّاتجُ عن انشطارِ جُزَيء الماء.

أضيف إلى معلوماتي

- يعدُ اليخضورُ أَ الأساسَ لصبغةِ التّركيبِ الضّوئيّ
 لأنّهُ يحوِّل الطاقةَ الضّوئيّةَ الى طاقةٍ كيميائيّةٍ بينما اليخضورُ ب وبقيّةُ الأصبغةَ تمتصُّ الضّوءَ وتحولُ الطّاقةَ الممتصنَّةَ إلى اليخضورِ أ.
- الكاروتينات (Carotenes): صبغاتٌ برتقاليّة الله ونِ كما في الجزرِ.
- الزانتوفي لات (Xanthophylls): صبغات صفراءُ اللونِ كما في نباتِ الشّمامِ (بطّيخُ أصفُر).

أدقّقُ في الشّكلِ الآتي وأجيبُ عمّا يأتي:

العضيَّةُ الخلويّةُ التي تتمُّ فيها عمليّةُ التركيبِ الضّوئيَ؟ وفي أيِّ نسيجٍ نباتي تغزر؟

تتمُّ عمليّةُ التركيبِ الضّوئيّ في الصّانعاتِ الخصراءِ Chloroplasts وتغزرُ في الخلايا البرانشيميّة للنّسيجِ المتوسّط Mesophyll في الورقةِ وتعدُّ كلُّ صانعةٍ خضراءَ جهازاً كاملاً يمكنُه القيامُ بعمليّةِ التركيبِ الضّوئيّ بصورةٍ مستقلةٍ.




◄ أدرسُ الشَّكلَ المجاور وأَملأُ الفراغاتِ الآتيةَ بالكلمات المناسبة:


تحتوي الصّانعاتُ على أصبغةٍ عدّةٍ منها:


اليخضورُ (الكلوروفيل) والكاروتيناتُ (الجزرين) والزانتوفيلُ (اليصفور) وكلُّ صباغٍ لهُ طيفُ امتصاصٍ

خاص بهِ



- تتكوّنُ جزيئةُ اليخضورِ من سلسلةٍ كربونيّةٍ
 ذاتِ طبيعةٍ دسمةٍ مرتبطةٍ مع أيونِ ++ Mg
- تتوضّعُ الأصبغـةُ فـي أغشية الكييساتِ (Thylakoid).
- ◄ أنعمُ النظرَ في الشكلِ الآتي وأفسر لماذا تبدو النباتات خضراء اللون؟





Mesophyll

مقطع طولي في ورقة

خلايا النسيج المتوسط

Mesophyll cell

حزمة وعائية

نشاط:

تحضير محلول اليخضور وفصل الأصبغة

الموادُّ والأدواتُ اللازمةُ: أوراقُ نباتٍ أخضرَ - هاون - مِدقَّةٌ - رملٌ مغسولٌ - كأسٌ زجاجيّ - قمعٌ مخروطيّ - ورقةُ ترشيح - ماءٌ - غولٌ مركّز - بنزن - كربوناتُ الصّوديوم لتعديلِ الحموضةِ.


مراحل تنفيذ النّشاط:


- أقطِّعُ عدداً من الأوراق إلى قطع صغيرة.
- أضع قطع الأوراق الصغيرة في الهاون مع إضافة كمية بسيطة من الرمل المغسول.
- 3. أُضيفُ كمّيّةً من الغَولِ حتّى تُغطّيَ المكوّناتِ الموجودةِ في الهاون.
 - 4. أهرسُ المكوّناتِ بالمدقةِ هرسا جيّداً. لماذا؟
 - 5. أفصِلُ الخليطَ باستخدام ورقةِ التّرشيح والقمع في الكأسِ.
 - أَفْسِّرُ: 1 لماذا استخدمتُ الغولَ في المرحلةِ 3؟
 - 2 ما لونُ السائلِ الذي حصلتُ عليهِ؟ ولماذا؟

6. فصلُ الأصبغةِ:

يتمُ ذلك بوساطة التحليلِ الكروماتوغرافي: نضعُ نقطةً من السائلِ الأخضرِ السّابقِ أسفلَ ورقِة الترشيح (واتمان)، ثمَّ نجعلُ الورقة تمسُّ في أسفلِها مذيباً عضوياً (بنزن)، يصعدُ المذيبُ عبرَ الورقةِ وفقَ الخاصّة الشّعريّةِ حاملاً معهُ جزيئات الأصبغة كلٌ حسبَ درجة انحلاله في المذيب.








الأصبغة والضّوء:

- ◄ ألاحظُ المخطّط البيائيَ الذي يمثّلُ امتصاصَ الأصبغةِ للأمواجِ الضّوئيَة.
- ما مصدرُ الأكسجين المنطلقِ في عمليّةِ التّركيبِ الضّوئيّ؛ أمِنَ الماءِ $\mathbf{H}_2\mathbf{O}_2$ أمِنَ الماءِ $\mathbf{H}_2\mathbf{O}_2$ أمِنَ الماءِ عاد ثنائي أكسيد الكربون $\mathbf{H}_2\mathbf{O}_2$

وضعَ أحدُ الباحثينَ خيوطاً لطحلبِ السّبيروجيرا في أنبوب اختبار يحوي الماءُ فيهِ على الأكسجين المشعّ O^{16} بينما ثنائي أكسيد الكربون O^{2} يحوي الأكسجين العادي O^{16} ، ثمّ عرَّضهُ للضّوءِ فانطلقتُ فقاعاتٌ غازيّـةُ وبعدَ جمعِها وتحليلِها وجدَ أنّها تحوي أكسجيناً مشعّاً O^{18} .

▼ من المخطّط الآتي أستنتجُ مصدرَ كلِّ من الأكسجينِ المنطلقِ ومصدر الأكسجين الذي يدخل في تركيب الماء النّاتج.



للاطلاع: اللوكس = لومن / متر مربع اللومن واحدة تدفّق الإشعاع وهي كمية الضّوء السّاقطِ من شمعة معيارية تبعدُ قدماً واحدةً على مساحة قدم مربع.

الضوء المرئى

شُدُّةُ الضَّوعِ: كمّيةُ الضّوعِ السّاقطِ على مساحةٍ معيّنةٍ، تُقاسُ شدَّةُ الضّوعِ بواحدةِ اللوكس. وعلى هذا يمكنُ تقسيمُ النباتاتِ من حيثُ استجابتُها لشّدةِ الضّوءِ إلى

النّباتات أليفة الظّل	النّباتات أليفة الضّوء
 تحتاجُ إلى كمية ضوء أقلً ومن أمثلتها نباتاتُ الزينةِ وتكون الشَّدَّات الضّوئيةِ العالية غالباً مؤذية. 	وتحتاجُ على الأقل إلى 1000 لوكس ومعظمُ الله المالية المنتقبة المالية المنتقبة المالية
الريدة و بكون السدات الضويية العالية عالبا مؤدية. • ذاتُ لونٍ أخضر غامقٍ.	المحاصيلِ الاقتصاديّة تنتمي إلى هذه المجموعةِ. دات لونٍ أخضر فاتحٍ.





تعد سورية ذات بيئات متعددة ومتنوعة مما يجعلها غنية بالأنواع النباتية والحيوانية، يجب الحفاظ عليها؛ لأنها تعد شروة وطنية ذات أهمية بيئية وسياحية.

التّقويم النهائي

أولاً: أختارُ الإجابةَ الصّحيحةَ في كلِّ ممّا يأتي:

1. أولُ مرحلةِ في التّفاعلاتِ الضّوئيّة:

أ- امتصاص الضّوءِ. ب- انتقال الالكترون. ج- إنتاج الأكسجين. د- تَشكُّلُ ATP.

2. يمتصُّ اليخضورُ كلَّ الأمواج الضّوئيّةِ ما عدا:

أ- الأزرق. ب- الأحمر. ج- الأصفر. د- الأخضر.

3. مصدرُ الأكسجين المنطلق في عمليّةِ التّركيبِ الضّوئيّ هو:

4. الموقعُ الذي تُمْتصُّ فيهِ الطَّاقةَ الضّوئيّةَ في الصّانعاتِ الخضراءِ هو:

أ- غشاء الكييسات. ب- الغشاء الخارجيّ.

= - السّدى. = - (= - =).

5. لونُ الضّوءِ الأكثرَ فعاليّةٍ في عمليّةِ التّركيبِ الضّوئيّ:

أ- الأحمر، الأزرق البنفسجيّ. ب- الأخضر، الأصفر البرتقاليّ.

ج- تحت الحمراء، فوق البنفسجيّة. د- جميع أطياف الضّوء الأبيض.

ثانياً: أفسِّرُ علميّاً كلّاً ممّا يأتى:

1. يُستخدمُ البنزن كمذيبٍ عضوي في فصلِ أصبغةِ اليخضورِ.

2. يُعدُّ اليخضورُ (أ) الصّبغةَ الأهمَّ في عمليّةِ التّركيبِ الضّوئيّ.

ثالثاً: أُقارِنُ بين النّباتاتِ أليفةِ الضّوع والنّباتاتِ أليفةِ الظّلِّ من حيثُ:

شدةُ الضّوءِ اللازمةِ انموّها - لونُ الأوراق.

أبحث أكثر

ما تأثيرُ الضّوء الاصطناعيّ ليلاً على نمق النبات؟



المفاهيم الأساسيّة:


- التّفاعلاتُ الضوئيةُ.
- التّفاعلاتُ اللاضوئيةُ.
 - حلقة كالفن.
 - النواقلُ الالكترونيّةُ.
- النّظامُ الضّوئي الأوّلُ.
- النّظامُ الضّوئي الثّاني.

سأتعلّم:

- تصنيف تفاعلات التركيب الضوئي الم ضوئية ولا ضوئية.
- المقارنة بين التفاعلات الضوئية
 والتفاعلات اللاضوئية.

تحدثُ عمليّةُ التّركيبِ الضّوئيّ ضمنَ سلسلةٍ من التّفاعلاتِ (18 تفاعل) في مرحلتين أساسيتين:

- 1. تفاعلاتٌ ضوئيّةٌ light-dependent reactions.
- 2. تفاعلاتٌ لا ضوئيّةُ (حلقة كالفن) light-independent reaction نسبةً للعالم كالفن.
- ▼ ألاحظُ الشَّكلَ الآتي، وأقارنُ بين التَّفاعلات الضّوئيّة والتَّفاعلات اللاضوئيّة، ثمّ أملاً الفراغاتِ:



التّفاعلات اللاضّوئيّة		التّفاعلات الضّوئيّة
لا تحتاجُ	•	 يتطلّبُ حدوثُها وجودَ الضّوء
تحدثُ في السّدى	•	■ تحدثُ في
يتمّ تثبيتُ لإنتاج الكربو هيدرات (غلوكوز) باستخدام نواتج التّفاعلاتِ الضّوئيّةِ.	•	 ينشطرُ فيها H₂O الى أيون +H يستخدمُ في إرجاعِ نواقلِ الإلكتروناتِ و ينطلقُ بالهواء.

إنَّ نقلَ الإلكتروناتِ هو جوهرُ التَّفاعلاتِ المتعلَّقةِ باستخدامِ الطاقة، فالإلكتروناتُ لا تنتقلُ عشوائيًا في الخلايا بلْ تنتقلُ دائماً من جزيءٍ معطي (يتأكسدُ) إلى جزيءٍ متلقِّي (يرجعُ)، غالباً ما تترافقُ تفاعلاتُ الأكسدةِ والإرجاعِ مع نقلِ أيوناتِ الهيدرجين.

أهمُّ النُّواقل الإلكترونيّة:


- نيكوتين أميد آدنين ثنائي النكليوتيد فوسفات (NADPH+/NADP+) يشارك بعملية التركيب الضوئي.
- نيكوتين أميد آدنين ثنائي النكليوتيد (+NADH/NAD) يشارك بعملية التَّنفُس.
 - فلافين آدنين ثنائي النكليوتيد (FADH /FAD) يشارك بعملية التّنفّس!
- السّيتوكرومات (Cytochrome) مركّبات بروتينيّة تحوي الحديدَ تتلقى وتعطي الإلكترونات في منظومات النقل في الأغشيّة الخلويّة.
 - الفيرودوكسينات (ferrodoxin): مركبات تحوي الحديد تقوم بنقل الإلكترونات.
 - الكوينونات (Quinon): مركبات عضوية تؤكسد وترجع بسبب نقلها
 الكاترونات ومنها (pq) plastoquinone (pq) و plastocyanine

التَّفاعلاتُ الضّوئيّة (الفسفرة الضوئية) light-dependent reactions

- يحتوي غشاء الكييسات (الثايلاكوئيد) على صبغة الكلوروفيل (اليخضور).
 - تترتب هذه الصّبغات الضّرورية لعمليّة التّركيب الضّوئيّ في نظامين:
- 1 نظامٍ ضوئي أوّل (photosystem I) يحتوي على اليخضور أ بنسبةٍ أعلى من اليخضور ب.
- 2 نظامٍ ضوئيّ ثانٍ (photosystem II) يحتوي على اليخضور با بنسبةٍ أعلى من اليخضور 1.
 - يتكون كل نظام ضوئي من أصباغ مختلفة (اليخضور أ اليخضور ب الكاروتين).
- ترتبطُ الأصباغُ مع بروتيناتٍ تعملُ كلاقطاتٍ تمتصُّ الطّاقةَ الضّوئيّةَ ليتمَّ تمرير الطاقة إلى مركز التفاعل.
 - تتحوّلُ الطّاقةُ الضّوئيّةُ إلى طاقة كيميائيّةٍ في مسارين للإلكترونات:
 - 🚺 مسارٍ إلكترونيّ لا حلقيّ.
 - 2 مسار الكترونيّ حلقيّ.


أضيف إلى معلوماتي

مركزُ التّفاعل: نظامٌ بروتينيّ قادرٌ على إطلاقِ إلكتروناتٍ منشّطةٍ عندما تصطدمُ الفوتوناتُ به.



P700 مركز النظام الضوئي الأول

P680 مركز النظام الضوئي الثاني



أولا: المسارُ الالكترونيّ اللاحلقيّ

- يؤدّي سقوطُ الضّوءِ (الفوتونات) على اليخضور ب في مركزِ التّفاعلِ للنّظامِ الضّوئيّ الثّاني إلى الصّدارهِ للإلكتروناتِ التي تنتقلُ من النّظامِ الضّوئيّ الثّاني إلى مركزِ التّفاعلِ في النّظامِ الضّوئيّ الأوّلِ عبرَ سلسلةٍ منَ النواقلِ الإلكترونية.
- يتّصلُ النظامان الضوئيّان الأوّلَ والثّاني في سلسلةِ نقلِ الإلكتروناتِ التي تَضخُ البروتونات (+H) الناتجةِ عن انشطارِ جزيء الماء ضوئيّاً ، عبر َ غشاءِ الكييس (الثّايلاكوئيد) إلى لمعةِ الكييس الذي يُصبحُ موجباً (ينتجُ حالةً عدم توازن في تركيزِ البروتوناتِ على طرفيّ الغشاء).
- يَستخدمُ أنظيمُ (ATP سينتتاز) الفرقَ في تركيز البروتونات لِفَسفرةِ جزيء ADP وتحويلهِ الى ATP.


■ تُستخدمُ البروتوناتُ الخارجة لإرجاع + NADP إلى NADPH

$$(NADP^+) + 2H^+ + 2e^-$$
 NADPH.H⁺

يعوضُ جزيءُ اليخضور الإلكتروناتِ التي فقدها من انشطار جزيء الماء وفق المعادلة:

$$H_2O$$
 \longrightarrow $2H^+ + \frac{1}{2}O_2 + 2e^-$

? ما مصير الأوكسجين الناتج؟




ثانيا المسار الإلكترونيّ الحلقيّ:

- تعودُ الإلكتروناتُ المنشطةُ مرّةً أخرى إلى مركزِ تفاعلِ النّظامِ الضّوئيّ الأوّلِ بسلسلةِ نقلِ الإلكترون (السيتوكرومات).
 - يُنتَجُ ATP فقط الذي يستخدمُ في حلقةِ كالفن.

مقارنة بين المسار الإلكتروني اللاحلقي والمسار الإلكتروني الحلقي

المسارُ الإلكترونيّ الحلقيّ	المسارُ الإلكترونيّ اللاحلقيّ	وجه المقارنة
النّظامُ الضّوئيّ الأوّلُ	النظامُ الضوئيّ الأولُ والثّانيُ	النّظامُ الضّوئيّ المستخدم
ATP فقط	ATP, NADPH, O ₂	النواتج
الإلكتروناتُ تنتقلُ عبرَ سلسلةِ نواقل لتعودَ إلى جزيءِ اليخضور نفسِهِ.	النظامُ الضوئيّ الثّاني: عن طريق الشّائي الشّاء. النظامُ الضّوئيّ الأولُ: عن طريق النّظامِ الضّوئيّ الثّاني.	تعويض الإلكترونات

▼ بعد دراستى للتّفاعلات الضّوئية أضعُ تفسيراً لما أراهُ في الصّورة الآتية:




التَّفاعلاتُ اللاضوئيّةُ (حلقة كالفن) light-independent reactions (Calvin Cycle)

تختلفُ مساراتُ إرجاعِ CO_2 حسب النوعِ النباتيّ والبيئةِ التي يعيشُ فيها، وقد تمَّ تقسيمُ النّباتاتِ حسب مسارِ إرجاعِ الكربون إلى ثـلاثِ مجموعات:

- 1. النباتاتُ ثلاثيّةُ الكربونِ C3 (الناتجُ الأوّلُ في عمليةِ التركيبِ الضّوئيّ مركّب ثلاثيّ الكربون).
- 2. النباتاتُ رباعيّةُ الكربون C4 (الناتجُ الأوّلُ في عمليّة التّركيب الضوئيّ مركّب رباعيّ الكربون).
- 3. النباتاتُ العصاريّةُ كالصّبَّارِ: تمتصُّ CO_2 ليلاً وتخزنُهُ لتستخدمَهُ نهاراً في عمليةِ التركيبِ الضوئي كما في النّباتاتِ رباعيّةِ الكربون (لماذا؟).

ستقتصرُ دراستُنا على النباتاتِ ثلاثيّةِ الكربون (Plante C3)؛ لأنَّها تشكّل معظمَ النباتاتِ على الأرضِ.



أَملاً الفراغاتِ بالاستعانةِ بمخطّط حلقةِ كالفن في نباتٍ ثلاثيّ الكربون (\mathbb{C}_3) المذكور أعلاه:

- تحدثُ التّفاعلاتُ اللاضوئيّةُ في
 إلى الضّوءِ بشكلٍ مباشرِ.
- يتمُّ فيها استخدامُ الطَّاقةِ المختزنةِ في نواتج التَّفاعلاتِ الضَّوئيَّة وهي
 - يعملُ أنظيمُ روبيسكو (Rubisco) كأنظيمٍ مكربنٍ يثبتُ
 - يدخلُ الكربونُ حلقةً كالفن على شكل ${
 m CO}_2$ ويخرجُ على شكلِ
- يعملُ NADPH كعاملِ إرجاعٍ قويّ يضيفُ ذاتَ طاقةٍ عاليةٍ وأيوناتِ هيدروجين لصنع جزيئاتِ السّكر.

مراحلُ حلقة كالفن*:

- 1. تثبيتُ الكربون.
 - 2. الإرجاع.
- . (RUBP). الفوسفات (CO $_{_{2}}$ ريبولوز ثُنائي الفوسفات (RUBP).

المرحلة الأولى: تثبيتُ الكربون

يتمُ تثبيتُ ستِّ جزيئاتِ CO₂ واحدةٍ تلو الأخرى بواسطةِ أنظيم روبيسكو (Rubisco) الذي يعملُ
 كأنظيم مكربن في عمليّةِ التَّركيبِ الضّوئيّ.

(Rubisco) أنظيم روبيسكو

- مركبٌ سداسيّ الكربون + CO_2 مركبٌ خماسيّ الكربون.
- (انشطار) جزيئان من مركّبِ 3- فوسفو غليسرات (ثلاثيّ الكربون)

المرحلة الثّانية: ارجاع (PGA)

■ يرتبط (3- فوسفو غليسرات) مع (ATP - NADPH) النّاتجة عن التّفاعلات الضّوئيّة مكوّناً مركّب غليسر ألدهيد 3 - فوسفات.

المرحلةُ الثّالثةُ: إعادةُ تركيب مستقبل ٢٠٠٥

■ ينتجُ جزيءٌ واحدٌ من الغلوكوز (سكّر سداسيّ) من (2) جزيء من (غليسر ألدهيد 3- فوسفات) (مركّب ثلاثيّ الكربون) وتستخدمُ الجزيئاتُ العشر المتبقيةُ في تركيبِ (6) جزيئاتٍ من مركّبٍ خماسيّ الكربون (CO₂).

أستنتج

هناك ثلاث مراحل في عملية التركيب الضوئي:

- 1. امتصاص الطّاقة الضّوئيّة.
- 2. استخدام الطّاقة الممتصّة لإنتاج ATP وNADPH.
- 3. استخدام ATP و NADPH لتحويل CO إلى سكّريات.

^{*} سمّيت حلقة كالفن نسبة إلى العالم ملفن كالفن (Melvin Calvin).

التّقويم النّهائيّ

أولاً: أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ في كلِّ ممّا يأتي:

		<i>ي</i> :	ته تي دل مما ياد	الأخانه الصحت	اود: احدار
		مع وذلك لأنَّها:	الكربون بهذا الاس	لنباتات رباعيّة	1. سُميتِ ا
پ	ن التّركيب الضّوئ	رحلةِ الأولى مر	ربون C3 في الم	مركّباً ثلاثيّ الك	أ- تنتجُ
وئيّ.	، من التّركيب الضّ	المرحلةِ الأولى	الكربون C4 في	جُ مركّباً رباعيّ	ب- تنتع
			من ATP.	ة أربع جزيئاتٍ ،	ج- تنتجُ
		كيب الضّوئيّ.	ع مراحلَ في التّر	ئُ الكربونُ بِأربع	د- يتثبن
	بئيّ الثّاني من:	علِ للنّظامِ الضّو	نِ في مركزِ التّفاء	بضُ الإلكترونات	 يتم تعوب
د- NADPH.	ج- ATP.		ب- الماء.	اسجين.	أـ الأوك
	:	يائيّةٍ في مرحلة	ئيّةِ إلى طاقةٍ كيم	يل الطَّاقةِ الضَّو	3. يتمُّ تحو
A. د- (ب + ج) معاً	ج- صنع ATP	الكتروناتِ.	ب- نقلِ الإ	ماصِ الضّوءِ.	أ- امتص
		تم استهلاك:	و مستقبلِ CO ₂ يت	طةِ إعادةِ تصنيعِ	4. في مرح
د- 3ATP.	ج- 6ATP.	.3(NAD	ب- (PH	.6(NADI	PH) - ^ĵ
)C نستخدمُ:) ₂ إرجاع	5. في تفاء
د- ATP+FADH ₂ معاً	ATP+NA معاً.	ج- DPH	NADPH فقط.	<i>_</i> فقط ب- آ	ATP - ^j
	لى شكلِ:)C ويغادر ها ع	O_2 فن على شكل	كربونُ حلقةً كال	6. يدخلُ ال
	ب- غلوكوز.		ىىفات.	رألدهيد 3- الفوس	أ- غليس
تائي الفوسفات.	د- غلیسرین ڈ		رسفات.	سرين أحادي الفو	ج- غلیس
7. في حلقةِ كالفن إذا تمَّ استهلاك 96 جزيء NADPH فإن عددَ جزيئاتِ ATP المستهلكة:					
د- 144	ج- 72		ب- 9		أ- 16
اتجة:	ريئاتِ الغلوكوز الن)C فإنَّ عددَ جز	ت 24 جزيء ₂ 2	ةِ كالفن عند تثبير	8. في حلقا
8 -7	ج- 6		ب- 4		أ- 2

- 9. المستقبلُ الأخيرُ للإلكتروناتِ في التّفاعلاتِ الضّوئيّةِ في المسار الحلقيّ:
- أ- الأكسجين. ب- NADPH. ج- FADH₂. د- مركزُ التّفاعلِ للنظامِ الضّوئيّ الأوّلِ.
 - 10. ينشطرُ جزيءُ الماءِ في التّفاعلاتِ الضّوئيّةِ بهدف:
 - أ- انطلاق الأكسجين. ب- إنتاج +H
 - ج- تزويدِ النّظام الضّوئيّ الأوّل بالإلكترونات. د- تزويدِ النّظام الضّوئيّ الثّاني بالإلكترونات.


ثانياً: املأ الفراغ بالكلمة المناسبة:

- يعدُ جزيءُ اليخضورِ عاملاً أساسياً في التّركيب الضّوئيّ إذ يحتوي مركزُهُ على
 - 2. تقومُ النّباتاتِ العصاريّةِ بفتح مسامها في فترةِ

ثالثاً: أقارنُ بين المسار الإلكتروني الحلقي والمسار الإلكتروني اللاحلقي من حيث:

النظامُ الضوئيّ الذي يعملُ به المسار - النواتج.

رابعاً: يوضِّحُ المخطِّطُ الآتي خطوات عمليّةِ التّركيب الضّوئيّ في الصانعة الخضراء.



- 1. إلى ماذا تشير كلُّ من الأرقام 1 و 2 و 3؟
- 2. ما مصيرُ الغازِ المنطلقِ من التّفاعلاتِ الضّوئيّة؟
- 3. أكتبُ الصيغةَ الكيميائيّةَ للمركّبِ المرقّمِ بـ 3 النّاتج من التّفاعلاتِ اللاضوئيّةِ.



المفاهيم الأساسيّة:


- شدّةُ التّركيب الضّوئي.
 - العاملُ المحدّدُ.
 - التّنفسُ الضّوئي.

سأتعلّم:

- استنتاجُ أهم العواملِ الخارجيّةِ والداخليّةِ التي تؤثّرُ في عمليّةِ التّركيب الضّوئيّ.
 - شرح مفهوم التنفس الضوئي.

أُولاً: العواملُ الخارجيّةُ External Factors


1. تركيزُ $Concentration) CO_2$: ألاحظُ المخططَ البياني الآتي الذي يمثّل العلاقة بين معدّل التّركيبِ الضّوئيّ وتركيز CO_2 في الوسط.



أستنتج:

 ${
m CO}_2$ يزداد معدّل التّركيب الضّوئيّ بزيادة تركيز ${
m co}_2$ حتّى يثبت عند حدّ معيّن، ثمّ يبدأ بعدها بالانخفاض بسبب غلق المسام والتأثير السام لـ ${
m CO}_2$.


2. شدة الضوع (Light Intensity): ألاحظُ الخطُّ البياني الآتي وأجيبُ عن الأسئلةِ المرافقةِ.



إذا علمت أنَّ الشَّدَاتِ الضَّوئيّةَ العاليةَ تسبّبُ تلفاً في اليخضورِ.

- ؟ ما تأثير تغير شدة الضوع على شدة التركيب الضوئي؟
- المثلى لعملية التركيب المثلى لعملية التركيب الضوئي؟

3. درجةُ الحرارةِ (Temperature): يعودُ تأثيرَ درجةِ الحرارةِ في معدَّلِ التَّركيبِ الضَّوئيّ يعودُ لتأثير ها على نشاطِ الأنظيماتِ في التَّفاعلاتِ اللاضوئيّةِ.




- الاحظُ المخطّطُ المجاورَ وأستنتج تأثيرَ التفاعِ الحرارةِ على العملية؟
 المدارة في عمل العملية؟
- الماذا تتوقف عملية التركيب الضوئي في الدرجات العالية من الحرارة؟

- 4. الأكسجينُ (Oxygen): إن الأكسجينَ ناتجٌ ثانويٌ لانشطارِ الماءِ بعمليّةِ التّفاعلاتِ الضوئيّةِ، فنقصُهُ حولَ النباتِ يؤدّي لزيادةِ معدّلِ التركيبِ الضّوئيّ، بينما زيادةُ التركينِ يؤدّي إلى انخفاض معدّلِ التّركيبِ الضّوئيّ، بسببِ أكسدةِ بعضِ المركباتِ الموجودةِ في الصّانعة.
- \mathbf{O}_2 ما مصدرُ الأكسجين الموجودِ في الهواءِ وضّح بيانياً العلاقة بين غاز \mathbf{O}_2 ومعدل التّركيب الضّوئيّ.

5. الماء (Water):

- الماءُ ضروريِّ لعمليّةِ التَّركيبِ الضوئي، لماذا؟
- ? ما تأثيرُ نقص الماءِ على المسامِّ وعلى عمليّةِ التركيبِ الضّوئيّ؛
 - ? ماذا ينتجُ عن غمرِ نباتاتِ اليابسةِ بالماءِ؟
 - 6. الأملاحُ المعدنيةُ (Mineral Salts): تعملُ بعضُ العناصرِ المعدنيةِ كمساعداتٍ أنظيميةٍ فإنَّ أيَّ نقصٍ فيها يؤثّرُ في عمليةِ التَّركيبِ الضّوئيّ عن طريقِ تأثيرِها في التقاعلات الأنظيمية.
 - ? أصف أوراق نبات البندورة في الصورتين الآتيتين.






- 7. الرياح (Winds): تعملُ الرياحُ على زيادةِ انتشارِ CO_2 داخلَ الورقةِ، ما تأثيرُ ذلك في معدَّلِ التَّركيبِ الضّوئيّ؟
 - المنافر أنه المنافر الرياح عن حدٍّ معيّنٍ على المسام والنتح، وعلى معدل التركيب الضوئي؟

ثَانياً: العواملُ الداخليّةُ

- 1. المحتوى اليخضوري (Chalorophyll Content): اليخضور أساسٌ لعمليّةِ التّركيبِ الضّوئيّ.
- 2. تراكم نواتج عملية التركيب الضوئي (Accumulation Photosythesis Products): إن تراكم الموادِّ العضوية في خلايا الأوراق يقلِّلُ نسبة الماء في الهيولي.
 - ا ما تأثيرُ ذلكَ على عمليّة التّركيب الضّوئيّ؟
- 3. العامل المحدد: عندَ وجودِ جميعِ العواملِ بشكلٍ مناسبٍ و وجودِ أحدِ العواملِ بشكلٍ غيرِ مناسبٍ يعدُّ العاملُ الأخيرُ محدداً لعمليّةِ التَّركيبِ الضّوئيّ بشكلِ كاملِ.



Rubisco

C3 مرکب NADPH + مرکب C2 (سام)

- ? من الشَّكلِ المجاورِ أستنتجُ تأثيرَ شدّةِ الضّوءِ ودرجة الحرارة على عمليّة التّركيب الضّوئيّ.
 - ? ما هو العاملُ المحدّدُ في المرحلتين A وB؟

فائدة بيئية: للحف اظ على البيئة وحمايتها لا بدّ من سنن قوانين مناسبة والتّخطيط للتّوستع العمراني والصّناعي بشكل مناسب.

التنفّسُ الضّوئي: يحدثُ في النباتاتِ ثلاثيةِ الكربون فقط، فهي مثلُ ظاهرةِ التنفّسِ في الميتاكوندريا، إذ يتمُّ فيها امتصاصُ O_2 وطرحُ O_3 وهي مثلُ ظاهرةِ التّركيبِ الضّوئيّ من ناحيةِ اشتراطها للضّوءِ لحدوثِها لذلك سُمّيتْ بالتنفّس الضّوئيّ.

? متى ولماذا تحدثُ عمليةَ التنفّسِ الضّوئيّ؛

- في الظّروفِ الحارّةِ والجافّةِ تعلقُ النباتاتُ مسامها لتفادِي فقدانِ كميّاتٍ أكبرَ من الماءِ تكيّفاً مع هذه الظروفِ. يستمرُّ تثبيتُ ${\rm CO}_2$ بعدَ غلقِ المسامِّ فيتناقصُ تركيزهُ داخلَ بعدَ غلقِ المسامِّ فيتناقصُ تركيزهُ داخلَ الورقةِ بينما يرتفعُ تركيزُ ${\rm O}_2$ الناتج عن تأيّن الماءِ بواسطةِ الضّوءِ.
- ستعملُ أنظيمُ روبيسكو كلاً من CO_2 وعندما يصلُ تركيزُ O_2 كركيزتين (مكربن مؤكسد) لكنّ إلفتهُ إلى CO_2 أكبرُ من إلفته إلى O_2 وعندما يصلُ تركيزُ CO_2) إلى O_2 0 يبدأُ روبيسكو بتثبيتِ O_2 0 بدلاً من O_2 0.
- رغمَ هدرِ الطاقةِ في هذه الظاهرةِ إلا أنَّها تحمي النباتاتِ С3 من قوّةِ أشعّةِ الشّمسِ ولكنّها تؤدّي إلى إبطاءِ النموّ.

الكربون السام	إنَّ مركبَ ثنائي
نُفّسِ الضّوئيّ تتمُّ	الناتج بعملية التنا
سلةِ من التّفاعلاتِ	إزالة سميته بسل
صانعة إلى الجسيم	عبرَ انتقالهِ من الد
الميتاكوندريا	التأكسدي، ثمَّ
	1

ATP C3 مرکب NADPH

التنفّس الضّوئيّ	التّركيب الضّوئيّ	وجه المقارنة
جوُّ جافٌ وحارٌ وضوءٌ	الطبيعية	الظروف
بالترتيب: الصانعة - الجسيم التأكسديّ - الميتاكوندريا	الصانعات الخضراء	المكانُ
يستهلكُ الطّاقةً وينتجُ ثنائي أكسيد الكربون	يستهلكُ الماءَ وثنائي أكسيد الكربون والطاقة الضوئيّة وينتجُ غلوكوز+ أكسجين	الاستهلاكُ والناتجَ

التقويم النهائي

أولاً: أختار الإجابة الصّحيحة في كلِّ ممّا يأتي:

1. المجالُ الحراريُ الأمثلُ لعمليةِ التّركيبِ الضّوئيّ هو:

أ- (21- 20) م ب- (20-30) م ب- (25-30) م ب- (25-30) م

2. في درجاتِ الحرارةِ العاليةِ تتوقّفُ عملية التّركيبِ الضّوئيّ نتيجةً:

أ- إغلاق المسامِّ. ب- تخرُّبِ اليخضور. ج- تخُّربِ الأنظيمات. د- نقص ATP

3. تؤدّي الرّياحُ الشديدةُ إلى:

أ- غلق المسامِّ.

ب- نقصِ معدّلِ التّركيبِ الضّوئيّ.

ج- ارتفاعِ معدّلِ التّركيبِ الضّوئيّ. -(1+ + -).

4. إحدى هذه النتائج غيرُ صحيحةٍ عن عمليةِ التنفّسِ الضوئيّ:

أ- يقلُّلُ النمو. بستهلكُ الطَّاقةَ وينتجُ ٢٠٠٥.

ج- يحمي النبات من الشّدّاتِ الضّوئيّةِ العالية. د- يحدثُ في الليلِ والنهارِ.

ثانياً: أُفْسِرُ علميّاً كلِّ ممّا يأتي:

- 1. ارتفاع تركيز الأكسجينِ بشكلٍ كبيرٍ يُقللُ من معدَّل التّركيبِ الضّوئيّ.
 - 2. الشداتِ الضّوئيّةَ العاليةَ مؤذيةً للنباتِ.
 - 3. نمو معظمَ النباتاتِ بشكلٍ جيّدٍ في فصلِ الربيعِ والصيفِ.
 - 4. تسميةُ التنفس الضوئيّ بهذا الاسم.

ثالثاً: أقارنُ بين عمليةِ التركيبِ الضّوئيّ وعمليةِ التنفّس الضّوئيّ من حيث:

عملُ أنظيم الروبيسكو - الظروفُ التي تتمُّ فيها كلّ عملية.

أبحث أكثر:

- 1. تأثيرُ فترةِ الإضاءةِ في كلِّ من نباتاتِ النهارِ الطويلِ ونباتاتِ النهارِ القصيرِ.
- 2. يحدثُ التنفّسُ الضّوئيّ في النّباتاتِ ثلاثيّةِ الكربونِ ولا يحدثُ في النّباتاتِ رباعيّةِ الكربونِ والنباتات العصارية، مثل الصبار والأناناس.

جهازُ الدوران Circulation System





المفاهيم الأساسيّة:

- نظام دوران.
- نظام دورانٍ مفتوح.
- ا نظام دورانِ مغلق.

سأتعلّم:


- ▼ آلیـة الـدوران لـدی البارامیسیوم
 وهیدریـة المـاء العـدب.
- بنیة جهاز لدوران لدی دودة الأرض.
- بنية جهاز الدوران لدى الحشرات.


تختلفُ الأحياءُ في طرائقِ نقلِ الغذاءِ والفضلاتِ والغازاتِ التنفسيةِ لديها، فبعضُها لا يمتلكُ جهازاً متخصصاً للنقل، في حينَ أنَّ بعضَها الآخرَ لديه أجهزةٌ متخصصةٌ.

الدورانُ لدى الباراميسيوم:

- ا الآليةُ التي يتمُّ بها دخولُ غازِ الأكسجين وطرحُ غازِ الأكسجين وطرحُ غازِ ثنائي أكسيد الكربون من الخليّةِ الوحيدةِ للبراميسيوم؟
 - ? كيفَ يتمُّ توزيعُ الغذاءِ داخلَ الباراميسيوم؟

لا يوجدُ عندَ البار اميسيوم جهازُ دورانٍ متخصّصٍ بلْ تعملُ حركةُ السّيتوبلاسما على توزيع الغذاءِ داخلَ الخليّةِ.





الدورانُ لدى هيدريّة الماء العذب:

يدخلُ الماءُ المحمّلُ بالأكسجين والغذاءِ من الفم إلى الجوفِ الهاضمِ.

- ي من أين يتم إطراح غاز ثنائي أكسيد الكربون والفضلات؟
- كيفَ يتم توزيع الغذاء المهضوم عبر طبقات الجسم؟


الدّورانُ لدى دودة الأرض:

- 🚹 ممَّ يتكوّنُ جهازُ الدورانِ لدى دودةِ الأرضِ؟
- ؟ لماذا يُسمّى هذا الجهازُ بجهازِ دورانِ مغلق؟

بالاعتماد على الشَّكل المجاور أملاً الفراغاتِ بما يناسبُها:

يجري الدمُ في الوعاءِ الظهريّ (القلبِ الرئيس) نحوَ بفضلِ التقلّصاتِ اللاإراديّةِ لجدارهِ، ثمّ ينتقلُ الدمُ عبر المتقلصة إلى الوعاءِ البطني الذي يجري

الدمُ فيه نحو ثمّ يُوزّ عُ الدمُ إلى أنحاءِ الجسمِ.




أضيف إلى معلوماتي

يكونُ لونُ الدم عند دودة الأرضِ أحمرَ لوجودِ الهيموغلوبين المنحلّ في المصوّرةِ والذي يختلف كثيراً عن الهيموغلوبين الموجود في الفقاريّات والبشر، أما الكرياتُ الدمويّةُ فهي عديمةُ اللون ولها دورٌ دفاعيّ فقط.

الدّورانُ لدى الحشراتِ:

بالاعتماد على الشَّكل المجاور أملا الفراغاتِ بما يناسبها:

ي لماذا يُدعى جهازُ الدّورانِ لدى الحشراتِ بجهازِ الدورانِ المفتوحِ؟



أضيف إلى معلوماتي

يكونُ الدمُ لدى مفصليّات الأرجلِ الرّاقيةِ عديمَ اللون، ويصبحُ أزرق اللون في حالةٍ الأكسجةِ لغناهُ بالنّحاس.

التقويم النهائي

أولاً: أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ في كلِّ ممّا يأتي:

1. ينتقلُ الغذاءُ عبر طبقاتِ جسمِ هيدرية الماء العذب ب:

أ- الانتشارِ. ب- الحلولِ. ج- النقلِ الفعّالِ. د- النقلِ الميسَّرِ.

2. يحوي الدم عند مفصليّاتِ الأرجلِ الرّاقيةِ:

أ- الحديد. ب- النّحاسِ. ج- المغنزيوم. د- المنغنيز.

ثانياً: أُعطى تفسيراً علميّاً لكلَّ ممّا يأتي:

1. ليس للدم دور تنفسي لدى الحشرات.

2. لا يوجدُ جهازُ دورانٍ متخصّصِ عندَ البارامسيوم.


3. للكرياتِ الحمر عندَ دودةِ الأرضِ دورٌ دفاعيٌّ فقط.

ثالثاً: أقارنُ بينَ جهازِ الدّورانِ عند دودةِ الأرضِ وعندَ الحشراتِ كما في الجدول الآتي:

الحشرات	دودة الأرض	من حيثُ
		القلبُ
		دوراتُ الدّم
		لونُ الدّم

أبحث أكثر

يمتلك جهازُ الدورانِ لدى الأسماكِ دورةً واحدةً فقط، وهذا يُعرفُ بالدورانِ المفردِ أو الوحيدِ. أبحثُ في مصادرِ التعلِّمِ المختلفةِ عن كيفيةِ مسارِ الدّمِ في هذه الدورةِ الدّمويّة.



المفاهيم الأساسيّة:

- الأقراص المدمجة.
- المخطّط الكهربائيّ للقلب، ضغط الدّم، النبض، شغاف القلب، الضّغط الانقباضيّ، الضّغط الانبساطيّ.


سأتعلّم:

- وصف بنية جدار القلب لدى الإنسان.
 - تمييز أدوار الضّربة القلبيّة.
- مقارنة الأوعية الدّموية بنيوياً ووظيفياً.
- قياس ضغط الدم (الضغط الانقباضي الضغط الانبساطي).
 - استنتاج مفهوم النبض.
 - العوامل المؤثّرةِ في ضغط الدّم.

تشيرُ الإحصاءاتُ إلى أنّ 8 مواليد من كلّ ألفِ مولود لديهم إصاباتٌ خلقيّةٌ في القلبِ %15 من هذه الإصاباتِ عبارة عن ثقوبٍ (فتحاتٍ) في الجدارِ الفاصلِ بين الأذينتين اليمنى واليسرى.

◄ من الصورة المجاورة:

- ا حدّد مكاناً أخر يمكن أن توجد فيه هذه الثّقوب.
- ؟ ما تأثيرُ هذه الثّقوبِ على عملِ العضلةِ القلبيّةِ ووظائفِ الجسم، في رأيك؟






◄ من الشَّكل المجاور:

- ؟ ماذا أُسمَى كلاً من الغشاء الذي يبطِّنُ تجاويفَ العضلة القلبية والغشاء الذي يغطيها من الخارج؟
- إذا علمت أنّ الغشاء الخارجي يمتازُ بطبيعة قليلة المرونة، ما أهمية ذلك في رأيك؟

تبدو أليافُ العضلةِ القلبيّةِ مرتبةً على شكلِ شبكةٍ كبيرةٍ وتفصلُ بينَها أغشيةٌ خلويّةٌ تظهرُ تحتَ المجهرِ الإلكترونيّ على شكلِ تخطيطاتٍ تشبه السلّم تدعى الأقراصُ المدمجةُ (المشابك الكهربائيّة). وعندَ تنبيهِ إحدى خلايا القلبِ تسمحُ هذه الأقراصُ بانتشارِ التنبيهِ من خليّةٍ إلى أخرى دونَ أيَّةٍ إعاقةٍ تقريباً.

الماذا تحتوي أليافُ العضلةِ القلبيّةِ على عددٍ كبيرٍ من الجسيماتِ الكوندريّةِ، في رأيكَ؟





الجهازُ العصبيُ الذّاتيُ في القلب

تجربة: ذاتيّةُ الضربة القلبيّة

الهدف من التجربة: دراسة ذاتية الضربة القلبية.

◄ ألاحظ الشكل المجاور.


مراحلُ تنفيذ التّجربة:

- أحضِرُ ضفدعاً وأقومُ بمساعدةِ مدرّسي بتخريبِ دماغِهِ ونخاعِهِ الشّوكيّ.
- 2. أعزلُ قلبَ الضّفدعِ وأضعُهُ في سائلٍ فيزيولوجي مغذّي (مثل سائل رينجر)، ألاحظُ استمرارَ العضلةِ القلبيّةِ بالخفقان لمدّة زمنيّة. ما تفسيرُ ذلك؟



محلول رينجر: يتكون من مجموعة من الأملاح أهمها كلوريد الصوديوم وكلوريد الكالسيوم وكلوريد البوتاسيوم.

◄ يمثلُ الشّكلُ المجاورُ الجهازَ العصبيَّ الذاتيَ للقلبِ الذي يقومُ بتوليدِ النبضاتِ النظميةِ ثم نقلُها بشكلٍ سريعٍ من خلالِ القلب.




يتكوَّنُ الجهازُ العصبيّ الذاتيُ من عُقَدٍ وأليافٍ.

العقدةُ الجيبيةُ الأذينيةُ: توجدُ في جدارِ الأذينةِ اليمنى بالقربِ من مصبِّ الوريدِ الأجوفِ العلوي وتقومُ بتوليدِ النبضاتِ النظميّةِ الطبيعيّةِ.

في الجدارِ الخلفيّ للأذينةِ اليمنى خلفَ الصّمامِ ثلاثيّ الشّرفِ توجدُ عقدةٌ أخرى تصدرُ عنها حزمةٌ من الأليافِ

اسم هذه العقدة؟ وما اسم الألياف الصادرة عنها؟

تتفرّعُ حزمةُ هيس إلى أليافِ بوركنج التي تنقلُ التّنبيهَ من حزمةِ هيس إلى ذروةِ القلبِ، ومنها إلى قاعدتِه.



رسم تخطيطي لمراحل الضربة القلبية

- ي من أينَ تبدأ الضربةُ القلبيّةُ؟ وكيفَ تتوزّعُ في العضلة القلبيّة؟
- ي ما تأثير كلِّ من الجملة الودية وقرب الوديّة على تقلّص عضلة القلب؟

الدّورةُ القلبيّةُ:

تمرُّ الدورةُ القلبيّةُ بثلاث مراحل:

- ◄ من الشكلِ المجاور:
- 1. أرتُّبُ مراحلِ الدورةِ القلبيّةِ.
- 2. وأستنتجُ ماذا يحدثُ في كلِّ منها؟
 - 3. ما زمن كلّ مرحلة؟

مخطّطُ کهربائيّـة القلب ECG :(Electrocardiogram)

عانى أحدُ أقربائِك من تسرُّع بسيطٍ في ضر<mark>باتِ قلبهِ وطلبَ إليكَ مر افقتَهُ إلى عيادةِ الطّبيبِ ما الإجراءُ</mark> الذي قامَ بـه الطّبيبُ بعد سـماع القصّةِ المرضيـةِ <mark>لقريبِك؟</mark>

مخطّطُ كهربائية القلب: تسجيل الفعاليّة الكهربائيّة للقلب ويُعَدُّ منَ الفحوصاتِ المهمّة؛ لأنّه يكشفُ عن أيِّ مشكلةً أو شدوذ في عملَ القلب.

مبدأُ تخطيط القلب: عندما تعبُرُ النبضةُ القابيّةُ خلالَ القابِ ينتشرُ تيّارٌ كهربائيّ منَ القابِ إلى الأنسجةِ المحيطة به، وتنتشر نسبة صغيرة من هذا التيّار حتّى تصل إلى سطح الجسم، وإذا تمّ وضع مساري

كهربائية على الجلد، فمن الممكن تسجيلُ الكمونات الكهربائيّة المتولّدة عن هذا التيار/ **ECG** وتظهر على جهاز التسجيل بشكل موجات كما في الشّكل المجاور. الموجةُ P: تمثلُ بدايةَ تقلّص الأذينتين.

المركبُ QRS: تحدثُ في بدايةِ تقلّص البطينين.

الموجة T: تتبع تقلّص البطينين.

نشاط:




أدرسُ الأشكالَ المجاورةَ وأقارنُ بينها من حيثُ أطوارُ كلِّ موجةٍ.






بعضُ أمراض القلب

- الذبحة الصدرية: يعد الألم والإحساس بعدم راحة في الصدر العرضين الأساسيين للذبحة الصدرية بالإضافة لأعراض أخرى.
- ◄ أستنتج من الشّكلِ المجاورِ سببَ الإصابةِ
 بالذبحة الصدرية
- المتدرية والجلطة.
- الجلطة: وجودُ خشرة دمويّة في أحدِ الأوعيةِ الدّمويّةِ في الجسم وتختلفُ أعراضُ الجلطةِ باختلافِ مكانِ تشكلِها في القلبِ أو الدّماغ أو الأرجلِ.



▼ يوضَّحُ الشَّكلُ الآتي استخدامَ قَتْطرةِ القلبِ لتوسيع الشَّرايين.



إثراء

قَتْطرةُ القلب: عمليةٌ جراحيةٌ يتمُّ مراقبتُها بواسطةِ الأشعّةِ السينيّةِ والآلاتِ الطبية.


تُستخدمُ لتشخيصِ الأمراضِ التي تصيبُ عضلةَ القلبِ أو الصماماتِ أو الشرايين التاجيةَ التي تُغذي القلب.


أتحاور مع مدرسي وزملائي في كيفية حدوث ذلك.

الأوعيةُ الدمويّةُ Blood Vessels:


شبكة من الأنابيبِ ينتقلُ عبرها الدّمُ في أنحاء الجسمِ باستمرارٍ ولها ثلاثةُ أنواع.

▼ من الشَّكلِ الآتي، ما أنواعُ الأوعيةِ الدمويَّةِ؟





- إذا علمتِ أنَّ الشّرابين التاجيّة تتلقّى 5 % من الدّم الذي يدفعُهُ القلبُ، فما أهمّيةُ هذه الشّرابين؟
- كما تقومُ شرايين الجسم الباقية بنقلِ الدّم من القلب إلى أنحاء الجسم، تقومُ الأوردةُ بوظيفةٍ معاكسةٍ للشرايين أتذكرُ وظيفة الوريدين الأجوفين العلوي والستفلي.



▲ بالاستعانة بالصورة السّابقة، أملاً الجدول الآتى:

الشّعيرات الدمويّة (Capillaries)	الأوردة (Veins)	الشّرايين (Arteries)	وجهُ المقارنة
			بنية الجدار
			وجود الألياف المرنة
			وجود الصتمامات
			اتجاهُ تدفّقِ الدّمِ

نشاط: قياسُ ضغط الدم Sphygmomanometes

ضغطُ الدم: هو قوة دفع الدّم على جدرانِ الأوعيةِ الدّمويةِ.

أفحصُ ضغطَ الدّم لزميلي كما يأتي:


• أربطُ الحزامَ على يدهِ وأضعُ السّماعةَ تحتَ الحزامِ كما في الشكل الآتي، أغلقُ صمامَ الهواءِ وأنفخُ المضخّةَ الهوائيّةَ الخاصةَ بجهازِ قياسِ ضغطِ الدمِ، وأستمرُ في نفخِ الحزامِ إلى أنْ يتوقّفَ الدمُ عن الجريانِ، وهنا لا يُسمع للدمِ أيُّ صوتٍ في السمَّاعةِ.



الضغط على المضخة الهوائية لنفخ الحزام

- يبدأ تفريغ الهواء التدريجيّ للطّوق المطاطي. إنّ القراءة التي تظهر عند سماع الصوت تعدّ القراءة القصوى لضغط الدّم وتسمى (ضغط الدّم الانقباضي).
- تستمر عملية تفريغ الهواء ويعود الدّم بالتدفّق عبر الشريان، ويعود الصّوت للظهور.
- يقل الصّوت تدريجيّاً مع عودة تدفّق الدّم للوضع الطبيعيّ، وعند لحظة معيّنة يختفي الصوت من جديد، إنّ قراءة ضغط الدّم عند هذه النقطة تسمّى (ضغط الدّم الانبساطي).


بمقارنة النّتائج مع الجدولِ الآتي أستطيعُ أن أحدّدَ إن كان ضغطُ دمهِ طبيعيّاً.



الضّغط الانبساطيّ (ملم زئبق)	الضّغط الانقباضيّ (ملم زئبق)	فئات ارتفاع ضغط الدّم
80	120	طبيعيّ
89 - 80	139 - 120	ما قبل ارتفاع ضغط الدّم
90 - 90	159 - 140	ارتفاع ضغط الدّم (المرحلة 1)
أعلى من 100	أعلى من 160	ارتفاع ضغط الدّم (المرحلة 2)
أعلى من 110	أعلى من 180	أزمة ارتفاع ضغط الدّم (تلزم عناية إسعافيّة مستعجلة)

- الضّغط الانقباضيّ (البطينيّ): الضّغط الذي يقوم القلب بتوليده في أثناء ضخّ الدّم عبر الشّرابين عند انقباض عضلته.
 - الضّغط الانبساطي (الأذيني): الضّغط الذي يوافق استرخاء عضلة القلب ممّا يؤدّي إلى انخفاض ضغط الدّم إلى أدنى حدوده.

النبضُ Pulse:




؟ كيف تصف حركة قلبك في صدرك بعد ممارسة نشاط قوي ومستمر ؟

النبض: موجة تتولد في الشرايين نتيجة لانقباض النبض: موجة تتولد في الشرايين القلب، يمكن الإحساس بالنبض عبر تحسس الشرايين الكبيرة في جسم الإنسان في مناطق قريبة من سطح الجسم كالمعصم والعنق.



تصلّب الشّرايين Arteriosclerosis:

▼ أدرس الشّكل الآتي وأتتبع مراحل الإصابة بتصلّب الشّرايين.



يحدثُ تصلُّبُ الشَّرايين نتيجةَ التقدّم بالعمرِ وهناك أسبابُ وعواملُ تؤدّي إلى حدوثٍ تصلِّب شرايين مبكرِ وشديدٍ، أتحاورُ مع مدرّسي وزملائي في هذه الأسباب.


? ما العلاقة بين تصلّب الشّرايين وارتفاع ضغط الدّم؟


الدّوالي (Varicose Vein)؛

تضخُّمٌ في الأوردةِ القريبةِ من سطح الجلدِ.

قد تحدثُ الدّوالي في أيِّ منطقةٍ في أوردةِ الجسمِ، لكنَّها أكثرُ انتشاراً في السّاقين.

- ▼ من مشاهدة الأشكال الآتية:
- المعندا ينتجُ عن عدم قيام الصماماتِ الموجودةِ في الأوردةِ بعملها بكفاءةِ؟
 - ? لماذا يُنصحُ بعدم الوقوف لساعات طويلة؟
 - ا الهمية التمارين الرياضية في الوقاية من الإصابة بالدوالي؟





التّقويم النّهائيّ

أولاً: أصحِّحُ ما تحتّه خطُّ:

- 1. ينتجُ مرضُ الدّوالي عن خللِ في عملِ الشرايين.
- 2. يكون الضّغط الانقباضيّ في الحالة الطبيعيّة أعلى من 160 ملم زئبقي.
 - 3. تمثّل الموجة P في مخطّط كهربائيّة القلب بداية تقلّص البطينين.
 - 4. يمتاز شغاف القلب الذي يغطّي القلب بطبيعة قليلة المرونة.

ثانياً: ما المقصود بكل مما يأتى؟

1. مخطّط كهربائية القلب.


3. الضّغط الانقباضيّ. 4. الشرابين التّاجيّة.

ثالثاً: أعطى تفسيراً علميّاً لكلّ ممّا يأتى:

- 1. عند تنبيه إحدى خلايا القلب ينتقل التنبيه إلى الخلايا الأخرى دون إعاقة.
 - 2. يمكن الإحساس بالنّبض عند الضغط على الشّرايين السّطحيّة.
 - 3. يكون التئام الأوردة أكثر سهولة من التئام الشّرايين.
 - 4. لا تتمزّق الشّرايين القريبة من القلب رغم ارتفاع ضغط الدّم فيها.

رابعاً:

رتب الأشكال الأتية بشكل صحيح لتشكّل مراحل خطوات توصيل النبضة عبر أجزاء القلب، ثمّ صف بشكل بسيط ما يحصل في كلّ مرحلة.



خامساً: سعيد ضغط دمه 70/110 ماذا يعني لك الرقمان؟

ابحث اكثر

لا يمكن لتخطيط القلب تحديد جميع الأمراض المتعلّقة بالقلب، ولكنّه يعطي نتائج دقيقة فيما يتعلّق بأسباب ضربات القلب غير المنتظمة. ابحث في مصادر التعلّم المختلفة عن أمراض لا يمكن كشفها عند تخطيط القلب كهربائيّاً.



المفاهيم الأساسية:

- الكريات الحمر.
- ا هيموغلوبين الدّم.
 - مولد الضّدّ.
 - الضدّ.
- عامل الريزوس.
- الكريات البيض.
- الصفيحات الدّمويّة.

سأتعلّم:

- النّسب المئويّة لمكونّات الدّم.
- وصف بنية الكريات الحمراء واستنتاج وظيفتها.
- إجراء تحليل لأنماط الزمر الدموية وعامل الريزوس.
 - تنظيم مخطّط لآليّة تختّر الدّم.

الدّم سائل الحياة الذي يجري داخل جسم الإنسان وأجسام الكثير من الكائنات الحيّة الأخرى




نشاط:

أحضر من المختبر أنبوب اختبار يحوي دم سحب حديثاً، ثمّ أضعه على حامل لمدّة ساعتين أو أكثر. ماذا ألاحظ؟ يحوي الدّم جزءاً سائلاً وجزءاً خلوياً.

مكوّنات الدّم

▼ أستنتج من الشّكل لآتي:

- ? ما هما هذان الجزءان؟
- ? ما نسبة كل من مكونات الدم؟





الكرياتُ الحمُر (red blood cells) الكرياتُ الحمُر

نشاط:


اجراءُ الصيغة الدّمويّة أو الفيلمُ الدّمويّ


المحتوى العلميّ: تشكّل الكريات الحمر النّسبة العظمي من الخلايا الدمويّة إذ أن مليمتراً مكعّباً واحداً يحتوي 5 ملابين كرية حمراء، ويتراوح عدد الكريات البيض 6000 - 9000 خلية في كلّ مليمتر مكعب دم في الإنسان السليم


أضع قطرة دم متوسطة الحجم على طرف الشريحة أضع الساترة أمام القطرة بزاوية ٤٥ درجة،ثم أسحبها للخلف حتى تلامس القطرة سينتشر الدم على أطرافها → أدفعها للأمام وبزاوية ثابتة

الهدف من التجرية: در اسةُ أشكال الكريّات الدّمويّة الحمراء والبيضاء والصفيحات تحت المجهر أدواتُ ومواد التجرية: عينةُ دم، شريحةٌ زجاجيةٌ، ساترةً، كحولٌ، ملوّنٌ مثلُ ملوّنُ جيمزا أو رايت. مراحل تنفيذ النّشاط:

- أضع الدّم على الصّفيحة كما يظهر في الشّكل المجاور
- أغطّي الصّفيحة بالكحول وأنتظرُ ها حتى تجفُّ مدّة عشر دقائقَ.
- أغطّي الصفيحة بالملوّن (ملوّن رايت أوملوّن جيمزا) مدّة عشر دقائقَ وأتركها حتى تَجفَّ، ثمّ أدر سُها تحتَ المجهَر.
 - المجهر؟ كيف تظهرُ الكرياتُ الحمرُ تحتُ المجهر؟
- أرسم شكلاً للكرية الحمراء كما أراه. وأفسئر لماذا تبدو بلون أحمر؟
- 😯 من الرسم المجاور، ما الفرق بينُ سماكتها في الوسط وعندَ الطرفين؟







أتعلُّم:

الكريات الحمر: أقراص كروية صغيرة مقعرة الوجهين مدة حياتها في الدم حوالي 120 يوماً، ثمّ تتخرّبُ عندما تصبحُ هرمةً في الكبد والطحال، يحيطُ بها غشاءٌ هيولي يؤمنُ مرونتَها، ويمنحَها القدرةُ على تغيير شكلها.

إلى الماذا فقدَتْ الكرياتُ الحمر قدرتَها على الانقسام؟

منشأ الكريات الحمراء:

ا يكون عدد الكريات الحمر عند الرجل حوالي 5.200.000 كرية في كل 1 ملم3 دم.

أضيف إلى معلوماتي


- أمّا عند النساء فيكون حوالي 4.700.000 كرية في
 كل 1 ملم³دم.
- وعند الأطفال يكون بين 3.500.000 و 4.500.000
 كرية في كل 1 ملم3دم.



وظائف الكريات الحمراء:

تحتوي كلُّ كريةٍ حمراءَ على 250 - 300 مليون جزيء تقريباً من خضابِ الدّمِ (الهيموغلوبين Hemoglobin).

- ▼ أدرسُ الشّكلَ الآتي وأستنتج:
- ؟ ممَّ يتألفُ جزيء الهيمو غلوبين؟ وما الطّبيعةُ الكيميائيةُ له؟ وما أهمّيةُ أيونات الحديد الداخلة في تركيبه؟



أضيف إلى معلوماتي

يتكون جزيء الهيم من 4 نوى بيرول ترتبط فيما بينها بروابط مشتركة آحادية وثنائية، يتوسلط جزيء الهيم ذو الشّكل المسطّح ذرّة حديد ثنائية التّكافق.



استنتج إحدى وظائف كريات الدم الحمراء.

تقوم جزئيّاتُ الهيموغلوبين بنقل الأكسجين عن طريقِ ارتباطِ ذرةِ الحديدِ ثنائية التكافؤ بجزيئة الأكسجين وتشكيل خضاب الدّم المؤكسج.

ا الوظيفة المعاكسة لما تلاحظُ في الصورة المعادية والتي تقومُ بها الكرياتُ الحمراءُ أيضاً؟




كما تقومُ الكرياتُ الدّمويّةُ الحمراء بدور مهم في تحديد حموضةِ الدّم ولزوجتِهِ.

الكرياتُ الدّمويّةُ البيضاءُ (leukocytes) White blood Cells):

اشتكي أحدُ زملائي من ألم في المنطقةِ اليمني والسّفليّةِ من بطنه ولدى مراجعتهِ الطّبيبِ كانت أولى تشخيصاتِهِ أنَّه ربَّما يكونُ مصاباً بالتهابِ في الزّائدةِ الدّوديَّةِ وليتأكَّد أكثرَ طلبَ منه التحاليلَ الآتيةِ (تعدادُ للكرياتِ البيضاءِ في الدم ووجودُ الكريّات البيضاءِ في البول).

- الما تفسيرُ ارتفاع عدد الكرياتِ البيضاءِ في حالاتِ الالتهاباتِ؟
- ◄ بالاستعانة بالصورة المجاورة أحاول تحديد معيار تصنيفي أستخدمَهُ للتّمييز بينَ أنواع الكريات البيضاع.

تعدُّ كرياتُ الدّمِ البيضاءِ جزءاً مهمّاً من الجهاز المناعيِّ في جسم الإنسان ويتراوح عددُها عندَ البالغ السّليم بين 6 و8 آلاف كريةً/ ملم مكعب دم تقريباً، ويتغير هذا العددُ تبعاً لعوامل وظيفية ومرضيّة معيّنة



 $oldsymbol{0}_{2}$ في الرنتين O_{2}

▼ أدرسُ الأشكالَ الآتيةَ وأستنتجُ:

- ? معياراً تصنيفياً للكريات البيضاء.
- إلى ما نوع الكريّات البيضاء التي يزداد عددُها في حالة الحساسيّة؟
- الأهمية الفيزيولوجية لإفراز الكريات البيضاء الأساسية مادتي الهيستامين والهيبارين؟

كريات بيضاء غير حبيبية

كريات بيضاء حبيبية



نسبتها أقل من 1 % وتنتج الهيستامين كما تنتج الهيبارين. تستجيب للحساسية.



ولوعة بالمعتدل:

أكثر أنواع الكريات البيضاء انتشاراً تشكل 40 - 75 % قادرة على الانسلال من جدران الأوعية الدموية إلى مواقع



الإصابة وتعمل على يبلعمة الجراثيم.



لمفاويات:

بالعات كبرة:

أكثر خلايا الدم شيوعاً في الجهاز اللمفاوي ونسبتها من 20 - 45 % ولها دور في الاستجابة المناعية.

أكبر أنواع الكريات البيضاء نسبتها 2 - 10 % تعمل على مهاجمة الجراثيم والطفيليات والأجسام الغريبة وتقوم



تشكل ما يقارب 1 - 6 % من الكريات البيضاء. يرتفع عددها استجابة للإصابات الطفيلية والحساسية.

أضيف إلى معلوماتي

تعدّ الحبيبات التي توجد في هيولي بعض أنواع الكريات الدّمويّة البيضاء الحبيبيّة أنظيمات مرتبطة بالغشاء وتقوم بهضم الجسيمات المبتلعة.


أما الكريات البيضاء غير الحبيبيّة فتحتوى في هيولاها على جسيمات حالة تبدو بشكل حبيبات.





تنشأ الصفيحات الدّمويّة من تشطّي خليةٍ في نقى العظم ويتراوحُ عددُها بين 150000 و400000 صفيحةٍ \ ملم مكعّب من الدّم لدى الإنسان السّليم فما دورُ الصّفيحاتِ في الجسم؟

- ؟ عندما تتمزّق الأوعيّة الدّمويّة ما الآليّات التي يقوم بها الجسم للوقاية من ضياع الدّم؟
 - تَخَتُّرُ الدّم:
 - ▼ أدرسُ المخطّطَ الآتي الذي يوضّحُ آلية تختُّرِ الدّمِ وأذكر مراحله واستنتجُ دورَ كلِّ من:
 جدار الوعاءِ الدمويّ والصفيحاتِ الدّمويّةِ وبروتيناتِ التختُّر في البلازما.



" كيفَ يحدثُ؟ وما أهمّيّتُهُ؟


ينجُم التضيّقُ الوعائيّ عن عوامل َعدّة منها:


- 1. المنعكساتُ العصبيّةُ ويسبّبُها الألمُ والتنبيهات الأخرى الصّادرة عن الوعاء المتأذّي.
- 2. عوامل موضعيّة تنشأ من الصّفيحات بإطلاقها مواد مضيقة للأوعية الدموية.

تشكيل السدادة الصفيحية:

تقوم الصفيحات بالسدّ المحكم للوعاء الدمويّ المتأذّي من مراحل عدّة.







أتتبّع المراحل على المخطّط السابق لتختّر الدّم، ثمّ أرتب المراحل الأتية بالشّكل الصّحيح:

7	E	ب	Í
التصاق الصقيحات بجدار الوعاء الدّمويّ المتأذّي إذ تنجذب إلى الكولاجين الموجود في النسيج الضام.	تفعيل الصنفيحات وتحرير محتويات حبيباتها من ATP، السيروتونين، شوارد الكالسيوم، العامل الصفيحيّ وبعض عوامل التختر.	تفعيل الصقيحات لعمليّة التّخثّر بعد تجمّعها وتحرّر العامل الصّفيحيّ.	تجمع الصّفيحات والتصاقها مع بعضها لإغلاق الفتحة في الوعاء الدمويّ.

التخُّثرُ الدمويُ:

▲ من مخطّطِ مراحلِ آليةِ تختُّرِ الدمِ السابقِ، أتتبَّعُ مراحلَ تشكُّلِ الخثرةِ الدمويةِ، بعد تشكُّلِ السدادةِ الصّفيحيّةِ.

بعدَ تكُونِ الخثرةِ الدّمويّةِ ووقفِ النّزيفِ يتمُّ إذابة الخثرةِ بوساطةِ أنظيماتِ خاصّةٍ، ويصاحبُ عمليّة إزالة الخثرة عمليّة التئام الجرح وشفائه.

المسبب عدم تختر الدّم لدى المصابين بمرض الهيموفيليا الوراثي (النّاعور) في رأيك؟

أضيف إلى معلوماتي

وجد أكثر من 50 مادة هامّة تؤثّر على التخثّر الدمويّ متوزّعة بين الدّم والنّسج، يعزّز بعض هذه المواد التّخثّر

Procoagulonts ويثبّط بعضها الآخر التختّر وتدعى مضادّات التّختّر Anti Coagulants. يتوقّف تختّر الدّم أو عدم تختّره على التّوازن بين هذين المجموعتين.

المصورة:

سائلٌ أصفرُ شقّافٌ يجمعُ مكوّناتِ الدّم و يتكوّنُ من 92 % ماءً و8 % موادّ منحلةً وغيرَ منحلةً.

المصوّرةُ الدمويّةُ (Plasma):

- ? ما هو الوسطُ الذي يجمعُ مكوّناتِ الدّمِ؟ وما نسبتُهُ؟
- ? ممَ تتكوّنُ المصوّرةُ؟ وما الأهمّيّةُ الفيزيولوجيّة لها؟

▼ أدرسُ الجدولَ الآتي الذي يبيّنُ مكوناتِ المصوّرةِ الدمويّة وأملاً الفراغَ بما يناسبُهُ.

المصورةُ الدّمويـةُ		
الوظيفةُ الحيويّةُ	المكوّث	
مذيبٌ لكثيرٍ من الموادّ	الماءُ	
تنظيمُ الضغطِ الحلوليّ و	الشواردُ (الأيونات) المعدنية Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺² , Mg ⁺² , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻	
تنظيمُ الضّغطِ الحلوليّ	بروتينات المصوّرةِ الألبومين مولدُ الليفين الأضدادُ	
مواد تنتقل عبر الدم مواد غذائية: (الغلوكوز والحموضُ الدسمةُ، الفيتامينات) فضلاتٌ استقلابيّةٌ: (بولةُ، حمضُ البولِ، كرياتينين) تنشأ من الغازاتُ المنحلّةُ: (الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون) الحاثاتُ (الهرموناتُ): تنتجُها		

زُمَرَ الدّم

1. زُمَرَ الدّمِ (ABO)

- لاحظ الطّبيبُ النمساويُ كارل لاندشتاينر فشلَ بعضِ محاولاتِ نقلِ الدمِ والتي أدّت إلى وفاةِ بعض المرضى.
- اكتشف وجود بروتينات سكرية مرتبطة بأغشية كريات الدم الحمراء أطلق عليها اسم مولدات الضدة، ووجود أجسام مضادة في مصورة الدم.
- في عام 1901 م تمَّ تحديدُ أربع زُمرٍ للدم لدى البشرِ بناءً على وجودِ أو عدم وجودِ نوعين من البروتينات السّكريّة هما B، A.


	المجموعة A	المجموعة B	المجموعة AB	المجموعة O
نوع كريات الدم الحمراء	A	В	AB	0
الأجسام المضادة (الأضداد) في البلازما	Anti-B			and Anti-B
مولدات الضد (المستضدات) على سطح كريات الدم الحمراء	٩ المستضد A	♦ المستضد B	••	غير موجودة

◄ أدرسُ الجدولُ
 الآتيَ لزمرِ الدم،
 وأملأُ الفراغاتِ
 فيه.

- ١٠٤ ماذا يحدثُ لو اجتمعَ مولِّدِ الضّدِّ A معَ الجسمِ المضادِ الموافقِ له، كما في حالاتِ نقلِ الدّمِ الخاطئة؟
 - ◄ ألاحظُ الشَّكلَ المجاورَ لنسبِ انتشارِ الزَّمرِ الدَّمويَّةِ.
 - ? ما أكثرُ الزمرِ الدّمويّةِ انتشاراً؟ وما أقلُّها انتشاراً؟
 - وهل تختلف نسبتها من مكان إلى آخر في العالم؟

2. عامل ريزيوس:

- في عام 1940م تمّ اكتشاف نوع من البروتيناتِ السُكّريّةِ على سطح أغشيةِ الكرياتِ الحُمرْ لنوعٍ من القردةِ يُسمّى (rhesus monkeys) أُطْلِقَ عليه عاملُ ريزيوس، وعندَ إضافةِ الجسمِ المضادِّ لعاملِ ريزيوس إلى قطراتِ دمٍ بشريّةٍ المضادِّ لعاملِ ريزيوس إلى قطراتِ دمٍ بشريّةٍ فإنَّ تفاعلَ تخثرٍ قد يحدثُ مع بعضِ أنواعِ الدماءِ وقد لايحدثُ مع دماءٍ بشريّةٍ أخرى.
- يكونُ الشَّخصُ إيجابيّ الريزيوس +Rh عندما يوجدُ مولِّدُ الضدِّ Rh على سطح كرياتهِ الدمويّةِ الحمراءِ، و85 % من البشرِ يحملونَ عاملَ ريزيوس إيجابيّاً.
- ? متى نطلق على الشّخصِ سلبيّ الرّيزيوس؟ وما نسبةُ البشر الذين يحملونَ عاملَ ريزيوس سلبيّاً؟



هل تعلم؟

إنّ صفة زمر الدّم وصفة عامل الريزوس صفات وراثيّةً.

لا يوجدُ أضدادٌ لعامل ريزيوس في الدّم سواءَ كان إيجابيّ الريزيوس أم سلبيّ الريزيوس. كما يؤدّي نقلُ الدم من شخص Rh^+ إلى شخص Rh^- الى تكوين أضداد تجري في دم الأخير ترصّ الكريات الحمر في الدّم إذ Rh^+ نقل إليه مرّةً أخرى.

نشاط:

المحتوى العلمي للنشاط: تعدّ زمرة الدّم أهمّ ما يبحث عنه الأطبّاء في السّجّلات الصّحيّة لأيّ مريض

قبل إجراء أيّ فحص أو عمليّة.

الهدف: الكشف عن زُمرِ الدمِ.

المواد والأدوات اللازمة: شرائح زجاجية نظيفة - ثاقبات معقّمة - أنبوبة لمحلول Anti-A، أضداد Anti-B (أضداد لعامل ريزيوس)، وكحول 70 % - وقطن وعيدان طبية مدبّبة الطّرفين.









طريقة العمل:

- 1. أمسَحُ أحدَ أصابع اليدِ بالكحولِ، ثمَّ أثقبُهُ بالثَّاقبِ المعقّمِ.
- 2. أمسَحُ القطرةَ الأولى من الدَّم بوساطةِ القطنِ، ومن دونِ أن يلمسَ الإصبعُ الشَّريحة، أضعُ ثلاثَ قطراتٍ من الدّم على الشَّريحةِ.
- 3. أضيفُ قطرةً من Anti-A إلى قطرةِ الدّمِ الأولى وقطرةِ من Anti -B إلى قطرةِ الدّمِ الثانية.
 - 4. وقطرة من Anti-Rh) Anti-D) إلى القطرة الثَّالثةِ من الدّمِ.











- أحدًد في حالِ كانت النّتائج كما في الشّريحة المجاورة، أحدد زمرة الدم.
- 8. أصِّممُ جدولاً إحصائياً لأنواع زمر الدَّم لطلبةِ صفَّك الدّراسيّ.

نقلُ الدم

يلجأ الأطباء أحياناً إلى القيام بعمليّاتِ نقلِ الدّم لبعض المصابين

◄ أدرسُ الشَّكلُ المجاورَ وأستنتجُ شروطَ نقل الدم.

أرسمُ مخطّطاً لنقل زمر الدّم وفقَ الزمر ABO.

				**	,				
	Туре	О-	O+	В-	B+	A -	A +	AB-	AB+
	AB+	•	•	•			•		
	AB-	•							
زمرة دم	A+		6						
دم الاخد	A -								
7	B+	•	•	•					
	B-	•		•					
	O+								
	0-								

زمرة دم المعطي


جدول نقل زمر الدم وفق الزمر الدموية A- B - AB وعامل ريزيوس

دم المعطي Rh	دم الآخذ Rh	إمكانية النقل
+	+	************
-	-	
-	+	
+	-	************

◄ أملأ الجدول المجاورَلنقلِ الدّم وفق عاملٍ ريزيوس.

وضع إشارة صح 🗹 في حال إمكانيّةِ نقل الدّم، وإشارة غلط 🔀 في حال عدم إمكانيةِ النّقلِ.

تأثيرُ عامل ريزيوس على الحُمل




بِمِثِّلُ عاملُ ربزبوس مشكلةً في أثناء الحمل فقط إذا كانت الأمُّ سالبة َ




تهاجم الأجسام المضادة التي تكوّنت في دم الأم خلايا الدّم الحمراء للجنين في الحمل الثَّاني.



دم الأم يكون أجساماً مضادة لمولّد الضّدّ Rh.



تسرّب بعض خلايا دم الجنين إلى دم الأم عند انفصال المشيمة.



? كيفَ يمكنُ تفادى الأخطار الناتجة عن عدم توافق عامل ريزيوس بينَ الأم والجنين؟





أمراضُ الدّمِ

فقرُ الدّم Anemia:

◄ ألاحظُ الشَّكلَ المجاورَ وأستنتجُ وصفاً لفقرِ الدّمِ.

أهمُّ أنواع فقر الدّم:

فقر الدّم النّاتج عن نقص الحديد (المصوريّ)

- يعد عنصر الحديد الذي يدخل في تركيب جزئية خضاب الدم من أهم العناصر اللازمة للدم . لماذا في رأيك؟
- أتحاور مع زملائي حول السبب الرئيس لفقر
 الدّم النّاتج عن نقص الحديد.



تركيز الكريات الحمر الطبيعي

تركيز الكريات الحمر في فقر الدم

کیف یمکن علاج هذا المرض فی رأیك؟

كيفَ يتمُ تشخيصُ فقر الدم المصوري؟

يُلجأُ في حالِ الشّعورِ بأعراضِ فقرِ الدّمِ النّاتجِ عن نقصِ الحديدِ وأهمُّها النّعبُ وشحوبُ البشرةِ وخفقانُ قلبٍ سريع وصعوبة في التّنفّس عند بذل أيّ مجهود إلى إجراء تحاليلَ منها:

- قياس نسبة الهيمو غلوبين في الكريات الحمر: وتتراوح النسب الطّبيعيّة له:

عندَ الرّجالِ: 13.5 - 17,3 غرام من خضاب الدم / 100 مل.


عندَ النّساءِ: 12 - 16 غرام من خضاب الدم / 100 مل.


أما عندَ الأطفالِ فتختلفُ النّسبُة حسبَ عمر الطّفلِ وجنسِهِ.

• الهيماتوكريت: النسبةُ المئويّةُ لحجم الكريّاتِ الدّمويّةِ الحمراءِ من إجمالي حجم الدّم وتتراوحُ نسبهُ الطّبيعيّةُ:

عندَ الرّجالِ: 40 - 52 %


عندَ النَّساءِ: 35 - 47 %





فقرُ الدّمِ المنجليّ:

- ◄ ألاحظُ الشَّكل المجاور وأستنتج:
- ؟ كيف يتغير شكل الكريات الحمر فى فقر الدّم المنجلى؟
- ؟ ما أهم المشاكل الناتجة عن فقر الدّم المنجلي؟



من الأمراضِ الوراثيّةِ التي ينتج عنها تغيّر شكلِ جزيئةِ خضابِ الدّمِ فيصبحُ عاجزاً عن القيامِ بوظيفتهِ في نقلِ الأكسجينِ بشكلٍ جيّدٍ.

كثرةُ كريات الدم الحمراء (احمرارُ الدم):

حالة تتميّزُ بازديادِ عددِ كرياتِ الدمِ الحمراءِ ممّا يؤدي إلى جعلِ الدّمِ أكثرَ لزوجةً وأقلَّ قدرةً على الجريان عبر الأوعيةِ الدّمويّةِ.

يمكنُ أن يعاني بعضُ المصابين بهِ من الصداع واحمر ار الجلدِ والتّعبِ وارتفاع ضغطِ الدم وغيرِها.



أعما فوائد التبرع بالدم؟

يُعْتَقَدُ أَن كَمّيّةَ الدّمِ التي يتمُّ التّبرّعُ بها من شخصٍ واحدٍ قادرةٌ على إنقاذِ ثلاثةِ أشخاصٍ. و نحتاجُ للتّبرّعِ بالدّمِ؛ فلا وجودُ لوسيلةٌ أخرى لإنتاجِهِ. وبعد عمليّةِ التبرّعِ يتمُّ حفظُ الدّمِ في بنوكِ خاصّةِ لاستخدامِهِ بعدَ إجراءِ الفحوصاتِ اللازمةِ.

يساهمُ الأشخاص ُ الذين يتبرّعون بالدم بإنقاذِ الأشخاصِ المصابين بالسرطانِ، فقرِ الدّم العاديّ والمنجليّ والعديدِ من أمراضِ الدّم الأخرى.



قطرة دم = حياة

التّقويم النّهائيّ

أولاً: أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ لكلِّ ممّا يأتى:

1. يكونُ عددُ جزيئاتِ الأكسجينِ التي ترتبطُ بجزيئةٍ واحدةٍ من خضابِ الدّمِ:

أ- جزيئةُ واحدةُ. ب- جزيئتان. ج- ثلاثُ جزيئات. د- أربعُ جزيئات.

2. خلايا كريات الدّم الحمراء:

ب- تعيشُ لعدّة سنوات.

أ- تتكاثر ذاتياً بالانقسام

د- تحوي أضداداً على سطحها الخارجيّ.

ج- تحوى الهيمو غلوبين.

3. المرحلةُ الأخبرةُ من التّختُّر هي:

أ - المرحلة التي تتطلّب شوارد الكالسيوم. ب- ظهورٌ خارجيّ لسيلان الدّم

د- تحوّلُ مولّدُ الليفين إلى خيوط الليفين.

ج - تحوّلُ طليعةُ الخثرين إلى خثرين.

4. الانخفاضُ في الخلايا اللمفاويّة يمكنُ أن ينتجَ عنه مشاكلُ:

د- كلُّ ما سبقَ صحيحٌ.

أ- في التّخثّر ب- مناعيّة ج- في نقل الأوكسجين.

ثانياً: أصحِّحُ ما تحتَّهُ خطُّ:

- 1. يرتفعُ عدد الكريّاتِ البيضاءِ الولوعةِ بالمعتدلِ في حالاتِ فرطِ الحساسيّةِ.
 - 2. يكونُ صاحبُ الزّمرةِ الدّمويّةِ AB معطياً عامّاً لجميع الزمر.
- 3. يكونُ حجمُ كرياتِ الدم الحمراءِ من إجمالي حجم الدّم عند الرّجالِ في الحالةِ الطبيعيّةِ أقل من .35%
 - في حالات فقر الدّم يصبح الدمم أكثر لزوجةً وأقلّ قدرةً على الجريان في الأوعية الدّمويّة.

ثالثاً: أعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتى:

- 1. يزدادُ عددُ الكرياتِ الحمراءِ في الذَّكور عنها في الإناثِ.
 - 2. لا يتختَّرُ الدِّمُ في الأوعية الدّمويّة في الحالة الطبيعيّة.
 - 3. ارتشاحُ الدّم من الشّعريات الدّمويّة.

رابعاً: إذا كان عدد الكريّات الدّم الحمراء يساوي 5 ملايين/ ملم3 دم. أحسب:

كم عدد خلايا الدّم الحمراء والبيضاء في وحدة الدّم التي تتّسع لـ 476 ملم 3 دم.

خامساً: عندَ إجراء تحليل للكشفِ عن زمر الدّم لأربعة أشخاصٍ، ظهرتْ الشّرائحُ المستخدمةُ كما في الجدول الآتي: أحدِّدُ زمرة دم كلّ شخص.

فإذا علمت أنّ الشّكل و يدل على تختّر الدّم والشّكل الى عدم تختّره.

زمرة الدم	الشرائح	الشخص
	Anti-A Anti-B Anti-Rh	الأوّل
	Anti-A Anti-B Anti-Rh	الثّاني
	Anti-A Anti-B Anti-Rh	الثّالث
	Anti-A Anti-B Anti-Rh	الرّابع

تفكيرٌ ناقدٌ

لماذا لايتمُّ إخراجُ الهيمو غلوبين بوساطةِ الكليةِ إلى خارجِ الجسمِ عند انتهاءِ عمرِ الكريات الحمراءِ وتحطمِها وتحرير الهيمو غلوبين في مجرى الدّم؟



المفاهيم الأساسيّة:

- اللمف.
- العقد اللمفية.
- القناة الصدرية.
 - الدوالي.


سأتعلّم:

- كيفية نشوء اللمف.
- المقارنة بين تركيب الدّم وتركيب اللمف.
 - وصف بعض أمراض القلب.

يتسرّبُ الماءُ والبروتيناتُ وموادّ أخرى من الشّعيرات الدّمويّة إلى المسافات بينَ الخلويّة المحيطة بها ممّا يسبّبُ الانتفاخَ.

- ? ما الجهازُ الذي يعملُ على إعادة الستوائلِ الزّائدةِ من أنسجةِ الجسم إلى الدّم؟
 - ? وما الوظائفُ الأخرى التي يقومُ بها هذا الجهازُ؟

يتكوّنُ الجهازُ اللمفاوي من اللمف والعقدِ اللمفاويةِ والأوعيةِ اللمفاويةِ.




نشوءُ اللهف؛

- ▲ ألاحظُ الشَّكلَ السَّابق: بالاعتماد عليه أملاً الفراغات بما يناسبُها.
- ترتشخ المصوّرةُ الدمويّةُ من إلى الفراغاتِ بينَ الخلايا مشكّلةً .
 - تنفذُ السوائلُ إلى الأوعيةِ اللمفيةِ مشكّلةً سائلاً يُسمّى
 - - ? ما المكوّناتُ الموجودةُ في الدّم وغيرُ موجودةٍ في اللمف؟
 - ? أَفْسُر للمف دورٌ في الدَّفاع عن الجسم ضدّ الجراثيم والفيروسات وغيرها.



أتعلم:

يتكوِّنُ اللمفُ من المصوّرة والخلايا اللمفاوية وبروتينات معينة كالأضداد ومولد الليفين.




◄ ألاحظُ الشَّكلَ المجاورَ ثمّ:


- ? أحدِّدُ موقع العقدِ اللمفاويّةِ.
- عا أهم الأوعية اللمفاوية (القنوات) في هذا الجهاز؟
- الأمفاوي. الجهاز المفاوي.

العقدُ اللمفاويةُ:

تقعُ العقدُ اللمفاويّةُ ذاتُ الشّكل البيضويّ غالباً على مسيرِ الأوعيّة اللمفاويّة ويقدر عددها بحوالي مسال العقدُ اللمفاويّة ويقدر عددها بحوالي مسال عقدة.



- ▲ ألاحظُ الشكلَ السّابق وأجيب:
- ا الهمُّ أنواع الخلايا التي يمكنُ ملاحظتُها داخلَ العقدِ اللمفيّةِ؟
- ؟ بمَ يختلفُ السّائلُ الدّاخلُ إلى العقدةِ اللمفيةِ عن السّائلِ الذي يخرج منها في رأيك؟ تعملُ العقدُ اللمفاويّة كمصفاةٍ تنقيّ اللمف من الجراثيم والخلايا التالفة.
 كما يتمّ فيها تكاثرُ الخلايا اللمفاويةُ لمواجهةِ العواملِ الغريبةِ.
 - ا أَفْسُرُ: تتضخَّمُ العقدُ اللمفاويةُ في حالات التهاب النسج القريبةِ منها.



الأوعيةُ اللمفاويّة:

شبكة من الأنابيب تنقلُ اللمفَ في جميع أجزاء الجسم بحيث ينسابُ اللمفُ من أوعية دقيقة متفرّعة كثيرة العدد إلى أوعية لمفيّة أكبر.

- ◄ ألاحظُ الشكلَ المجاورَ وأستنتجُ:
- عا هي أكبر الأوعية اللمفاوية في الجسم؟
- أين تصبُّ كل من القناة الصدريّة (القناة اللمفاوية اللمفاوية اليمنى لتُعيدَ اللمف إلى الدم؟


القناةُ الصدريةُ:


- تصدرُ عن الخزانِ الكيلوسي (صهريج باكه) وتجمعُ اللمفَ من جميع أنحاء الجسم عدا الذراع الأيمن والجهةِ اليمنى من الصدرِ والرّأسِ والرقبةِ والفصِ السفليّ الأيسرِ من الرئةِ ما الذي يقومُ بجمعِ اللمفِ من هذه الأعضاءِ؟
 - يعدُّ نقئ العظم والغدّة التيموسيّة من الأعضاء الأوّليّة في الجهاز اللمفاويّ.
 - إ ما الأعضاءُ الثانويّةُ في الجهاز اللمفاويّ؟

الطّحالُ:

◄ ألاحظُ الشكلَ المجاورَ وأحدِّدُ موقعَ الطحال.

يحتوي الطحالُ على عقدٍ لمفاويةٍ تُعرَفُ باسم كرياتِ مالبيكي تعمل على إنتاج الكريات البيضاء اللمفاوية، لذلك يكون له دورٌ مناعيِّ. أتذكر وظائف أخرى للطحال.





اللوزتان:

- ◄ ألاحظ الشّـكل المجـاور وأسـتنتج موقع اللوزتيـن؟
- الماذا تعد اللوزتان من الجهاز اللمفاوي في رأيك؟
- أحاور زملائي لمعرفة بعض أعراض التهاب اللوزتين.

تعدُّ اللوزتان عُقدتين لمفاويتيّن تعملانِ على وقايةِ الجسمِ من الفيروسات والجراثيمَ التي تدخل إلى الجسم، ولكنّهما تكونان أحياناً عرضة للإصابةِ بهذه العوامل الغريبة.

أمراضُ الجهازُ اللمفاويّ



داءُ الفيل:

مرض نادرٌ يصيبُ الجهازَ اللمفاوي تسببهُ ديدانٌ خيطيّةٌ تؤدّي إلى ارتخاء الأوعيةِ اللمفاويّةِ والتهابِها وتورّمِها وتضخُّمِ المنطقةِ المصابةِ وخاصّةً الأطرافُ.

? لماذا تتضخَّمُ الأطرافُ في رأيك؟

سرطانُ العقد اللمفاويّة:

يحدثُ نموٌ زائدٌ غيرُ طبيعيّ في أنسجة العُقدِ اللمفاويّةِ والخلايا اللمفاويّةِ ممّا يؤدّي إلى تضخّم هذه العقد.

- الحدّد بعض المواضع في الجسم التي يظهر فيها تضخّم للعقد اللمفاوية.
- أتحاور مع زملائي حول أكثر الأساليب
 المتبعة في علاج سرطان العقد اللمفاوية.
- أذكر اسمَ مركز طبيِّ متخصّصِ في علاج الأورامِ السرطانيّةِ في الجمهوريّةِ العربيّةِ السوريّةِ.



يُعَدُّ مشفى البيروني المشفى التّخصصي في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة الذي يقوم بمعالجة الأورام إذ يقدم الخدمات التّشخيصيّة والعلاجيّة المتابعة للحالات الورميّة بشكل مجانيّ لأبناء الجمهوريّة العربيّة السّوريّة جميعهم.

التّقويم النّهائيّ

أولاً: كيفَ ينشأ اللمفُ؟ وما الوعاء اللمفي الذي يُعيدُهُ إلى الوريد تحت َ التّرقوةِ الأيسر؟

ثانياً: أذكرُ وظيفةً واحدةً لكلِّ مما يأتى:

القناة اللمفية اليمني، كريات مالبيكي، العُقد اللمفية.

ثالثاً: أعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتى:

أ- يتختّرُ اللمفُ ببطءِ.

ب- تتضخَّمُ العقدُ اللمفاويةُ في حالاتِ سرطان العقد اللمفاويّة.

ج- يكونُ اللمفُ الخارجُ من العقدِ اللمفيةِ خالياً من الجراثيم والخلايا التّالفةِ

د- للطحالِ دورٌ مناعيٌ.

رابعاً: أقارنُ بين الدّمِ واللمفِ من حيثُ: اللونُ، سرعةُ التختُّرِ.

خامساً: شعر أحمد بألم تحت الإبط عندما أصيب بجرح غائر في يده. ما تفسيرك لذلك؟

أبحث أكثر

- «من لونِ البلغم نعرفُ نوعَ المرضِ» مقالةٌ طبيّةٌ تشدُّ الانتباه، فمن المعروف أن البلغمَ عديمُ اللون ولكنْ قد يكون بلونٍ أصفرَ أو رماديّ أو أخضرَ أو مصحوباً بالدم. أبحث في مصادرِ التعلّم المختلفةِ عن دلالةِ كلّ لونِ من هذه الألوانِ التي قد يأخذُها البلغمُ لدى بعض المرضى.
 - تقمص دور عالم أحياء أو طبيب ونظم زاوية صفية أو زاوية في معرض تضم ما يأتي:
 - اقتراح برامج غذائية للوقاية، علاج فقر دم، أو ضبط ضغط الدم أو غير ذلك.
 - 3 الوقاية من الإيدز
- 2 مخاطر التّدخين وكيفيّة الإقلاع عنه
- 5 داء الفيل.

4 سرطان العقد اللمفاويّة.

The Immune System الجهاز المناعي





المفاهيم الأساسيّة:

- الجهازُ المناعيُّ غير المتخصّص.
 - البروتيناتُ المتمّمةُ.
- الاستجابةُ الالتهابيّةُ الموضعيّةُ.
- الهيستامين البلعمة الإنترفيرونات.
 - الخلايا القاتلةُ الطبيعيّةُ.

سأتعلّم:

- التمييزَ بينَ الجهازِ المناعي المتخصص والجهاز المناعيّ غير المتخصص.
- تسمية بعض وسائل الجهاز المناعي غير
 المتخصص ودور كل منها في الجسم.
- استنتاج عملية التكامل بين وسائل الجهاز المناعي الخلطي والخلوي.

أحاورُ زملائي وأحدّدُ مستعيناً بالصّورِ الآتيةِ بعضَ الأعضاءِ الحيويّةِ التي يستخدمُها الجسمُ في التصدّي للعواملِ الغريبةِ.



الجهارُ الذي تشكَّلُهُ تلك الأعضاءُ؟



أستنتج_

يتألّفُ الجهارُ المناعيُّ من مجموعة أعضاء وخلايا مع مفرزاتها، تشكّلُ بمجموعها حاجزاً واقياً للجسم ضدَّ الأجسام الغريبة كلِّها.

يُقْسَمُ الجهازُ المناعيّ في الجسمِ إلى جهازٍ مناعيّ غير متخصّصٍ وجهازٍ مناعيّ متخصّصٍ.


نشاط:


- أَنْعِمُ النّظرَ في الشّكلِ المجاور الذي يوضّحُ عدداً من الوسائلِ المناعيّةِ غيرِ المتخصّصةِ التي تشكّلُ خطَّ الدّفاعِ الأوّلِ في الجسمِ. وأجيب عن السّؤال الآتي:
- الماذا أسمّي هذه العواملَ غيرَ المتخصّصة بالمناعة الطبيعيّة (الفطريّة)؟
- لَصنفُ العواملُ المناعيةَ الموضحةَ في الشكل، في الموضع المناسب لها في المخطّط، وأبيَّنُ الدورَ المناعيَّ لكلًّ منها:

في الجسم من عواملَ آلية وعوامل كيميائية

المناعةُ الطبيعيّةُ: استجابةٌ غيرُ متخصّصةٌ يقومُ بها الجهازُ

المناعيُّ ضدَّ جميع العواملِ الغريبةِ المهاجمةِ.





تُسمّى المناعةُ التي تنتجُ عن موادٍ كيميائيةٍ في الدّم واللمف بالمناعةِ الخلطيّةِ.


بينما تُسمّى المناعةُ التي تنتجُ عن تصدي الخلايا للأجسام الغريبة بالمناعة الخلويّة. قد تخترقُ الفيروساتُ والجراثيمُ خطَّ الدفاعِ الأوّلَ (كما في حالةِ التعرّضِ لجرحٍ) يقومُ عندئذٍ خطُّ الدّفاعِ الثّاني في الجسمِ بالتّصدِّي للعواملِ الغريبةِ من استجابةٍ مناعيّةٍ غير متخصّصةٍ بوسائلُ عدّةٍ:

1. البروتيناتُ المتمَّمةُ Complement proteins:

هي سلسلة من البروتيناتِ يُنتجُها الكبدُ وتجولُ في الدم بصورة غيرِ فعَالةٍ لكنّها تنشّطُ بفعلِ الأجسام الغريبة.

نشاط:

◄ من دراسة الشَّكلِ الآتي أتتبَّعُ آلية عملِ البروتيناتِ المتمِّمةِ في تحلّلِ الخليّةِ الغريبةِ:



2. الاستجابةُ الالتهابيّةُ الموضعيّة local inflammatory response

نشاط:



- ◄ أنعمُ النّظرَ في الشّكلِ المجاورِ، وأجيب
 عن الأسئلة الآتية:
 - ? ماذا يحدثُ في كلِّ منَ المراحلِ؟
 - 0 2 3 4


? ما تفسيرُ الاحمرارِ، والانتفاخِ في منطقةِ الالتهابِ؟

أُوضِّحُ عمليّةَ التّكاملِ بينَ وسائلِ الجهازِ المناعيِّ الخلطيِّ والخلويِّ غيرِ المتخصّصِ في عمليّةِ الالتهابِ


? ما سبب تشكّل القيح في منطقة الالتهاب؟



تحرّر الخلايا البدينة في الجلد مادة الهيستامين
 التي تسبب توسع الأوعية الدموية في المنطقة
 المصابة مما يزيد من تدفق الدم إليها.



2 ترتشح السوائل من الشعيرات الدموية البالمعتب المصاب حاملة معها البالعات المعتدل الكبيرة والخلايا ذات النوى عديدة الفصوص ويبدأ الراولوعة بالمعتدل).



 قوم البالعات الكبيرة والخلايا الولوعة بالمعتدل ببلعمة العوامل المسببة للالتهاب ويبدأ الجرح بالالتنام.

أضيف إلى معلوماتى

الخلايا البدينة Mast cells: خلايا توجدُ في النسيج الضامِّ الرَّخوِ ذاتُ شكلٍ كرويٌ أو مغزليٌ تفرزُ الهيبارين لتخفيفِ تفرزُ الهيبارين لتخفيفِ لزوجةِ الدَّمِ الذي يتدفَّقُ إلى المنطقةِ المصابةِ.

3. البلعمة Phagocytosis:

نشاط:

أنعمُ النّظرَ في الشّكلِ المجاورِ الذي يُوضّعُ مراحل البلعمة،
 وأجيب عن الأسئلة الآتية:





- ? ما مراحلُ البلعمة؟
- ? ما الخلايا المناعيةُ القادرةُ على البلعمةِ في جسمي؟

البالعاتُ الكبيرةُ Macrophages

تنشأُ من خلايا جذعية نقوية في نقي العظم وتتحوّل في الدّم إلى خلايا وحيدة النواة وتتحول في الخلايا إلى البالعات الكبيرة من وظائفها:

- القضاء على الكائناتِ الدّقيقةِ واليرقاتِ
 - مهاجمةُ الفيروساتِ والتهامِها.

الخلايا ذات النواة عديدة الفصوص الولوعة بالمعتدلِ (العدلات) Neutrophils


تتميزُ بأنها متحرّكةَ، تتّجهُ نحوَ المنطقةِ الالتهابيّةِ وتعملُ على التهامِ العواملِ الممرضةِ وحمايةِ الأنسجةِ المجاورةِ.

العرقفُ وظائفَ أخرى للبالعات الكبيرة؟

4. الخلايا القاتلةُ الطبيعيّةُ NK) Natural killer cells):

تعملَ على مراقبة الخلايا السرطانية والخلايا المصابة بالفيروسات وتقوم بقتلِها.


▼ أستنتجُ من الشَّكلِ الآتي مراحلَ عملِ الخلايا القاتلةِ الطبيعيّةِ.



5. الإنترفيرونات Interferons:

نشاط:

▼ أدرسُ الشَّكلَ وأجيب عن الأسئلة الآتية:



- 1 ما الخلايا التي تفرزُ الإنترفيرونات؟
- الما دورُ الإنترفيرونات في الحدِّ من انتشارِ الإصاباتِ الفيروسيّةِ في خلايا الجسمِ؟
 - استنتج مستعيناً بالشّكلِ السّابق تعريفاً مناسباً للإنترفيرونات.

التّقويم النّهائيّ

أولاً: أصلُ بخطّ بين العبارة في العمود (آ) معَ المفهوم العلميّ المناسب في العمود (ب):

العمود (ب)	العمود (آ)
الأغشيةُ المخاطيّةً	موادً كيميائيّةً تفرزها الخلايا في المنطقةِ الالتهابيّة
البروتيناتُ المتمّمةُ	من الوسائلِ المناعيةِ غيرِ المتخصّصةِ في خطِّ الدفاعِ الأول
الخلايا البالعة	تحدثُ ثقوباً في غشاءِ الخليةِ الغريبةِ المهاجمةِ
الهستامين	تقومُ بمراقبةِ الخلايا السّرطانيّةِ والقضاءِ عليها
الخلايا القاتلة الطبيعية	

ثانياً: أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ لكلِّ ممّا يأتى:

1. تعودُ الوسائلُ الآتيةُ لخطِّ الدفاع الأولِ عدا:

أ- الجلد ب- حموضة البولِ ج - العرقُ د- الإنترفيرونات

2. يصنف عمل الخلايا القاتلة الطبيعية:

أ- مناعة َخلطيةً. ب- مناعة خلويةً. ج- مناعة حاجزيّة كيميائيّةً. د- مناعة خلطيّة وخلويّةً.

3. الخلايا التي تستهدف خلايا الجسم المصابة بالفير وسات وتقتلها هي:

أ- البالعة الكبيرة. ب- القاتلة الطّبيعيّة. ج- وحيدة النوى. د- المتعادلة (العدلات).

4. افترض أنَّك تعرّضت لجرح من الورق وأنت تدرس فإنّ الاستجابة التي ستحدث في آخر الأمر هي:

أ- تفرز الخلايا المتأذيّة الهستامين. ب- تدخل الجراثيم إلى الجرح.

ج- يتم تنشيط الخلايا التائية المساعدة. د- تبتلع الخلايا البالعة الكبيرة الجراثيم.

5. المادة التي تصنعها الخلايا عندما تهاجمها الفيروسات والتي تحمي الخلايا غير المصابة والمجاورة من الفيروس تُعرف ب: أ- البلاسما. ب- الإنترفيرون. ج- المتمّمة. د- الهيمو غلوبين.

ثالثاً: أُعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتى:

- زيادة ورود الدم إلى المنطقة الالتهابية.
- لا يقومُ طبيبُ الأسنانِ بعمليّاتِ قلع الأسنانِ في حالِ التهابِ اللَّثّةِ.

ابحثُ أكثر ما أهميّةُ ارتفاعِ درجةِ حرارةِ الجسمِ بشكلٍ طفيفٍ في الحالاتِ الالتهابيّةِ؟



المفاهيم الأساسية:

- الجهازُ المناعيُّ المتخصّصُ.
 - الاستجابة المناعية.
- معقدُ التّوافق النسيجيّ الأعظميّ.
 - مولدُ الضدِّ (المستضد).
 - الأجسامُ المضادّةُ (الأضداد).
 - الخلايا اللمفيّةُ.


سأتعلم:

- تسمية مكوناتِ الجهاز المناعي المتخصص.
- شرحُ مسار تطور الخلايا المناعيةِ المتخصصةِ.
- استنتاج وسائلِ الخلايا المناعيةِ المتخصصةِ
 في القضاءِ على الأجسام الغريبة.
- المقارنة بينَ الأجسام المضادة ومولدات الضدّ.
 - تلخيصَ آليةِ حدوثِ الاستجابةِ المناعيّةِ.

▼ ألاحظُ الشّكلَ الذي يوضِّحُ الأعضاءَ اللمفيّةِ التي تشكّلُ الجزءَ الأهمَّ في الجهازِ المناعيّ المتخصّصِ. وأجيب عن الأسئلة الآتية:


نشاط:

- ي ما دورُ نقيّ العظم في المناعةِ؟
- عاذا أسمّــي البنى الكرويّة أو البيضوية التي توجد على طول الأوعية اللمفيّة?



نشاط:

- ▼ من الشّكلِ المجاورِ الذي يمثلُ عقدةً لمفيّةً ألاحظُ عدد الأوعية اللمفيّة الواردة إلى العقدة مقارنة بعدد الأوعية الصّادرة عن العقدة، وأجيب عن الأسئلة الآتية:
 - ? ما أهميّةُ ذلك؟
 - استنتج وظيفة العقد اللمفيّة.



أضيف إلى معلوماتي


تنشأ الخلايا اللمفية من «خلايا جذعية لمفية» في نقي العظم وتتمايز إلى 3 أنواع: خلايا لمفية تائية (T cell) وخلايا لمفية بائية (B cell) (تسهم في المناعة المتخصصة) وخلايا قاتلة طبيعية (NK) (تسهم في المناعة غير المتخصصة).

الخلايا اللمفية Lymphocytes هي كريات بيضاء لا حبيبية، تنشأ من «خلية جذعية لمفاوية» في نقي العظم. تعمل على إنتاج الأجسام المضادة أو قتل الخريبة مباشرة.


نشاط:

- ▼ أدرسُ الشَّكلُ التالي، وأجيب عن الأسئلة الآتية:
 - ? ما أنواعُ الخلايا اللمفيّةِ المتخصّصةِ؟


؟ أحدِّدُ مسارَ تمايزها.



نشاط: أملاً الفراغاتِ في المخطّطِ الآتي مستعيناً بالشّكلِ السّابقِ وأستنتج وظائف أخرى للخلايا



- ▼ يوضّحُ الشّكلُ التالى موقعَ الغدّةِ التيموسيّةِ:
- الماول أن أتعرَّف دورَها في الجهاز المناعي.




للاطلاع

تزنُ الغدّةُ (التيموسيّة) عند الولادةِ 15 غراماً ويزدادُ حجمها ليبلغَ ضِعفيّ حجمَها الأصلي في سنِّ الثّانية عشرة وعندَ البلوغِ يتراجعُ حجمُها ودورُها بشكلٍ كبيرٍ إذ يتولّى الطّحالُ والعقدُ اللمفاويةُ إنتاجَ الخلايا اللمفيّةِ التائيّةِ، لذلكَ فإنَّ تأثيرَ استئصالِها ضئيلٌ عندَ البالغ.

الاستجابةُ المناعيّةُ المتخصّصةُ The IMMUNE RESPONSE

نشاط:

◄ ألاحظُ الشّكلَ الآتي وأتتبعُ مراحلَ الاستجابةِ المناعية وأوضَحُ دورَ كلِّ من:
 الخلايا البالعةُ الكبيرةُ والخلايا اللمفيّةُ التائيّة المساعدةُ والخلايا اللمفيّةُ البائيّةُ.



بالا	عتماد على الشَّكل السَّابق أملاُّ الفراغاتِ ا	آتيةً بما يناسبُها من مصط	الحات علمية مناسبة:
.1	تقومُ ببلعمةِ المستضدِّ وته	غُمه جزئيًّا وتظهرُ أجزاءً	ةً منه على سطحِها وتقدّمه للخلايا
	التائيّة المساعدةِ.		
.2	تتعرف الخلايا المستضدّ و	قومُ بإفرازِ	
.3	تنشَّطُ الخليَّةُ البائيَّةُ عن طريقِ	وبارتباطها مع المستضد	د.
.4	تنقسمُ الخلايا البائيةُ وتتمايزُ إلى خلايا	وخلايا	
5	تقه وُ الخلايا البلاز مية بانتاح	التي تهاجهٔ	ه تحعله أكثر عرضةً البالعات

معقدُ التّوافقُ النسيجي الأعظميّ (MHC) Major histocompatibility complex

? كيف يمكن للجهاز المناعيّ تمييز الموادّ الغريبة؟

بروتيناتُ نوعيّةُ توجدُ على أغشيةِ الخلايا تمكّنُ الجهازَ المناعيَ من تمييزِ الموادِّ الغريبةِ (المستضدّات) تتطابقُ بينَ التوائعِ الحقيقيّةِ وتتقاربُ بين أفرادِ العائلةِ الواحدةِ وتختلفُ بين الأفرادِ.

? أقارن بين مولّد الضّد والأجسام المضادة من حيث: الطّبيعة الكيميائيّة، مكان توضّعها، دور هما.

المستضدّ (مولدُ الضدّ) Antigen


مادة بروتينية أو متعددة سكريات توجد في الجراثيم والفيروسات والخلايا السرطانية. تكون قادرة على تحفيز استجابة مناعية متخصصية وتحث البائية المصورية (البلازمية) على إنتاج الأضداد.

الأضداد (الأجسامُ المضادّةُ) Antibodies

بروتينات متخصّصة (غلوبولينات مناعية) توجد على سطوح الخلايا البائية وفي الدم واللمفِ

تفرزُ ها الخلايا البائيةُ المصوريّةُ استجابةً لوجودِ مستضدّ تسهمُ في إيقافِ نشاطِ المستضدّ والقضاءِ عليهِ.

▼ ألاحظ الأشكال الآتية وأتعرّف شكل وبنية الضدّ:



▼ أستنتج من المخطّط طرائق القضاء على المستضدّ:

طرائق القضاء على المستضد


التعادل Neutralization

يرتبطُ الضدُّ بمستضدّ ويوقف نشاطه.



التلازن (الإلصاق) agglutination

يرتبط الجسم المضاد بأكثر من مستضد مشكلاً تجمعات.



الترسيب precipitation


يتحدُ الجسمُ المضادّ مع المستضدّاتُ المنحلةِ (مواد سامة) فتترسب.



تحفز البلعمة

هي إحدى الآليات التي يعملُ بها الجسمُ للقضاءِ على المستضد بهدف المحافظة على توازنِ واستتبابِ البيئةِ الداخليّةِ للجسمِ.

الاستجابة المناعية:



التحلّلُ


Lysis

ترتبطُ الأضدادُ بالمستضدِّ


الذى يتحلّل بمساعدة

البروتيناتِ المتممةِ.

تحفز تحلّل الخليّة



▼ يمثلُ المخطِّطُ الآتي آليّة الاستجابةِ المناعيةِ المكتسبةِ بنوعيها الخلطيّةِ والخلويّةِ:



▲ بالإعتماد على المخطّط المذكور أعلاه، أجيب عن الأسئلة الآتية:

- إ ما الخلايا اللمفيةُ المتخصصةُ في الاستجابةِ المناعيةِ الخلطيةِ؟
- ? ما الخلايا اللمفيّةُ المتخصّصةُ في الاستجابةِ المناعيّةِ الخلويّةِ؟

أضيف إلى معلوماتي

من الضروري إعطاء الأطفال الرضّع دورة كاملة من اللقاحات حتّى يحصلوا على المناعة اللازمة ضد المرض.

التّقويم النهائيّ

أولاً: أختارُ الإجابةَ الصّحيحةَ لكلِّ ممّا يأتي:

1. الخلايا التي تقومُ بإنتاج الأضدادِ هي:

أ- الخلابا البلاز مبّةُ

ج- الخلايا التائيّةُ المساعدةُ.

ب- الخلايا التائيةُ السّمّيةُ.
 د - الخلايا التائيةُ الكايحةُ.

د - الحلايا الثالية الكابحة.

2. يتمُّ إنتاجُ الخلايا اللمفيّة في:

أ- نقيِّ العظم. ب- الغدةِ الصعتريةِ. ج- لبِّ الكظر. د- الغدّةِ الصّنوبريّةِ.

3. الخلايا المسؤولة عن رفض الأعضاء المزروعة هي:

ب- الكرياتُ البيضُ الأساسيةُ.

ج- الخلايا التائيةُ السّمّيّةُ.

أ- الخلابا البلاز مبّةُ

د- الخلايا الجذعيّةُ

4. يوجدُ معقدُ التّوافقِ النسيجيّ الأعظمي على سطح:

أ- البروتيناتِ المتمّمةِ والأضدادِ.

ج- البالعاتِ الكبيرةِ فقط.

ب- الخلايا البائيةِ فقط.

د- جميع خلايا الجسم.

ثانياً: أُعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتى:


- 1. تستطيعُ الخلايا المناعيّةُ تعرّفَ الأجسامِ الغريبةِ.
 - 2. المناعةُ المكتسبةُ طويلةُ الأمدِ.
- 3. تُعدُّ الاستجابةُ المناعيّةُ التي تسهمُ فيها الخلايا اللمفيّةُ البائيّةُ مناعةً خلطيّةً.

ثالثاً: أقارنُ بينَ كلِّ ممّا يأتي:

أ- الجهازُ المناعيُّ غيرُ المتخصّصِ والجهازُ المناعيُّ المتخصّصُ من حيثُ: التمبيزُ بين المستضدّات - سرعةُ الاستجابة - الذاكرةُ - التأثّرُ بالوراثة.

ب- الخلايا اللمفيّةُ البائيةُ والخلايا اللمفيةُ التائيةُ من حيثُ: مكانُ تمايز ها وأنواعُها.


ج- الضدُّ والمستضدُّ من حيث: الطّبيعةُ الكيميائيّةُ - مكانُ وجودِه - دورُه.



رابعاً: في الشَّكلِ المجاورِ مجموعةً من المستضدات وضدٌ، أحدد:

- 1. رقم المستضدُّ الذي يرتبطُ بالضدِ، ولماذا؟
 - 2. ماذا تستنتجُ؟
 - 3. في أيِّ الحالاتِ:
- A-B-C تحدثُ استجابةُ مناعيةُ متخصّصةُ مع التّفسير؟

خامساً: أدرسُ التجاربَ الآتيةَ، ثمَّ أُفسرُ النّتائجَ في كلِّ منْها:



تجربة (1):

أستنتج:

خصائص المناعةِ المكتسبةِ:

.1

.2


تجربة (2):

أما نوع المناعة التي اكتسبَها الفأر C، خلطية أم خلوية ?

تجربة (3):

ما نوعُ المناعةِ التي اكتسبَها الفأرُ F، خلطيّةٌ أَمْ خلويّةٌ؟

سادساً: إذا علمتُ أنَّ دخولَ مستضدِّ إلى الجسمِ للمرّةِ الأولى يسببُ استجابةً مناعيّةً أوليّةً ودخول المستضدِّ نفسِه إلى الجسمِ مرّةً أخرى يسببُ استجابةً مناعيّةً ثانويّةً، أدرسُ الخطوطَ البيانيّة، ثمَّ أُجيبُ عن الأسئلة:



- 1. أُقارِنُ بينَ الاستجابةِ المناعيةِ الأوليّةِ والاستجابةِ المناعيةِ الثّانويّةِ للمستضدّ A من حيث:
 - سرعةُ الاستجابةُ
 - تركيزُ الأضدادِ في الدّم.
 - ما تفسير ذلك؟
 - 2. عندَ التعرُّضِ لمزيج من المستضدِّ A والمستضدِّ B.

تتكوّنُ استجابةً مناعيّةً أوّليّةٌ للمستضدّ B واستجابةٌ مناعيةٌ ثانويّةٌ للمستضدّ A، ما تفسيرُ ذلك؟

ابحثُ أكثرَ

ما دورُ الجهازِ المناعيِّ في عدم إمكانيّةِ نقلِ الدّمِ بينَ الزُّمرِ الدّمويّةِ غيرِ المتوافقةِ؟



المفاهيم الأساسيّة:

- فرطُ الحساسيّةِ.
- الاختلالُ المناعيُّ الذاتيُّ.
 - الخلايا الجذعية.

سأتعلّم:


- وصف بعضِ الأمراضِ المناعيّةِ ومسبباتِها.
- التنبؤ بأهم الصعوبات في نقل الأنسجة وزراعتها.
 - ا أهمية الخلايا الجذعية.

؟ تعدُّ الأمراضُ التي تصيبُ الجهازَ المناعيّ من أكثر المشاكلِ التي تهدُّدُ حياةَ الإنسان، ما تفسيرُ ذلك؟

1. فرطُ الحساسيَّة (الأليرجيةُ) Hypersensitivity:

نشاط:

▼ بالاعتماد على الشَّكل الآتي، أتعرَّفُ مراحلَ فرط الحساسيّة، وأحاولُ الاجابة عن الأسئلة:



- ? لماذا توصف مضادّاتُ الهيستامين علاجاً لتخفيفِ أعراضِ فرطِ الحساسيّةِ؟
 - الرّبو؟ ما أسبابُ مرضِ الرّبو؟
- ؟ لماذا تظهرُ أعراضُ الاحمرارِ والحكّةِ على الجلدِ لدى بعضِ الأشخاصِ عندَ تناولِ أنواعٍ معينةٍ من الأغذية؟
 - أناقشُ زملائي وأحاولُ أن أتعرّفَ بعض مولّداتِ الحساسيّةِ وأعراضِ فرطِ الحساسيّةِ التي تسبّبُها.




-أستنتج

فرطُ الحساسيةِ:

استجابة مناعيّة شديدة نتيجة خللٍ مناعيّ لمواجهة مستضدّ (مولّدِ ضدًّ) غيرِ جرثوميّ وغير سامّ تترافقُ بردودِ فعلِ التهابيّةِ

2. الاختلالُ المناعيُّ الذاتيُّ Autoimmune disease:

يخطئ الجهازُ المناعيُّ في تمييزِ بعضِ خلايا الجسمِ ذاتِهِ فيقومُ بردِّ فعلٍ مناعيٍّ مضادِّ لها ممّا يؤدي اللي تخريبها.






- ◄ ألاحظُ الشّكلَ المجاور:
- ي ما النُّسئجُ التي يهاجمُها الجهازُ المناعيُّ؟
 - ؟ وما تأثيرُ ذلكَ على المفاصلِ والحركةِ؟



- التصلَّبُ اللويحيُّ المتعدِّدُ Multiple sclerosis
- ◄ يمثّل الشكل المجاور ليفاً عصبياً متأذياً مقارنةً بليفٍ
 عصبي سليم.
- إ ما الجزءُ الذي يهاجمهُ الجهازُ المناعيُّ في هذه الحالة؟
 - ? وماذا ينتج عن ذلك؟



الذَّنبةُ الحُماميّةُ Lupus Erythematosus

يهاجمُ الجهازُ المناعيُّ الجلدَ والأغشيةَ في مناطقَ عدّةٍ من الجسمِ.

أستنتج من الشكلِ المجاورِ أعراضَ المرضِ.

مرض سكّري الأطفال

تهاجم الأجسام المضادّة التي يفرز ها الجهاز المناعيّ الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

مرض الذئبة الحمامية

(AIDS) (مرضُ متلازمةِ عوزِ المناعةِ المكتسبةِ (الايحز) .3 Acquired Immune Deficiency Syndrome

يهاجمُ الفيروسُ (HIV) الخلايا التائيّةِ المساعدةِ ويحلُّها، ما تأثيرُ ذلكَ على الاستجابةِ المناعيّةِ؟ كما يمكنُ أن يهاجمَ الفيروسُ الخلايا البالعة التي تحملُهُ إلى أماكنَ مختلفةٍ من الجسمِ.

? أحاورُ زملائي في طرق انتقالِ العدوى بالفيروس، والوقاية منها.



- إنَّ تناولَ الأغذيةِ الغنيّةِ بالفيتاميناتِ (A B₆ E C) والأملاحِ المعدنيّةِ (الزنك المغنيزيوم)
 يسهمُ في تنشيطِ وتحفيز الخلايا المناعيّةِ على الانقسام، كما أنَّ ممارسةَ الرياضةِ تفيدُ في تنشيطِ الدّورةِ الدّمويّةِ.
- النومُ لفتراتٍ كافيةٍ والابتعادُ عن الانفعالاتِ يجعلُ الجهاز العصبيّ قادراً على تنظيمِ عملِ الجهازِ المناعيّ بكفاءةٍ عاليةٍ.




نقلُ وزراعةُ النّسجِ والأعضاءِ

عندما يُتلفُ عضوٌ ما في الجسم ويصبحُ غير قادرٍ على القيام بوظائفِهِ الحيويّةِ يقرّرُ الأطباءُ إجراءَ زرع عضو بديلٍ يُؤخذُ من شخص مُتبرّع.

- ? ما المشكلةُ الرئيسةُ التي تواجهُ الأطباءَ في عمليّاتِ نقلِ وزرعِ الأعضاءِ؟
 - ي ما الخلايا المناعيةُ التي تسبّبُ هذه المشكلة؟

علماً أنَّه أمكنَ التّغلبُ على الرفضِ المناعيِّ للأعضاءِ المزروعةِ حتى في حالِ عدم توافقِ أنسجةِ العضوِ مع أنسجةِ المريضِ عن طريقِ تطويرِ أدويةٍ تثبطُ استجابةَ الجهازِ المناعيّ لعمليةِ رفضِ العضوِ الغريبِ وتُسمّى هذه الطريقةُ (الكبتَ المناعيّ).



توصَّل الباحثون في المجالِ الطَّبِيِّ الى تقائدةِ حيوية تتمثّلُ باستخدام الخلايا الجذعية في علاج حالاتٍ مرضيةٍ مستعصيةً عدةٍ.

نشاط:

من معرفتي السَّابقةِ بخصائصَ الخلايا الجذعيّةِ أناقشُ زملائي للإجابةِ عن الأسئلةِ الآتيةِ:

- ? ما أماكنُ توضّع الخلايا الجذعيّةِ في جسم الإنسان؟ و ما دورُها؟
- ? ما سبب قدرة الخلايا الجذعية على تكوين خلايا ونُسج مختلفة عدة؟
 - ا هل يمكنُ استنساخُ أعضاءٍ حيويّةٍ وظيفيّةٍ بدءاً من خلايا جذعيّةٍ؟
- الأعضاءِ المستنسخةِ من خلايا جذعيّةٍ مأخوذةٍ من الشّخص نفسه؟



هي خلايا ذاتُ صفاتٍ جنينيةٍ تستطيعُ إعطاءَ سلالاتٍ خلويّةٍ مختلفةٍ.



إثراء

إن الخلايا الجذعية المأخوذة من المضغة الجنينية تستطيع التعبير عن المعلومات الوراثية المدّخرة في نمطِها الوراثي كاملة ، بينما تنخفض القدرة على هذا التعبير الوراثي عندما تؤخذ الخلايا الجذعية من الحبل السري للجنين أو من نقي العظم أو الطبقة المولدة للبشرة في الجلد.

تقانات حيوية متطورة

يحاولُ الباحثون إنتاجَ أعضاءٍ وأنسجةٍ لزراعتِها اعتباراً من الخلايا الجذعيةِ إذ يتمُ تنشيطُ المورثاتِ الأخرى. المورثاتِ المعضوِ المراد زراعتُهُ في حين يتمُ تثبيطُ عملِ المورثاتِ الأخرى.

مستقبل الخلايا الجذعية في الجمهورية العربية المتورية

تم إنشاء أول بنك للخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري في المشفى الوطني الجامعي في دمشق في منتصف العام 2011. يقدّم البنك خدمة استخلاص الخلايا الجذعية وحفظها لمدة تصل حتى 15 عاماً على الأقل إذ يتيخ البنك إمكانية الإيداع الخاص لحساب العائلة المودعة أو التبرع به لصالح البنك لحين استخدامها عند الحاجة.

كما تتمُّ زراعةُ الخلايا الجذعيّةِ المستخلصةِ من نقيّ العظمِ في مشافي القطرِ.





التقويم النهائي

أولاً: ما المقصودُ بكلِّ من المصطلحات العلمية الآتية:

فرطِ الحساسيّة. الاختلال المناعيّ الذاتيّ. الخلايا الجذعيّة.

ثانياً: أختارُ الإجابةَ الصّحيحة:

1. يُصنَنَّفُ مرضُ الرّبو:

أ- اختلالٌ مناعيّ ذاتيّ. ب- عوزٌ مناعيّ تسبّبُهُ فيروساتٌ. ج- فرطُ حساسيّة. د- التهابٌ تسبّبُهُ جراثيمُ.

2. يهاجمُ فيروسُ الإيدز:

أ- البالعاتُ والخلايا T السّميّةُ. ب- الخلايا T السّميّةُ والخلايا T المساعدةُ. ج- البالعاتُ والخلايا T المساعدةُ. د- الخلايا اللمفيةُ T و B.

3. الخلايا الجذعيّةُ القادرةُ على إعطاءِ أكبرَ عددٍ ممكنٍ من أنواع الخلايا المتمايزةِ هي المأخوذةُ من:

أ- الحبلِ السّري. ب- نقي العظم. ج- المضغةِ الجنينيّةِ. د- الطبقةِ المولّدةِ لبشرةِ الجلدِ.

4. مرض التصلّب اللويحي المتعدّد هو من الاختلالات المناعيّة الذاتيّة، ما الجهاز الأكثر تضرّراً منه في جسم الإنسان:

أ- الهضميّ. ب- التنفّسيّ. ج- العصبيّ. د- الدورانيّ.

ثالثاً: أعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتى:

- 1. تتشوّه المفاصل لدى المصابِ بالتهابِ المفاصلِ الرثويّ.
 - 2. تُعَطَّلُ آلياتُ الاستجابةِ المناعيّةِ لدى المصابِ بالإيدز.
- 3. يسبب فرط الحساسية في بعض الحالات انخفاضاً مفاجئاً في ضغط الدَّم قد يُودّي إلى الوفاة .

ابحثُ أكثرَ:

إمكانية استخدام الخلايا الجذعيّة في علاج أمراضٍ مستعصيةٍ.

التنفس Respiration



- الدّرسُ الأوّلُ: التّنفّس لدى الأحياء.
- الدرسُ الثاني: التّنفّس لدى الإنسان.
- الدِّرسُ التَّالثُ: التَّنفِّس الخلوي (الهوائيّ).
- الدَّرسُ الرَّابِعُ: التَّنفُس الخلويّ اللاهوائيّ (التخمّر).
 - الدِّرسُ الخامسُ: صحّة جهاز التّنفّس.



المفاهيم الأساسيّة:

- التّنفّسُ.
- التّنفّسُ الخارجيّ.
- التّنفّسُ الدّاخليّ.
 - الاحترأق.
- المسامُّ والعديسات.
 - الانتشارُ.

سأتعلّم:


- مفهوم التَّنفس.
- طرق التّنفس لدى بعض الأحياء
- المقارنة بين التنفس والاحتراق.

التّنفّسُ Respiration



◄ ألاحظُ الصّورة الآتية:

وأتساءل مامصدر الطاقة التي يحصل عليها هذان الطفلان للقيام بالتمارين الرياضية?



في عام 1667م قامَ العالمُ روبرت هوك بقصً أضلاع كلب وحجابه الحاجز وهي عمليّةٌ تؤدّي عادةً إلى الموتِ لكنّه استطاع المحافظة على حياة الكلبِ مادامَ ينفخُ الهواء في رئتيه وقد برهن بذلك على أنَّ الهواء الذي يدخل الرئتين ضروريّ للحياة وهو ما أطلق عليه اسم التّنفّسِ.

- لكن الستؤالَ هل التنفسُ هو مجرد دخولِ الهواعِ إلى الرئتين؟
- ▶ أنعم النّظر في الشّكل المجاور وأستنتج مفهومَ
 التّنفس.


تُسمّى عمليّةُ التبادلِ الغازيّ بين الكائن الحيّ وبيئته:

بالتّنفّسِ الخارجيّ (External respiration) وتُسمّى عمليّةُ تحريرِ الطاقة من الموادّ العضويّة داخل الخليّة الحيّة: التّنفّسِ الداخليّ (الخلويّ) (Internal cellular respiration).

أبيّنُ العلاقةَ الوثيقةَ بينهما.

أتعلَّمُ:

يمكنُ النّظرُ إلى عملية التّنفس على أنّها احتراق، لكنّ لماذا لاينتجُ التّنفسُ حرارةً عاليةً كالاحتراق؟ ▼ ألاحظُ الشكلَ الآتي: وأستنتج الفرقَ بين التّنفسِ والاحتراق.



▼ ثم أكملُ الجدولُ الآتى:

الاحتراق	التنفسُ
تَتَفَكَّكُدفعةً واحدة وبشكل	تتفكُّكُ الرُّوابطُ تدريجيًّا وبشكلٍ منظّم
الطَّاقة الناتجة مبدّدة معظمها حراريّة و	الطاقةُ الناتجةُ كيميائيّةٌ تختزن في روابطِ مركبات عضويّة جديدة مثال
يحدث دون تفاعلات وسطيّة	يمر بـ تشرف عليها الأنظيمات

أتأمل: لأجسام الأحياء القدرة على هضم أنواع مختلفة من المواد الغذائية للحصول على الطاقة في حين أن السليارة لا تستخدم سوى مصدر واحد للطاقة.

أضيف إلى معلوماتي

إن الطَّاقة المنطلقة من أكسدة الغذاء لا تصلحُ للاستعمال مباشرة بعد تحرّرها بل تختزن في مركّبات عضويّة أهمّها مركّب من النكليوتيدات يسمّى ATP الأدينوزين ثلاثيُّ الفوسفات.


حيث تختزنُ الروابطُ بين مجموعاتِ الفوسفاتِ اللاعضويّة Pi طاقة كيميائيّة بكمّيّات كبيرة تستخدم في عمليات:


- 1. النقل النشط (الفعال) في الخلايا العصبيّة والعضليّة وخلايا الكلى وخلايا الزغاباتِ المعويّةِ.
 - 2. انقسام الخليّة (تكوين خيوط المغزل، تضاعف الـ DNA...).
- 3. حركة الخليّة (حركة الأهداب المبطّنة لجهازِ التّنفّس حركةُ النّطافِ تقلّص الخلايا العضليّة). وفق التفاعلات الآتية:


طاقة + ADP + Pi + طاقة + ADP AMP + Pi طاقة + ADP


🕦 التّنفّسُ الخارجيّ (External respiration) (تبادل الغازات)

- ? هل تمتلكُ جميعُ الكائناتِ الحيّةِ الطّريقةَ ذاتها في التّنفّس الخارجيّ؟
 - ? لماذا تُعدّ هذه العمليّةُ مستهلكةً للطّاقةِ في رأيك؟
- ◄ ألاحظُ الصَّورَ الآتية لأحياء متنوعة بعضُها لا يمتلكُ أجهزةً تنفسيةً وبعضُها يمتلكُ أجهزةً تنفسيةً
 متخصصةً وأستنتجُ طرائق تنفسها، ثمّ أنفذُ النشاطَ الآتى:















نشاط:

من الصور السّابقة أملاً الجدول بوضع كلمة (صح) في الحقل المناسب.

یوجد جهاز تنفّس متخصّص	ليس للدّم دور في نقل الغازات	للدّم دور في نقل الغازات	نمط التّنفّس				الكائن الحي	
			جلديّ	رئويّ	قصبيّ	غلصميّ	انتشار	
								الباراميسيوم
								هيدريّة الماء العذب
							صح	دودة الأرض
	صح							الجراد
صح								الستمكة
								الضنفدع
						صح		الشرغوف

- ? هل تتنفّس النباتات كالحيوانات؟ وهل تمتلك أجهزة متخصّصة للتّنفّس؟
 - ? كيف تتنفّسُ النباتاتُ المائيةُ، ونباتاتُ اليابسة؟
- ▼ ألاحظ الصورتين الآتيتين وأستنتج: كيف تتبادل النباتات غاز الأكسجين وغاز ثنائي أكسيد الكربون
 في الماء واليابسة?







النباتاتُ المائيّة: معظم خلاياها على اتصالٍ بالوسطِ المائيّ فتتمُ المبادلاتُ الغازيةُ للغازاتِ المنحلّة في الماء مباشرة بوساطة مبدأ



أتعلَّمُ:

لاتمتلكُ النباتاتُ والطّحالبُ جهازاً متخصصاً للتّنفّس وهي تحتاجُ إلى الأكسجين لأكسدةِ الموادِّ الغذائيةِ وإنتاجِ الطاقةِ إذ تتمُّ عمليّة التّنفّس ليلاً ونهاراً.

ينصح بعدم ترك نباتات الزينة في غرف النّوم ليلاً. ما أهميّة ذلك؟

نشاط:

▼ نشاطً عمليٌّ في المخبر لإثبات أن عملية التنفس تنتج طاقة حرارية:

أقوم بالتّعاون مع زملائي بتنفيذِ التّجربتين الآتيتين:

تجربة 1:

أقسم كمّية من بذور البازلاء المنتشة إلى قسمين متساويين:

- 1. أقوم بغلى إحدى الكميتين.
- 2. أركّبُ الجهاز المبين في الشّكل.
- 3. أحكم إغلاق الوعاءين بسدادتين.
- 4. أدوِّنُ قراءة المقياسين عند بدء التجربة.
 - 5. لا أنسى ترقيم الوعاءين (1، 2).

وبعد 20 دقيقة أدوّن النتائج وفق الجدول الآتى:

درجة الحرارة بعد ٢٠ دقيقة	درجةُ الحرارة في بداية التّجربة	رقم ميزان الحرارة
•••••	•••••	1
•••••	•••••	2

حافظ للحرارة

أحلِّلِ وأفسر: 1 في أيِّ من التجربتين ارتفعت درجة الحرارة ؟ ولماذا؟

- 2 ماالهدف من غلى البذور، في رأيك؟
- 3 لماذا غلّفنا الوعاءين بغطاء حافظ للحرارة؟

تجربة 2:

◄ يمثل الشكل المجاور أزهار نباتِ اللوفِ Arum (القلقاس):

- 1. أضع ميزان حرارة داخل زهرة اللوف كما هو موضّح.
 - 2. أدوّنُ قراءة الميزان في بداية التّجربةِ
 - 3. ألاحظ ارتفاع درجة حرارة الميزان، ماتفسير ذلك؟



ميزان حرارة

التّقويم النّهائيّ

أولاً: أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ لكلِّ ممّا يأتى:

1. تتميزُ الأحياءُ التي تتبادلُ الغازاتِ مع الوسطِ الخارجيّ مباشرةً بالانتشار ب:

أ- زيادةِ مساحةِ سطحِها الخارجيّ مقارنةً بكتلتها.

ج- جميعها من كثيراتِ الخلايا. د- بعضها يمتلك جهازاً تنفّسيّاً متخصّصاً.

2. يكون التنفس عند الضفدع البالغ:

أ- رئويّاً. ب- رئويّاً وغلصميّاً.

ج- رئويًا وجلديًا. د- جلديًا ورئويًا وغلصميًا.

ب- زيادة كتاتها مقارنةً بسطحها الخارجيّ.

ثانياً: أقارنُ بين كلّ من:

- التَنفس الخلوي والاحتراق من حيث:
 نوع الطّاقة الناتجة تفكّك الرّوابط.
- 2. التَّنفَّسُ عند الحشراتِ ودودةِ الأرضِ من حيث: وجود جهاز تنفس متخصّص دور الدّم في نقل الأكسجين.

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكلِّ ممّايأتي:

- 1. تتمُّ المبادلاتُ التّنفسيّةُ في النباتات المائيّة بسهولة مع أنّها لاتمتلكُ جهازاً تنفسيّاً متخصّصاً.
 - 2. تنتجُ بذورُ البازلاء المنتشة حرارة أما البذور المسلوقة فلا تنتج حرارة.
 - 3. يكونُ الجهازُ التّنفسيُّ عند الحشراتِ على درجةِ كبيرة من الكفاءةِ.
 - 4. تعملُ النكليوتيداتُ كجزيئاتِ لحفظ الطَّاقة في الخليةِ

أبحث أكثر:

تشيرُ الدّراسات إلى أنَّ نباتات الزّينة تخلصُ من تلوّث الهواء في المنازل والمكاتب وأماكن العملِ ومنها: نباتُ السّرخسِ الذي يمتصُّ حوالي 1863 ميكروغرام/ ساعة من الفورم ألدهيد المسبّب لسرطان الحنجرةِ أبحثُ في:


- 1. تأثير النباتات الآتية في الحدِّ من تلوَّث الهواءِ.
- 2. دور نبات اللوف في علاج الأمراض السرطانيّةِ.













المفاهيم الأساسيّة:


- السعة الحياتية.
- عشاء الجنب.
- الحجابُ الحاجز.
- الحويصلاتُ والأسناخُ الرئويّة.


سأتعلّم:

- مراحل عملياتِ التّنفّس عند الإنسان.
 - مفهوم السعة الرئوية الحياتية.
- دورَ الدّم في نقلِ الغازاتِ التّنفسيّةِ.









- 1. أختارُ التّرتيبَ الصّحيحَ للمراحل السّابقة وفق تسلسل حدوثها في الجسم ممّا يأتي:

- $D \cdot B \cdot C \cdot A \rightarrow D \cdot C \cdot B \cdot A \rightarrow A \cdot B \cdot D \cdot C \rightarrow D \cdot C \cdot A \cdot B \rightarrow D \cdot C \cdot A \cdot$
 - 2. ضمن أيِّ من العمليّات السّابقة تصِّنُف أوّل صرخة طفل وليد إلى حياة جديدة؟

أستنتج أن هذه الصور تمثّل: مراحل عمليات التنفس كالآتى:


- التّنفّسُ الخارجيّ: (التهويةُ الرئويةُ المبادلاتُ الغازيةُ بين الرئتين والدم نقلَ الغازاتِ في الدم).
 - 2 التّنفّسُ الداخليّ (الخلويّ).

التّنفّسُ الخارجيّ (External respiration (breathing

▼ أنظرُ الشّكلَ الآتي:


وأتذكرُ أقسامَ جهاز التّنفّس عند الإنسان وأرتبها وفقاً للأرقام المحدّدة على الشكل.

? ماهى الأحياءُ التي تشبه الإنسانَ في مكوّناتِ جهازِ ها التّنفّسيّ؟



التّهويةُ الرئويّة Ventilation:

▼ أنعمُ النّظرَ في الشكل الآتي الذي يمثّل عمليتي الشّهيق والزّفير وأجيبُ عن الأسئلةِ المرافقةِ:




استرخاء عضلة الحجاب الحاجز يودّي إلى توسّع جوف الصدر.

والزّفير من حيث: حركة الهواء - حركة الحجاب الحاجز - حجم الرئتين - وضع أضلاع القفص الصدري.

أقارن بين عمليتي الشهيق

أتذكر أنّ: غشاء الجنب (Pleura) غشاء مضاعف من وريقتين بينهما سائلُ الجنبِ وهذا الغشاء يلتصقُ بالسّطح الخارجيّ للرّئتين وبالجدار الداخليّ للقفصِ الصدريّ.

? مادورُه في التهوية الرّئويّة؟



- السَعةُ الرّنويةُ الكليةُ: الحجم الأعظمى للرئتين بأكبر جهد تنفسي.
- حجمُ الهواعِ الجاري: حجم الهواء الذي يدخل الرّئتين ويخرج منهما في شهيق وزفير عاديّين.
 - حجمُ الشّبهيقِ القسريّ: أقصى كمّية من الهواء يمكن استنشاقها زيادة عن الشّبهيق العاديّ.
 - حجمُ الزّفيرِ القسريّ: حجم الهواء الذي يمكن إخراجه زيادة عن الزفيرالعاديّ.
 - حجمُ الهواعِ المتبقّي: حجمُ الهواعِ الذي يبقى في الرّئتين بعد زفيرِ قسريّ.
- ▼ يُبدي الخط البيائي السابق التغيرات في حجم الرّئة تحت ظروف مختلفة من التنفس. من مشاهدة المخطط أربط بين الأرقام الآتية في القائمة B وحجم الهواء الموافق في الرئتين في القائمة A.

В	A
500 ml	1- السّعة الرّئويّة الكلية T.L.C
3000 ml	2- السّعة الحيويّة (الحياتيّة) V.C
1200 ml	3- حجم الشهيق المدخر (القسريّ) I.R.V
1100 ml	4- حجم الهواء الجاريT.V
5800 ml	5- حجم الزّفير المدّخر (القسريّ) E.R.V
4600 ml	6- حجم الهواء المتبقّي (الثماليّ) R.V

أستنتج أن: السَّعةُ الحياتيّةُ = حجمُ الشَّهيقِ المدخَّرِ + +

أضيف إلى معلوماتي

تتمُّ عمليّةُ الشَّهيق والزَّفير بمعدَّل (18-12) مرّةً في الدَقيقة ويعرفُ هذا المعدَّل بسرعة التَّنفَس.

- المراكزُ العصبيّةُ التي تنظّمُ الحركات التَنفسيةِ؟
 - ◄ ألاحظُ الشَّكل المجاور وأستنتج:
- 1. يتمُّ تنظيم الحركات التنفسيّة لا إراديًا عن طريق المركز التنفسيّ والذي يتكوّن من عصبونات تقع في المادّة الرماديّة للبصلة السيسائيّة والحدبة الحلقيّة.
- 2. كما يمكن أن نتحكم إرادياً بمعدّل الحركات التنفسيّة وعمقها عن طريق قشرة المخ.

الحيز الميت Deadspace: الهواءُ الذي يبقى في الممرّات التنفسيّةِ كالأنف والبلعوم والرُّغامى وهو غيرُ مفيدٍ في التبادلِ الغازيّ.




ب - بين الدم والأنسجة

2. تبادلُ الغازات النّنفسية: أ- بينَ الرّئتين والدّم


▼ أدقِّقُ أنا وزملائي في المخطّط ثم أجيبُ عن الأسئلة الآتية:





- 1. ما الذي يؤِّمنُ السَّطحَ الواسع للتبادل الغازيِّ في الرئتين؟
- 2. يتمُّ تبادل الغازاتِ بين الرئتين والدّم اعتماداً على مبدأِ ويتأثّرُ ذلك بالفرقِ. بين الضّغطِ الجزيئيّ لغازي و الأسناخِ الرّئويّةِ والشّعيراتِ الدمويّة.
 - 3. ماذا ينتجُ عندما يزداد تركيز غاز CO₃ في داخلِ الأسناخ الرّئويّة؟


▼ أدقِّقُ في المخطِّط الآتي وأستنتج: دور الدّم في نقلِ الغازاتِ التّنفسيّةِ (Gas transport by blood)



ثمّ أجيبُ عمّا يأتي:

- 1. يكونُ الضّغطُ الجزيئيّ لغاز O_2 في الأسناخ الرّئويّة وفي الشّعيرات الدّمويّةِ المحيطة بها O_2
- $oldsymbol{2}$. يكونُ الضّغطُ الجزيئي لغازِ $oldsymbol{\mathrm{CO}}_2$ في الأنسجة وفي الشّعير ات الدّمويّةِ المحيطةِ بها
 - 3. أقارنُ بين قيمةِ الضّغطِ الجزيئيّ لغاز الأكسجين في كلِّ من هواء الشّهيق والزّفير.
 - lacktriangle ألاحظ المخطّط الآتي وأستنتج آلية انتقال غاز lacktriangle في الدم:

يرتبط 98 % من غاز O_2 مع الهيموغلوبين وينحل 2 % من غاز O_2 في ماء المصورة.



اين يسير التفاعل بالاتجاه 1 ؟ وأين يسير بالاتجاه 2؟ ولماذا؟ $+ b + O_2$ اين يسير بالاتجاه 2 ولماذا؟

أضيف إلى معلوماتى

عند ارتفاع درجة الحرارة: تنخفض الألفة بين الأكسجين والهيمو غلوبين فيتخلّى الهيمو غلوبين عن كمّيّات كبيرة من O_2 إلى الأنسجة التي تحتاجه، ممّا يدفع الجسم لزيادة معدّل التّهوية الرّئويّة وزيادة معدل ضربات القلب.

أمّا في درجات الحرارة المنخفضة جدّاً: تزداد الألفة بين الهيمو غلوبين و O_2 فلا يتخلّى الدّم عن أية كمّية من O_3 ، ممّا يفسر حالة الاختناق وعدم القدرة على الحياة في مثل هذه الحالة.

▼ أنظر المخطّط الآتي وأستنج آلية اتنقال غاز ثنائي أكسيد الكربون في الدّم، ثمّ أكمل الجدول المرافق:

النسبة المئوية	خاز CO2
•••••	ينحل في ماء المصورة
•••••	يتحد مع Hb
•••••	يتحد مع ماء الكرية

از CO ₂ في الدم	آلية انتقال غ
CO ₂ يدخل غشاء الكرية الحمراء % تدخل	7 % ينحل في ماء المصورة 93 %
الحمراء Hb پتحد مع Hb	الكرية % 70 % يتحد مع ماء
مرکب مشکلاً Hb-CO ₂ مرکب مشکلاً کاربامین هیموغلوبین RBC	الكرية مشكلاً H ₂ CO ₃ الكريون حمض الكريون يتايّن H ₂ CO ₃ إلى
تبقى داخل الكرية الحمراء	HCO ₃ 9 H ⁺
PLASMA مصورة الدم	تخرج أيونات HCO ₃ بسرعة إلى المصورة وتزداد أيونات +H في داخل الكرية ما يستدعي دخول أيونات
مصوره الدم	Cl لتأمين التوازن اللازم



- غشاء الكرية الحمراء غير نفوذ للأيونات الموجبة ونفوذ للأيونات السالبة.
- أيونات البيكربونات -HCO التي خرجت تعدلها أيونات +Na الموجودة بكثرة في المصورة.
- عند الصعود إلى المرتفعات العالية ينخفض الضغط الجويّ وتنقص كمّية O₂ فيختلّ التوازن في التّبادل الغازيّ لصالح زيادة تركيز CO₂، فيرد الفرد على ذلك بزيادة معدّلات التهوية ويمدّ الطّحال الدم بمخزونه من الكريات الحمر، كما يزداد إنتاج وإفراز حاثة الإريثروبيوتين EPO وبزيادة التعرّض للضّغط المنخفض تتدخّل الكلى فيزداد طرحها للبيكربونات فينخفض تركيز CO₂ في الدّم. من أين تفرز حاثة EPO؟
- بما أنّ الغازات تكون منحلّة في ماء الدّم $(O_2 CO_2 N_2)$ فإنّ انخفاض ضغط الهواء المفاجىء يسبّب خطراً على حياة الإنسان كالصّعود السّريع إلى الارتفاعات الشّاهقة بالطيران أوالصّعود فجأةً من أعماق البحار فتندفع الغازات المنحلّة على شكل فقاعات تسدّ الشّعيرات الدّمويّة مكوّنة صمّامات خطيرة.

التّقويم النّهائيّ

أولاً: أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ لكلِّ ممّا يأتى:

1. يتمُّ تبادل الغازات بينَ الرئتين والدّم اعتماداً على مبدأ:

أ- النقل الفعّال. ب- الحلول. ج- الانتشار. د- ب + ج.

2. ينتقلُ معظمُ الأكسجين في الدّم:

أ- منحلًا في ماء المصورة. ب- متّحداً بالهيمو غلوبين. ج- منحلًا في ماء الكريات الحمر. د- أ + ج.

3. تبلغُ قيمةُ السّعةِ الحيويّةِ (الحياتية) عند الإنسان:

أ- 1200 ml عن - 1200

ثانياً: أعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتي:

- 1. يشكّلُ الصّعودُ المفاجئ بالطير إن أو من أعماق البحار خطراً على حياة الإنسان.
- 2. تكونُ نسبة خضابِ الدّم عند سكان المناطق الجبليّة المرتفعة أكبر من نسبته في سكان المناطق الساحليّة
 - 3. اختناقُ الإنسان وعدم قدرته على الحياة في درجات الحرارة المنخفضة جدّاً.
 - 4. دخولُ شواردِ (أيونات) الكلور إلى داخل الكرية الحمراء بعد تأين حمض الكربون داخلها.

ثالثاً: أحضر الجهاز الآتي من المخبر والذي يمثّل مقياس السّعة الرئويّة التّنفسيّة عند الإنسان وبالتعاون مع زملائي أنفّذ الآتي:

- 1 أقرأ التّدريج الموجود على الجهاز محدّداً: أ- الحجمَ الأعظمي ب- الحجم الأصغري
 - 2 أضع الماصّة في المكان المناسب.
 - انفخُ بأقصى سعة أستطيعها.
 - 4 أحسب الحجم الذي أتمكّن من تحقيقِه.
 - أقارن بين السّعةِ التّنفسيّةِ عند زملائي وفق الجدول الآتي:



البحث في أسباب ارتفاع أو انخفاض السّعة التّنفسيّة عند أفراد العينة	الحجم	الاسم
••••••	***************************************	الطالب 1

أبحث في تكون حياة الإنسان مستحيلة على ارتفاع 13 كم إلا بشروط خاصة.



المفاهيم الأساسيّة:

- التّنفّسُ الهوائي.
- المسارُ الكربوني.
- سلسلة نقل الإلكترون والحلولية
 (الأسموزية) الكيميائية.
 - السيتوكرومات والأبيكينونات.

سأتعلّم:

- مفهومُ التّنفس الخلوي.
- ▼ تتبع خطوات مسارِ الكربون والفسفرةِ
 التأكسدية.
 - مفهومُ الاستقلابِ الأساسيّ.

أتساءًل: هل جميعُ حوادثِ التّنفَسِ تحتاجُ إلى الأكسجين؟ هل هناك أحياءٌ تستطيعُ العيشَ من دون الأكسجين؟

أقرأ: اكتشف جوزيف بريستلي الأكسجين إلا أن العالم لافوازيه هو الذي بيَّنَ أهمَيْتَهُ في التَّنفُس واعتبرَ أنَ تنفُس الأحياء كاحتراق الشَمعة (أكسدة) مادامت العمليّتان تتضمّنان الاحداد بالأوكسجين هل توافقه الرأيّ؟



التَّنْفَسُ الخلويُ: مجموعُ التَّفاعلاتِ الكيميائيَّةِ الحيويَّةِ (الأكسدة) التي تتمُّ داخلَ الخليَّةِ وفق مراحل منتظمةٍ تشرفُ عليها الأنظيماتُ وينتج عنها طاقةٌ غيرُ مبدّدةٍ يستخدمُها الكائنُ الحيُّ في جميع وظائفه الحيويّة.


للتَّنفُّسِ الخلويّ (Cellular respiration) نوعان:

- 1. التّنفّسُ الهوائيّ (Aerobic respiration) يحتاجُ إلى غاز
- 2. التّنفّسُ اللاهوائيّ (Anaerobic respiration) (التخمّر) لايحتاجُ إلى غاز

التّنفّسُ الخلويّ الهوائيّ Aerobic cellular respiration


- ? ما الوقودُ التَّنفُّسئُ؟ كيفَ تتمُّ عمليةُ الأكسدةِ؟
- ؟ ما البنى الخلويةُ التي تحدثُ فيها؟ ما المركّباتُ التي تشاركُ فيها؟ ماكمّيّةُ الطّاقةِ الناتجةِ؟












أستنتج

الخون مجموع حوادث التنفس الخلوي الخلوي المركبات المحدية على المواني المواني المواني المركبات المركبات المركبات المعادلة الآتية:

 $C_6H_{12}O6 + 6O_2 + 38ADP + 38Pi$

 \rightarrow 6CO₂+6H₂O + 38ATP

▼ أنظرُ المخطّطَ الآتي وأستنتجُ مراحلَ التّنفسِ الخلويَ الهوائي:



أتعلم: أنَّ المعادلةَ السابقةَ إجماليةٌ تتضمَنُ سلسلةَ تفاعلاتٍ تشرفُ عليها وسائط عديدة ويمكنُ تقسيمُها إلى أربع مراحل.

تتضمّنُ عمليّةُ التّنفّسِ الخلوي الهوائي للغلوكوز:

- 1. التحلّلُ السّكّريّ في السيتوبلاسما دون عضيات (CYTOSOL).
 - 2. أكسدةُ حمض البيروفي Pyruvic Acid Oxidation
 - . حلقة كريبس Krebs cycle.
 - 4. الفسفرةُ التأكسديةُ وتضمُّ:
 - Oxidativ Phosphorylation نقل الإلكترون والأسموزية الكيميائية.

أستنتج من المخطّط: إن البروتينات والدّسم المتحوّل إلى حموض أمينية وحموض دسمة وتتأكسد إلى أسيتيل مساعد أنظيم A ثمّ تدخلُ في تفاعلات حلقة كريبس.

مرحلة مشتركة بين التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي تحدث في السيتوسول Cytosol (السيتوبلاسما دون عضيات) حيث توجد الأنظيمات اللازمة لحدوث تفاعلاتها ولا تحتاج إلى الأكسجين.


▼ أنظرُ المخطّطَ الآتي الذي يمثّلُ ملخّصاً لهذه المرحلة وأجيبُ عن الأسئلة الآتية:



أضيف إلى معلوماتي

NAD: نيكوتين أميد ثنائي النكليوتيد مركبٌ مشتقٌ من فيتامين النياسين B3.

FAD: فلافين أميد ثنائي النكليوتيد وهو مشتق من فيتامين B2.



أختبرُ فهمي:

- 1. إذا اقتصرت عمليّة التّنفّسِ الخلوي على مرحلةِ التحللِ السّكّريِّ فقط، فكم عددُ جزيئات سكّر الغلوكوز اللازمة لإنتاج 60 جزيء ATP؟
- 2. إن خلايا الدّم الحمراء لا تحتوي على جسيمات كوندريّة (الميتاكوندريا) إلا أنَّها تحصلُ على الطّاقة التي تحتاجُها. أفسِّرُ ذلك.


ثانياً: مرحلةُ أكسدة حمض البيروفي Pyruvic acid Oxidation

تتمُّ هذه المرحلة في ثلاثِ خطواتِ محفّزة أنظيميّاً:

▼ أدقِّقُ مع زملائي في المخطّط الآتي وأرتب خطوات الأكسدة الثلاث الواردة في الجدول الآتي بالشّكل الصّحيح:

الصّحيح:

التّرتيب الصحيح	المرحلة
•••••	تتحدُ مجموعةُ الأستيل بالمرافق الأنظيمي COA فينتج مركب أستيل كو أنظيم A.
••••••	ينتقلُ حمضُ البيروفي إلى حشوة الميتاكوندريا بوساطة بروتينَ ناقلٍ متحوّلاً إلى أستيل ومجموعة كربوكسيل منخفضة الطاقة على شكل جزيء 2O ₂ .
***********	ارجاع الـ +NAD إلى+NADH



أجيبُ عن الأسئلة الآتية:


- 1. ما عدد ُجزيئاتِ CO_2 الناتجة مع العلم أنَّ عددَ جزيئاتِ حمضِ البيروفي الناتجة عن التحلل السّكري (2)؟
 - 2. ماعدد جزيئات الـNADH الناتجة؟ وماعدد أيوناتِ الهيدروجين الناتجة؟
 - أكملُ المعادلة الآتية: -

ثالثاً: مرحلةُ حلقة كريبس Krebs cycle

حلقةُ حمضِ الليمون (Tricaroboxylic Acid) حلقةُ حمضِ الليمون

اكتشف هذه الحلقة العالم هانز كريبس Hanz krebs عام 1937م و هي سلسلة من تفاعلات الاستقلاب Metabolism reactions التي تحدث داخل الميتاكوندريا وبوجود الأكسجين.

أدقِّقُ جيّداً أنا وزملائي في خطواتِ هذه الحلقةِ التي تتمُّ لجزيء حمض بيروفي واحد تأكسدَ إلى أستيل كوأنظيم A (أتذكرُ أن التحلّلُ السّكري يعطي جزيئين من حمضِ البيروفي وكلّ منهما يدخلُ في تفاعلات حلقة كريبس).



▼ من المخطَّطِ السّابق أرتُّبُ مراحلَ حلقةِ كريبس الآتيةِ وذلك بربطِ الخطوة مع ترتيبها الصّحيح رقمياً:

الترتيب الصّحيح	الخطوة
•••••	يفقدُ حمضُ الليمون جزيء ${\rm CO}_2$ ويتحول إلى مركّبِ خماسيّ الكربون ويرجعُ جزيء ${\rm H}^+$ NADH وأيون هيدروجين ${\rm H}^+$
1	يتّحدُّ أستيلُ كو أنظيم A مع مركّبٍ رباعيّ الكربون ليتكوّن مركبُ حمض الليمون
•••••	يتشكلُ جزيء ATP من تفاعل فسفرة
***********	يتحوّلُ مركّب رباعيّ الكربون إلى مركب المالات ويرجعُ جزيء FAD إلى FADH
**********	يتحوّلُ مركبُ المالات إلى مركبِ أوكز الوأسيتات ويرجعُ جزيء +NAD إلى NADH وأيون هيدروجين +H
	يفقد المركّب خماسيّ الكربون جزيء ${\rm CO}_2$ ويتحوّل إلى مركّب رباعيّ الكربون ويرجع جزيء + NADH إلى NADH وأيون هيدروجين ${\rm H}^+$
ماعددُ جزيئات CO ₂ الناتجةِ؟	نتيجة عددُ جزيئات الـ ATP الناتجة (1) عددُ جزيئات الـNADH الياتجة (1) عددُ جزيئات الـNADH (1) الهيدروجين +H(3)، وعدد جزيئات الـFADH (1)

▼ أكملُ المعادلةُ الآتيةُ:

(التي توضّحُ المواد المتفاعلة والناتجة من التّفاعل لدورتي كريبس بعد استهلاكِ جزيء غلوكوز بالكامل).

أتعلم: تمثّلُ المراحلُ الثلاثُ السّابقةُ (التّحلّل السّكّريّ، أكسدة حمض البيروفي، حلقة كريبس) المسارَ الكربوني لإنتاجِ الطّاقةِ؛ لأنّهُ يتمُّ فيها تحرُّرُ ${\rm CO}_2$ من المركبات العضويّة التي تدخلُ في كلِّ مرحلةٍ ولا تزيدُ نسبة الطّاقة الناتجة على %10 من إجمالي الطّاقة الناتجة عن الأكسدة الكاملة لجزيء الغلوكوز وبالتّالي لاتدخلُ المرحلةُ الرّابعةُ (الفسفرة التأكسديّة) أية مركّباتٍ عضويّةٍ وإنّما تقتصر العمليّة على نواقلِ الإلكترونات (NADH - FADH) الغنيةِ بالطّاقةِ وعلى انتقالِ الإلكترونات.

تعلمتُ: عندَ أكسدةِ جزيءِ غلوكوز في المراحل الثلاث السابقة ينتجُ:

- 4 جزيئات ATP فقط (جزيئان من التحلل السّكّريّ + جزيئان من حلقة كريبس لماذا؟).
- 10 جزيئات NADH (2 من التّحلّل السّكّريّ + 2 من أكسدة حمض البيروفي + 6 من حلقة كريبس).
 - 2FADH₂ من حلقة كريبس.
 - البيروفي +4 من حلقة كريبس). +6 جزيئات +2 من حلقة كريبس).

أختبرُ فهمي:

أحسب عددَ جزيئاتِ ATP الناتجة من أكسدة مركّبٍ سكّريّ يتكوّنُ من 10 جزيئات مالتوز (سكر الشّعير) في نهاية المسارِ الكربونيّ.

لاحظْنًا ممّا سبقَ أنَّهُ لاينتجُ سوى أربعةِ جزيئاتٍ من الـ ATP ولاتتحرّرُ طاقة عند تحرّر CO_2 من الوقود التنفّسي فما مصدر الطاقة في عمليّة التنفّس الهوائيّ؟

أتذكرُ من الكيمياء:


التاكسد عملية فقدان الإلكترونات من الجزيء أو الذرة أو الأيون وينتج زيادة في الشّحنة الموجبة والإرجاع يكتسب خلاله الجزيء أو الأرة أو الأيون الإلكترونات وينتج زيادة في الشّحنة السّالبة.

رابعاً: مرحلة ُ الفسفرةُ التأكسديّة Oxidative Phosphorylation

وتتضمَّنُ: سلسلةَ نقلِ الإلكترونِ والحلوليةِ (الأسموزيةِ) الكيميائيةِ Electron transport chain & Chemiosmosis

تشبه عملية توليدِ الطّاقةِ بوساطة سلسلةِ نقل الإلكترونات والأسموزيّة الكيميائيّة عمليّةَ توليد الطّاقة باستخدام ماء السدود التي تعملُ على تدويرِ عنفاتٍ لإنتاجِ الطّاقة الكهربائيّةِ بتجميعِ الماء في الأعلى، ثمّ سقوطهِ من الأعلى إلى الأسفل.

▼ أدقق جيداً في المخطّط الآتي وأستنتج خطوات الفسفرة التأكسدية:



السيتوكروماتُ (Cytochromes) والأبيكينوناتُ (Cytochromes) سلسلة من مركّباتُ السيتوكروماتُ (Q) Ubiquinones بروتينيّةٌ توجد على الغشاء الداخليّ للميتاكوندريا تعملُ على استقبال الإلكترونات من نواقل الـ NADH بروتينيّةٌ توجد على الغشاء الأكسدة والإرجاع، ونقلها إلى الأكسجين لينتجَ الماء.

▼ أرتُّبُ خطوات مرحلة الفسفرة التأكسديّة مستعيناً بالمخطَّط السّابق وبالتّعاون مع زملائي:

الترتيب الصحيح	الخطوة
4	أيوناتُ الهيدروجين التي تم َّضخُها إلى خارج الغشاءِ تعودُ عبر أنظيم ATP سنتاز الذي ينتجُ طاقةً.
•••••	تنقلُ مركباتُ الـ NADH - FADH2 الإلكترونات من المسار الكربوني إلى سلسلة نقل الإلكترون.
***********	يتحدُ الأكسجين بأيونات الهيدروجين والإلكترونات لتكوين الماء بمساعدة أنظيم سيتوكروم أوكسيداز.
***********	تطلقُ سلسلةُ نقلِ الإلكترونات طاقـةً تعملُ على ضخِّ أيونات الهيدروجين إلى خارج الغشاء الداخليّ.

أَتَعْلَمُ: ينتجُ من أكسدة جزيء الـ NADH فقط 3ATP وينتج من أكسدة جزيء FADH2 فقط 2ATP فقط 2ATP فيكون عدد جزيئات الـ ATP الناتجة في النّنفّس الخلويّ الهوائيّ:

(10 X 3) + (2X2) = 34 ATP من مرحلة الفسفرة التأكسدية 38ATP من مرحلة الفسفرة التأكسدية 4ATP من التحلل السكري وحلقة كريبس

▼ أجيب عن الأسئلة الآتية:


- 1. المستقبلُ النهائيّ للإلكترونات بعدَ نزع طاقتها هو (الأكسجينُ، الماءُ، 'H' ، أنظيمُ ATPSynthase).
- 2. لماذا لا يحدثُ تفاعلُ احتراقٍ شديد عند اندماج الأكسجين والهيدروجين في السلسلةِ التّنفسيّة، كما يحدثُ في أنبوب الاختبار؟
 - 3. ماذا تسمّى المركباتُ (E2Q ، Cyto c) والمركبات (IV III II I)؟ وما دورُ ها؟
 - 4. ماذا ينتج عن تراكم حمض الليمون (السترات) في حلقة كريبس؟

أضيف إلى معلوماتي

يكونُ عدد ُجزيئات الـATP الناتجة عن النّنفس الخلوي الهوائي 38ATP أما في الخلايا العصبيّة والعضليّة فعددها 36ATP ما سببُ الاختلاف؟ في الخلايا العصبيّة والعضليّة لا يستطيع جزيئي الـ NADH الناتجين عن التحلل السّكري دخول الغشاء الداخليّ للميتاكوندريا نظراً لكبر حجميهما فيتحوّلان إلى جزيئي 2FADH2 إذ يكون حجم جزيئتهما أصغر فيتمكّنان من دخول غشاء الميتاكوندريا الداخليّ، أي يصبح مجموع النواقل التي تصل إلى الفسفرة التاكسديّة (8NADH + 4FADH2).

- يعملُ غازُ السيانيد على تثبيط سلسلة نقل الإلكترونات عن طريق تثبيط أنظيم سيتوكروم أوكسيداز ما يؤدي إلى عدم إنتاج طاقة وينجم عن ذلك الإغماء، ثمّ الوفاة وينتج هذا الغاز من استنشاق حريق في المنزل ورش تلميع المعادن بعض المبيدات الحشرية....
 - هناك بعضُ أنواع الجراثيم اللاهوائية تعتمدُ في تنفسها على السيانيد بدلاً من الأكسجين للحصول على الطاقة.

▼ ألاحظ المخطط الآتي الذي يلخّص تحلل جزيء غلوكوز واحد هوائياً، وأملاً الفراغات بالمصطلحات العلمية المناسبة، وأجيب عن السؤال الآتى:



? كيف يتمُّ ضبطُ معدل التّنفّس الخلوي الهوائي؟ إلى أين تذهب الطّاقة الناتجة عن التفاعلات السّابقة؟

أتعلَّمُ: مفهوم الاستقلاب (Metabolism): تسمّى عمليّةُ تفكيك المركّبات العضويّة لتحرير الطاقة بتفاعلات الهدم (Catabolism) ويستخدمُ الجسم نواتج هذه العمليّة في بناء خلايا وأنسجةٍ وبروتينات وظيفيّة، كالأنظيمات والحاثات والأجسام المضادّة والنواقل العصبيّة وغيرها وتسمّى تفاعلات البناء Anabolism كما يزداد معدّل الاستقلاب بازدياد أنشطة الجسم المختلفة.

ويطلقُ على الطّاقة التي يستهلكُها الكائنُ الحيّ عندما تكون أنشطة الجسم في حدّها الأدنى، ليضمنَ لخلاياهُ الحياة والاستمرار بمعدّل الاستقلاب الأساسيّ (BMR) (Basal Metabolic Rate)

▼ أنظر الجدول الآتي الذي يوضح بعض الأنشطة التي يمارسها الإنسانُ في حياته اليومية ومتطلّبات الطاقة:

الطاقة المستهلكة (kg/m) كيلوجول/دقيقة	النّشاط
4.5	النومُ
12.6	المشيُ البطيءُ
21	المشيُ السّريعُ
37.8	صعودَ الدّرج
15.5	تنظيفُ السّجادِ
36.5	لعبُ كرةِ القدم

التّقويم النّهائيّ

أتي:	يا	ممّا	ڵػڶٞٞ	تحيحة	لإجابة الط	:أختارُ ا	أولاً
11	w	1:	tı	: • 11	à Tait-ti	- # W	. 1

		•		
.1		التّنفس الخلويّ الهوائيّ في غالبيتا		
	أ- أكسدةِ حمض البير	وفي. بـ سلسلة نقل الإلكترون.	ج- الأسموزيّة الكيميائيّة.	د- حلقة كريبس
.2	إنّ مركبَ ATP غنم	يّ بالطّاقة الكيميائيّة المختزنة في اا	لروابط بين:	
	أ- ذرات الكربون في	، الأدينوزين.	ب- ذرات النتروجين في الأد	أدينوزين.
	ج- جذور الفوسفات.		د- ذرات السكر الخماسي.	
.3	يكون عدد ُجزيئات 2	CO النّاتجة من تفكّك جزيئي حمط	س بيروفي في حلقة كريبس:	:
	.1 -1	ب- 2.	ج- 4.	د-6.
.4		لكيميائية بناءُ الـ AT P باستخدام		ن في تركيز إحدى
	المواد الآتية التي تذ	نتقل عبر الغشاء الداخليّ للميتاكون	دريا:	
	أـ الأوكسجين	ب- أيونات الهيدروجين.	ج- أستيل COA.	د-NADH.
.5	عدد جزيئات ATP	النّاتجة من تفكّك 10 جزيئات غلوك	وز في نهاية تفاعلات مرحلة	ة حلقة كريبس:
	10 - أ	ب- 20.	ج- 40.	د-32.
.6	المستقبل النّهائيُّ للإ	لكترونات في التّنفّس الهوائيّ:		
	أ- الماء.	ب- الهيدروجين.	ج- الأكسجين.	د- السيتوكروم.
ثائد	أن أعطى تفسيد أعلما	تاً لكارٍّ ممّا بأتر.		

- 1. حدوثُ طفرةٍ في المورثة التي تشرف على تركيب بروتين السّيتوكروم يسبب خطورةً شديدةً على حياة الإنسان.
 - 2. موتُ الخليّة عند توقّفها عن تكوين الناقل الإلكترونيّ NADH.
 - 3. تحدث سلسلة نقل الإلكترونات في الغشاء الداخلي للميتاكوندريا.

ثالثاً: تقاسُ شدة ُ التنفسِ بالمعامل التّنفّسيّ و فق الآتي: المعامل التّنفّسيّ = $\frac{\text{CO}_2}{\text{CO}_2}$ المنطق المطلوب:

- 1. أحسب المعامل التّنفّسيّ لأكسدة جزيء واحد من سكر الغلوكوز في التّنفّس الهوائيّ (بالعودة إلى المعادلة الإجماليّة).
 - 2. لماذا يتراوحُ المعاملِ التّنفسيّ عند الإنسان بين (0.7 1) وليسَ قيمةٌ محددةٌ ثابتةٌ؟ أبحثُ في ذلك.

رابعاً: تلجأ الخلايا الحيّة لاستخدام الغلوكوز أولاً كوقود تنفسي وهو الخيار المفضّل للدّماغ في الثدييات وتستخدم المواد الدّسمة عندما يستنفد مخزون السّكّريّات ولا تستخدم البروتينات كوقود تنفسي إلا في حالة نفاد مخزون السّكّريّات والدّسم، لماذا لاتستهلك الخلايا الحيّة البروتينات إلا في حالة الجوع طويل الأمد، أو في حالة أمراض السّرطان المترافقة مع الهزال الشديد، في رأيك؟ أبحثُ في تأثير ذلك على الذاكرة عند الإنسان.

خامساً: أقارنُ بينَ كلِّ من:

- 1. المسار الكربونيّ ومسار الفسفرة التأكسديّة من حيث: كمّيّة الطّاقة الناتجة تحرُّرُ غاز CO₂.
 - 2. تفاعلات البناء وتفاعلات الهدم من حيث: مصدر الطّاقة في كلّ منهما أهمّيّة كلّ منهما

2 H + ½ O₂

NADH

2 H⁺ + 2 e⁻

iai

2 e⁻

1/2 O₂

سادساً: أملاً الفراغات الواردة في المخطّط الآتي الذي يمثل أكسدة جزيء من NADH في سلسلة الفسفرة التأكسديّة بما يناسبها من مصطلحات علميّة:

سابعاً: ماذا تتوقعُ أن يحدثَ إذا: 1. تراكمَتْ كمّيّةُ حمضِ الليمونِ في حلقة كريبس؟ 2. تخرّب أنظيم ATP سنتاز؟



المفاهيم الأساسيّة:

- التّنفّسُ اللاهوائي.
 - التَّخمّرُ الغوليّ.
 - التّخمّرُ الخليّ.
 - التّخمّرُ اللبنيّ.
 - التّخمّر الميتاني.

سأتعلّم:

- التَطبيقُ العمليَ لتجربتي التَّحْمَرُ الْعُولي والتَّحْمَرُ الْعُولي والتَّحْمَرُ الخلي.
 - المجالاتُ المفيدة للتّخمّر.
- المقارنة بين التّخمر (الخلي واللبني واللبني واللبني واللبني والميتاني).
- المقارنةُ بين التَنفَسِ الهواني والتَنفَس اللهواني والتَنفَس اللاهواني (التَخمَر).


التّنفْس اللاهوائيّ (Anaerob Respiration)

له نو عان: 1 تخمّرٌ غولي (Alcohol Fermentation). 2 تخمرٌ لبني (Lactic Acid Fermentation).

أولاً: التّخمّرُ الغوليّ (الكحوليّ) Alcoholic Fermentation

في منتصفِ القرنِ التّاسعَ عشرَ تعرضت صناعة الخمور في أوروبا للخراب بسبب تحُول الكحول إلى حمض، ولكنَّ العالم باستور استطاع حلّ هذه المشكلة فقد لاحظ أنّه حيثما وجدت حموض في السّوائل المتخمّرة وجدت جراثيم لاهوائية فعمد إلى قتل الجراثيم دون التأثير على طعم الخمر بطريقة البسترة التي سُميّت باسمه وذلك بتعريض عصير العنب قبل تخمّره إلى حرارة 62 درجة مئويّة مدّة نصف ساعة.

- ؟ فكيف تكيّفتْ هذه الأحياءُ الدّقيقةُ للعيش دون الأكسجين؟ مامصدرُ الكحولِ؟ مانواتجُ التّنفّس اللاهوائيّ؟
 - ▼ للإجابة أُنفِّذَ أنا وزملائي التّجربة الموضّحة في الشّكلِ الآتي:




أتقيّدُ بالآتي:

- أفضًل استخدام أنابيب وأدوات بالستيكية من أجل سلامة يدي.
- أستخدمُ خميرة العجين + أيّ نوع من المربيّات (مشمش تين عنب).
 - أملأ الأنبوب بالماء وأنكسه فوق الحوض.
- أضعُ التّجربة في درجة حرارة مناسبة (25 درجة مئويّة تقريباً) لماذا؟ أنتظر فترة من الزمن.
 - أكشف عن الغاز المنطلق بوساطة
 - وعندما أفتح الإناء الذي وضعت فيه المحلول السّكّريّ أشمُّ رائحة

2

تعلَّمتُ: من التّنفّس الهوائي أن مرحلة التحلّل السّكّريّ مشتركة بين التّنفّس الهوائيّ واللاهوائيّ، حيث تتمُّ في السيتوسول (البلاسما دون عضيات) (Cytosol) وينتج عنها جزيئان من حمض البيروفي + جزيئان من الـ ATP و NADH فكيف يستمرُّ التحلّل السّكّريّ دون الأكسجين؟ وكيف تتمُّ إعادة أكسدة الـ NADH؟

▼ ألاحظُ المخطّط الآتي وأستنتجُ مراحل التخمّرِ الغوليّ Alcohol Fermentation:



▼ ثمّ أكملُ المعادلةُ الآتيةُ:

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2.... \longrightarrow 2CH_3CHO + 2.... \longrightarrow 2C_2H_5OH$$

أجيبُ عمّا يأتي:

عدد جزيئات الـ ATP الناتجة: و عدد جزيئات CO2 و عدد جزيئات الكحول الإيتيليّ

2

أتعلَّمُ:


إنّ مركّب NAD^+ يَرجع في التحلل السّكّريّ إلى NADH لكنّهُ يتأكسد من جديد عندما يعطي أيونات الهيدروجين للأسيت ألدهيد الذي يرجع إلى الإيتانول ممّا يؤمّن استمرار العمليّة من دون O_2 .



ثانياً: التخمّر اللبنيّ Lactic Acid Fermentation: أساعدُ والديّ في صنع اللبن من الحليب وألاحظُ الصورة

أساعدُ والديَّ في صنع اللبن من الحليب وألاحظُ الصورة الآتية متسائلاً:

- ? لماذا وضعت والدتي قليلاً من اللبن فوق الحليب؟ لماذا تركت الحليب حتى يصبح فاتراً، ثمّ أضافت إليه اللبن؟
 - ? ما نواتج عملية التّخمر اللبني؟
- ▼ للإجابة أدقِّقُ أنا وزملائي جيداً في مخطّط مراحل التّخمّر اللبنيّ:



▼ ثم أكملُ المعادلةَ الآتيةَ:

 $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2.... \longrightarrow 2CH_3CHOH-COOH$

أجيبُ عمايأتي:

2. ماعدد جزيئات CO₂ الناتجة؟

1. ماعدد جزيئات الـATP الناتجة؟ ومامصدر ها؟

2

أتعلَّمُ:

بالعودة إلى المخطّط الستابق ألاحظُ: يقوم مركب الـ NADH بنقل أيونات الهيدروجين إلى حمض البيروفي في السّيتوبلاسما فيرجعُ إلى حمض اللبن ويتحوّل الـ NADH إلى +NAD وهذا ما يسمح للتحلّل السّكّريّ بالاستمرار.

الصلة بحياتنا: في الظّروف الطبيعيّة تقومُ خلايا العضلات الهيكليّة بالنّنفّس الخلويّ الهوائيّ لتأمين الطاقة الكافية لتقلّص هذه العضلات وخاصّة في حالة النّشاط الرّياضيّ. وعندما لا تصل كمّيّة كافية من الأكسجين إلى العضلات تلجأ إلى التخمّر اللبنيّ فيتحلّل الغلوكوز في السيتوبلاسما فقط؛ لأنّه لايوجد مستقبل إلكترونيّ نهائي (O_2) وينتج عن ذلك حمض اللبن.

؟ ماذا دعوتَ هذه الحالةَ سابقاً؟

عند وصول الأوكسجين من جديد إلى العضلات عن طريق الدّم يتمُّ التخلّص من حمض اللبن المتراكم بنقله إلى الكبد ليتحوّل إلى حمض بيروفيّ وتعاد أكسدته بشكلٍ كاملٍ.

هل تعلمُ؟

لماذا تنتفخ أغطية علب اللبن عند نفاد صلاحيتها؟ مع أنّ التخمّر اللبنيّ لا ينتج CO_2 ؛ لأنّ هناك أنواعاً أخرى من الجراثيم غير جراثيم العصيّات اللبنيّة تنتج غاز CO_2 الذي يدفع الغطاء إلى الأعلى.

المجالاتُ المفيدةُ للتخمّر:

ي كيف استفاد الإنسان من فكرة التّنفس اللاهوائي؟

استفاد الإنسان من فكرة التّخمر في مجالات عديدة منها: صناعة الخبر والتخليل وإنتاج الغاز الحيوي، ومجالات أخرى عديدة وللتعرُّف على بعضها أنفذ التّجارب والأنشطة العمليّة الآتية:

1. أنفذُ أنا وزملائي النشاطَ الآتي:



المواد والأدوات اللازمة:

بالون.
 علبة بلاستيكية.

أفسر: سبب انتفاخ البالون في العلب الثلاث.

3 طحينُ يمزج مع خميرة العجين في ماء فاتر (25)°.

ماذا تتوقعُ سبب عدم انتفاخ البالون في العلبة الثَّانية؟

أجيب عمّا يأتي: يتحلّلُ السّكّرُ في العجين ويعطي 2ATP وينطلقُ غازُ
 الذي يتطايرُ في أثناء الخبز

ثم أتعاونُ مع أسرتي في صناعةِ الخبرِ والمعجّنات المنزليّة وأسجّل ملاحظاتي في أثناءِ ذلك.

2. التخليل: ألاحظُ الصورَ وأنفذُ النشاطَ الآتي في المنزل:

ثم أسجِّلُ النتائج بشكلِ مقطع فيديو وأعرضها أمام زملائي في الحصّة الدرسيّة .









بعد مدّة

أغلق بإحكام

أضيف NaCl + H2O بمعدّل ملعقة كبيرة لكلّ كأس ماء كبيرة

يغسل الخيار، ثمّ يوضع في مرطبان

أضيف إلى معلوماتي

- 1. يتمُّ الحصولُ على حمض الخلّ Acetic acid عن طريق تخمير عدّة موادّ كالسّكّريّات بوساطة جراثيم Acetobacter.
- ينتجُ المذاقُ اللاذعُ للسوائلِ الناتجةِ عن التخمّر عند تعرُّ ضبها للهواء من تحوّل الإيتانول إلى حمض خلِّ.

3. إنتاجُ الغاز الحيويBiogas (التخمر الميتاني):

ألاحظُ الصور الآتية وأستنتج العلاقة بينها وأتساءل كيف نتج الغاز من روث الحيوانات؟



أفكر وأجيب:

- 1. كيف يمكن للإنسان الاستفادة من هذه التّقنيّات في إنتاج مصادر أخرى للطّاقة، كالكهرباء؟
 - 2. ماذا ينتجُ إذا قمت بطمر البقايا النّباتيّة وبقايا الأطعمة المنزلية الطّبيعيّة بالطّريقة ذاتها؟
 - 3. هل تحصل على النّتائج نفسها في رأيك؟
- 4. ما أهميّة وجود مخرج في جهاز التخمّر الميتانيّ؟ هل يمكن استخدام الموادّ التي تخرج منه في الزّراعة؟ اكتب معادلة التفاعل:


$$C6H_{12}O_6 \longrightarrow 3CH_4 + 3CO_2$$

أتعلّم: يحدث التّخمّر الميتانيّ في باطن الأرض في أثناء تشكّل الفحم الحجريّ والبترول بوساطة جراثيم لاهوائيّة تسمّى مولّدة الميتان Methanogenesis.

هل تعلمُ؟ إنَّ نصف كيلو من روث البقر يولِّدُ غازاً يكفي لطبخ وجبات طعام عائلة يوماً كاملاً !!!

▼ أملاً الجدول الآتي مبيّناً أوجُهُ التشابه والاختلاف بين التّخمّر اللبنيّ والخليّ والميتانيّ:

التّخمّر الميتانيّ	التّخمّر الخليّ	التّخمّر اللبنيّ	وجه المقارنة
2ATP			كمّية الطاقة النّاتجة
		لاتحتاجُ	الحاجةُ إلى الأكسجين
الحصولُ على غاز الميتان			الفائدة ُالعمليّة
السيللوزُ ومركباتٌ عضويّة		السّكّر في الحليب	الوقودُ التّنقّسيّ



نشاط:

ممّا درسته عن التنفس الهوائيّ واللاهوائيّ ومستعيناً بالمخطّط الآتي أملاً الجدول أدناه بالمصطلحات العلميّة المناسبة:

▼ ألاحظ وأقارن بين التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي:

التَّنفُّس اللاهوائيّ	التَّنفِّس الهوائيّ	وجه المقارنة	
•••••	في الميتاكوندريا	مكانُ حدوثِ كلِّ منهما	
•••••	•••••	الناتجُ النّهائيّ من الطّاقة	
•••••	•••••	الحاجة ُ للأكسجين	
O_2 للحفاظ على حياة الخلايا في غياب	•••••	الفائدةُ العمليّةُ لكلِّ منهما	

التّقويم النّهائيّ

أولاً: أختارُ الإجابةَ الصّحيحةَ ممّا يأتي:

- 1. بإمكانِ العضلات الهيكليّة بعد تعرّضها للتعب العضليّ وفي حال عدم توافرالأكسجين، أن تؤكسد حمض: أ- الخلّ. ب- البيروفيّ. د- أ + ج.
 - 2. المستقبل النّهائيُّ للهيدروجين في تفاعلات التّنفّس اللاهوائي:

أ- الأكسجين. ب- المركّبات العضويّة النّاتجة. ج- حمض البيروفي. د- الـ NADH

ثانياً: أُعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتى:

- 1. تكونُ كمّيّةُ الطاقة المتحرّرة في التّنفّس اللاهوائيّ قليلة جداً مقارنةً مع التّنفّس الهوائيّ.
 - 2. يتشكّلُ الفحم الحجريُّ والبترول في باطن الأرض في شروط الهوائيّة.
 - 3. تنتفخ أغطية علب اللبن عند نفاذ صلاحيته.



المفاهيم الأساسيّة:


- الصّحَةُ التّنفسيّةُ والبيئيّةُ.
 - الأمراضُ التَّنفسية.

سأتعلّم:

- استنتاجَ العلاقة بينَ التّنفَسِ والتركيب الضّوئيَ.
 - بعض أمراضِ جهازِ التّنفسِ.
- الإجراءاتِ الصحيحة لسلامةِ جهارِ التَنفسِ.

في أيّ يوم من السننة نحتفل بعيد الشّجرة؟ ماعدد الأشجار التي شاركْتَ مدرستك وزملاءك في زراعتها؟ ومانوعها؟ ماذا تتوقّعُ لو قامَ جميعُ طلّاب دمشق وريفها وطلّاب حمص وريفها بالمساهمة مع وزارة التّربية، ووزارة الزّراعة بتشجير طريق دمشق حمص؟ وطبّق العمل ذاته في جميع محافظات الجمهوريّة العربيّة السّوريّة؟

- ؟ درست سابقاً عملية التركيب الضوئي وأهميتها، لكن ما العلاقة التي تربطها بالتّنفس؟
- ▼ ألاحظُ الشَّكلَ الآتي وأبيّنُ العلاقة والتّكامل بين عمليتيّ النّنفّس والتّركيبِ الضّوئيّ، وأجيب عن الأسئلة الآتية:






في التركيبِ الضّوئيّ يتمُّ تحويلُ الطَّاقة إلى طاقة تختزنُ في مركبات أمّا في التنفّسِ: فسيتمُّ تحريرُ الطّاقة المختزنة في المركّبات

- البساتين؟ ما علاقة التشجير والحفاظ على البيئة بصحة جهاز التنفس؟ ما أهمية التنزِّهِ في الحدائق والبساتين؟
 - الماذا ازدادت الأمراض التنفسية والسرطانية في هذه الأيام؟

▼ ألاحظُ الحالات المرضيةَ الآتية:

إنّها تمثّل: التهاب الحنجرة - الأنفلونزا - مرض الربو - ذات الرئة - سرطان الرئة.



أربطُ بين صور الحالات المرضية ومسبباتِها الآتية:




أحدّد من بين المسبّبات السّابقة العامل الأكثر تأثيراً سلبيّاً في الحالات المرضيّة جميعها.



أتعلُّمُ: يحتوي دخان الستجاير على 4000 مادة سامة وغازات ضارّة عديدة أهمُّها:

- 1. النيكوتين: يؤدي إلى الإدمان واضطراب النقل العصبي.
- 2. القطران: يسبب سرطان الرّئة ويتجمع بشكل مادّة لزجة صمغيّة في أعقاب السّجاير
- 3. غازُ أحادي أكسيد الكربون CO: يسبّب فقر الدّم المصوريّ؛ لأنّه يعطّل عمل الهيمو غلوبين في نقل O₂.
 - 4. مادّةُ البنزوبيرين: مادّة مسرطنة تكبح المورثة P53 التي تمنع حدوث السرطان في الحالة الطّبيعيّة.

نشاط:



- ◄ أدقّق جيداً في المخطط البياني وأقارن بين قيمة الأداء التنفسي عند شخص لم يدخن وشخص يدخن.
- ? ما أهمية التوقف عن التدخين لدى المدخنين في عمر مبكر؟
- ؟ ما قيمة الأداء التنفسي لدى الشخص غير المدخن في سن الـ 75؟

أضيف إلى معلوماتي:

بعض أمراض جهاز التنفس:

- 1. التهابُ الحنجرة: تسببه جراثيم أو فيروسات ويؤدي إلى ارتفاع حرارة المريض وبدَّةٍ في الصوت.
- 2. الربو: تقلص تشنجي في العضلات الملساء في القصبات والقصيبات مما يسبب صعوبة في التنفس والسبب هو فرط حساسية للمواد الغريبة في الهواء (دخان غبار طلع وبر...).
- 3. ذاتُ الرئة: حالة التهابية تسببها جراثيم المكورات الرئوية تمتلىء فيها بعض الأسناخ الرئوية أو كلها بسائل وخلايا دموية مسببة نقص تأكسج الدم.
- 4. سرطان الرئة: تكاثر عشوائي لخلايا النسيج الرئوي يسبب كتلاً ورمية وله أسباب عديدة (بيئية كيميائية وراثية).
 - 5. الأنفلونزا: مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي ويشيع انتشاره في الفصل البارد.

▼ ألاحظُ وأستنتج:

أهمّية الإجراءات الصّحيحة الآتية وأثرها في جهازنا التّنفسيّ وباقي أجهزة الجسم أقترح إجراءات صحيحة أخرى أراها مناسبة:













التّقويم النّهائيّ

أولاً: أُعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتى:

- 1. انتشار مرضمي الرّبو وسرطان الرّئة بين سكان المناطق الصناعيّة.
 - 2. يسبب مرض ذات الرّئة نقصاً في تأكسج الدم.
 - 3. يسبب غاز أحادي أوكسيد الكربون فقر الدّم المصوريّ.

ثانياً: أقارنُ بين كلِّ من:

- 1. التَّنْفُس والتَّركيب الضّوئي من حيث: مكان حدوث كلّ منهما النّواتج النّهائيّة.
- 2. التَنفّس الهوائي والتنفّس اللاهوائي من حيث: كمّيّةُ الطّاقةُ النّاتجة ُ- مكانُ حدوث كلِّ منهما.

ثالثاً: يعدُّ الماءُ مكوناً أساسيًا من مكونات المادة الحيّة وعند تفكك المادة الحية تنتهي إلى الماء ومركبات أخرى.. (الماء = الحياة) هل توافقُ هذا الرأي؟ أيّدْ رأيك فيما مادرسَتَهُ في عمليّة التركيب الضّوئيّ والتّنفّس.

أبحثُ أكثر

الرّبو (Asthma): عبارة عن مرض مزمن يصيب الإنسان نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرّئتين (الشّعب الهوائيّة)، الأمر الذي يقلّل أو يمنع من تدفّق الهواء إلى هذه الشّعب الهوائيّة.

أبحث أكثر في مصادر التّعلم المختلفة عن أسباب الرّبو وطرق علاجه.

أسئلة الوحدة الثالثة

أولاً: ما المقصود بكلِّ ممّا يأتي:

أنظيم ATP سنتاز - معقد التّوافق النّسيجيّ الأعظميّ (MHC) - مولّد الضدّ - الشّر ابين التّاجيّة.

ثانياً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

1. حدد المواقع التي تحدث فيها العمليّات الحيويّة الآتية:

أ- انشطار الغلوكوز إلى جزيئين من حمض البيروفي. ب- تفاعلات حلقة كريبس. ج- تفاعلات سلسلة نقل الإلكترونات.

2. ما الأمراض الناجمة عن كلِّ من الحالات الآتية؟

أ- نقص كمّية الهيمو غلوبين في الكريات الحمراء. ب- ارتخاء الصيّمامات الهلاليّة في الأوردة. ج- نقص عدد الصفيحات الدّمويّة.

ه - إصابة الخلايا التّائية المساعدة بفيروس الإيدز.

و- مهاجمة الجهاز المناعيّ لغمد النّخاعين في الألياف العصبيّة.

ثالثاً: أختار الإجابة الصحيحة في كلّ ممّا يأتي:

1. مصدر الهيدروجين المتكون في السكريّات خلال حلقة كالفن من:

 $.O_2$ - $.CO_2$ - .ATP - .NADPH - .NADPH

2. عندما لا تتمكن خلايا الجهاز المناعيّ من تعرّف على معقد التّوافق النّسيجيّ في الجسم فالحالة: أ- فرطحساسيّة. ب- عوز مناعيّ. ج- اختلال مناعيّ ذاتيّ. د- استجابة مناعيّة.

3. في النّباتات أليفة الضّوء يعد أحد العوامل الآتية محدّداً لعمليّة التّركيب الضّوئيّ:

أ- درجة حرارة الجو 27 درجة مئويّة. ب- شدّة ضوئيّة 3500 لوكس. ج- تركيز O₂ بالهواء %21. د- تركيز O₂ بالهواء %21.

4. في حلقة كالفن عدد جزيئات ATP اللّا زمة لتركيب جزيئين من الستكر:

أ- 9. ب- 24. ب- 36. د- 12.

الانخفاض في الخلايا اللمفاوية يمكن أن ينتج عنه مشاكل:

أ- في التختّر. ب- مناعيّة. ج- في نقل الأكسجين. د- كلّ ما سبق صحيح.

6. تقوم الخلايا B المصورية (البلازمية) ب:

ب- إنتاج الأجسام المضادّة. أ- ابتلاع الجراثيم

د- تكوين الخلايا التّائيّة المساعدة. ج - إفراز الهيستامين.

7. أي من هذه الثّنائيّات ليس صحيحاً فيما يتعلّق بوظائف الخلايا التّائيّة:

أ- خلايا (T) المساعدة - مساعدة البروتينات المتمّمة.


ب - خلايا (T) الكابحة - تنظيم نسبة الأجسام. المضادّة في الدم.

ج - خلايا (T) السّمّية - رفض الأنسجة المزروعة.

د - خلايا (T) الذاكرة - تتعرّف مولّد الضدّ إذا دخل الجسم مرّة ثانية.

رابعاً: أختار من العمود الثّاني (ب) ما يلائم العمود الأوّل (أ) وذلك بوضع رقم العبارة الملائمة بين القوسين في نهاية عبارات العمود الأول:

العمود ب (الثّاثي)	العمود أ (الأوّل)		
 مستقبلاً نهائياً للإلكترونات في التّنفس الهوائيّ. مستقبلاً للإلكترونات. ناتجاً نهائياً للتّخمّر في العضلات. مستقبلاً للهيدروجين. 	السيتوكروم () حمض اللبن () مركب الـ +NAD ()		
 اتّحاد حمض البيروفي مع أسيتيل كوأنظيم A. اتّحاد مركب ثنائي الكربون مع مركب رباعيّ الكربون. انشطار جزيء الغلوكوز في التّحلّل السّكّريّ. انشطار جزيء غلوكوز في أثناء التّنفّس اللاهوائيّ كناتج نهائيّ في الخميرة. أكسدة الإيتانول عند التعرّض للهواء. 	ينتج حمض البيروفي من () ينتج حمض الخل من () ينتج حمض الليمون من () ينتج الغول الإيتيلي من ()		




خامساً: يوضّحُ الشّكل المجاور تقسيم درجات ضغط الدّم حسب منظّمة الصّحة العالميّة والمطلوب:

- 1. اكتب فنات الضغط الآتية على المخطّط بحيث توافق درجات الضغط المحددة عليه.
 - ضغط الدّم طبيعيّ طبيعيّ مرتفع مرتفع درجة 3 (شديد) مرتفع درجة 1 (طفيف) مرتفع درجة 2 (متوسّط).
 - يوجد تباين في قيمة ضغط الدّم
 للشّخص قبل وبعد ممارسة نشاط رياضي؟
- 3. يُعرّف ضغط الدّم بالقاتل الصامت لماذا في رأيك؟






- .3 .A
- .4 **.B**
- .5 **.**C
- .6 **.D**
- 2. تتمثّلُ المنطقة المتغيّرة في الأجسام المضادّة ب:
 - **.**2 ع **.**A
 - **.4** و **.B**
 - .4 و **.**C
 - **.3** د **.D**
- 3. الأجزاء 1 و2 و 3 و4 ضرورية لتكوين الأجسام المضادة لأنها:
 - A. تتكوّن بواسطة الخلايا اللمفيّة التّائيّة.
 - B. تسمح بتركيب أعدادٍ هائلة من الأجسام المضادّة النوعيّة.
 - تثیر استجابة مناعیة خلویة.
 - D. تساعد في الحدِّ من عدد الأجسام المضادّة المتكوّنة.



سابعاً: أعطى تفسيراً علميّاً لكلِّ ممّا يأتى:

- 1. نقص تغذية النبات بالمغنزيوم يؤدّي إلى اصفرار الأوراق.
 - 2. اللون الأخضر للنباتات
- 3. المذاق اللاذع للسوائل الناتجة عن التخمر عند تعرّضها للهواء.
 - 4. المناعة المكتسبة طويلة الأمد.

ثامناً: أكمل المخطّط المفاهيميّ الآتي: الذي يوضّح آلية انتقال غاز ٢٠٠٠ في الدم.



المتبرع					المتلّقي
+AB	+B	-A	+0	-O	Ŧ
					-O
					+0
					-A
					+ A
					-B
					+B
					-AB
					+AB

تاسعاً: أدرس الجدول المجاور شمّ أضع ☑ في المربع الذي يحقّق إمكانيّة نقل الدم من المتبرّع إلى المتلقّى و ☒ في حال عدم إمكانيّة النقل.

عاشراً: أجيب عن السّؤالين الآتيين:

تفكير ناقد:

- لماذا يبقى تعداد الكريات الحمراء في الدّم ثابتاً تقريباً في الحالات الطّبيعيّة وتظلّ سعة نقل الأكسجين في الدّم دائما تكفى احتياج الجسم؟
- ابحث في مصادر التّعلّم المتوفّرة عن التّنفس الهوائي لفطر خميرة العجين، وماهي نواتج هذه العمليّة؟

مشروع الوحدة الثالثة:

زيارةُ إلى إحدى محطّات البحوث الزراعيّة

الهدفُ العام: تدريب المتعلّمين على التخلّص الصّحيح من البقايا والمخلّفات المنزليّة الطّبيعيّة للحفاظ على البيئة والأهميّة الاقتصاديّة لها.

أهداف المشروع: يصبح الطالب قادراً على أن:

- يساعد أسرته وجيرانه على فرز النفايات المنزلية التي يمكن إعادة تدوير ها.
 - يكتسب خبرة عملية في التقانات المستخدمة في محطّات التّدوير.
- يطبق نموذجاً في حيّه بالتّعاون مع المجتمع المحليّ لاستثمار بقايا المخلّفات المنزليّة.
 - يساعد مربّو الأبقار في الاستفادة من روث الأبقار في إنتاج الطّاقة والزّراعة.
 - يعزّز ثقافته العلميّة وينمّى الشّعور الانتمائيّ للمكان والبيئة والوطن.

خطة المشروع: زيارة محطّة تدوير النفايات القريبة من مكان السّكن أو المحافظة.

مراحل تنفيذ المشروع: بالاتفاق مع المدرسة (إدارة - مدرّسين - زملاء).

- تحدّدُ المحطّة المراد زيارتها وتاريخ الزيارة، وإعلام المحطّة بتاريخ الزيارة وهدفها.
 - عدد الطّلاب وتوزيع الأدوار فيما بينهم والمدرّسين المرافقين لهم وواسطة النقل.
- تحديد الأدوات والمواد اللّزمة: كاميرات أجهزة تسجيل (CD فلاشات) قفازات كمّامات علب للحصول على بعض العيّنات من المحطّة دفاتر وأقلام.
- التحاور مع الخبراء والعاملين في المحطة وطرح أسئلة علميّة للحصول على المعلومات الكافية عن المحطّة وطريقة العمل فيها وإمكانية استثمارها وتطبيقها.
 - الحصول على العينات الضرورية من محطّة التّدوير وحفظها بشكل مناسب.

كتابة تقرير الرحلة:

- منذ الانطلاق حتّى العودة مزوداً بالصور والأفلام الموثّقة والعيّنات من المحطّة.
 - كتابة وتوثيق الفائدة التي حصل الطلاب عليها من هذه الرّحلة العلميّة.
- يحتفظ بنسخة مصورة عن المشروع تعد أرشيفاً لنشاطات الطلاب في المدرسة تعرض في المعرض العلمي ويطلع عليها كل من يزور المدرسة وبقية الطلاب في الصفوف الأخرى.

يجري المدرّس مع طلابه استبياناً وتقويماً لزيارتهم ويسألهم:

- 1. ما الأهمّية الاقتصاديّة والبيئيّة لهذه التقنيات؟
- 2. ماذا تتوقّع لو انتشرت مثل هذه المحطّات في جميع محافظات القطر العربيّ السّوريّ، وفي جميع أنحاء الوطن العربيّ؟ وهل يمكن الاستفادة منها في توليد الطّاقة الكهربائيّة؟ ابحث في ذلك.
- 3. البحث في إمكانيّة استثمار نتائج الرحلة والمشروع في البيئة المدرسيّة بالتعاون مع المجتمع الأهليّ (إدارة محليّة وحدات إرشاديّة).